



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A


1595⁵ A

L. xxxiii. Cn









VAL. CORDI

DISPENSATORIVM, 42530

SIVE

PHARMACORVM

CONFICIENDORVM

RATIO.

PEYRO COVDEBERGO Pharmacopoe
Antuerpiano plus quā tringentis erroribus libe-
rata atque vindicata, scholisque illustrata:

ADPECTO, VALERII CORDI NOVO
Herbo, aliisq; panis post praefationes annotatis.

Quid porro à MARYNIA LOBELIO pra-
stitum sit, sequens pagina indicabit.

= Metal



LVGDVNI BATAVORVM,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
Apud Franciscum Raphelengium,
Cl. Io. xc.

His accessit DIARIUM PHAR-
MACORUM parandorum SIM-
PLICIUMQUE colligendorum

Matthia LOBELIO apud Middel-
burgenses Medico collectum.

*Additis aliquot selectioribus cathartici me-
dicamentis, & emendatioribus quotidiano-
rum lenitiuorum vsitatissimorum solutiuo-
rumque medicamentorum descriptionibus;
alioqui vbique passim officinarum perperam
peruersis: Eodem LOBELIO auctore.*

³
VIRTVTVM OMNI

GENERE CLARISS. VIRO

D. GERARDO GRAMAIO,

Domino Vefaliæ Comititis, ac ærarij
bellici Quæstori Statuum dignissimo,
Petrus Coudenbergius S. P.

CVM Valerij Cordi de consfciendis
Pharmacis libellum Christophorus
Plantinus prælo suo esset commissu-
rus, rogauit me, vt si quid haberem quod edi-
tionem istam inuare posset, cum studiosis
communicarem. Fuit enim optimo viro sem-
per propositum, vt quos libros imprimit, non
nisi emendatissimè è sua officina prodire sinat.
Quamobrem, vt de ipsius incredibili taceam
diligentia & sumptu, in omni disciplinarum
genere doctissimorum virorum opera vititur.
Ego verò, etsi quæ iam olim in hunc Cordi
libellum (quem ego, quicquid dicat præfatio
anonyma, post obitum auctoris in lucem hæ-

A 2

redam

redum vel amicorum cura prodiisse, certis de
causis persuasum habeo) annotaueram, non
essent apud me tanti momenti, vt vel semel
de illorum editione cogitauerim; tamen non
potui non homini mihi amicissimo, & hone-
sta petenti morem gerere. Quare vespertinas
aliquot hac hieme horas; quæ solæ me quid
scribere vel legere permittebant, libelli huius
correctioni dedi; & maximo mendorum nu-
mero sublato, in suum quæque ordinem re-
stitui; multis interim ipsius auctoris adiectis
medicaminibus, quæ hætenus hîc fuerunt
desiderata; ita vt operam me meam non
malè posuisse confidam: vbi à nonnullis haud
inmeritò notatur, explicatè subiunctis id
rationibus doceo, & nonnumquam ineptas
quorundam reprehensiones refuto, quæ solo
nouitatis studio sine vllis rationibus videntur
innectæ. Si quid autem à me erit omissum,
copiosè & diligenter excutietur in magno
meo huius farinae opere, quod fortasse ali-
quando

quando medicis & pharmacopœis non minorem voluptatem quàm vtilitatem adferet. Quod verò illud nondum perficiam & publicem, maximas habeo & grauissimas consilij mei caussas, tum quòd eorum fauore non subleuer, quorum intererat curare vt tale quid diligenter præscriberetur; tum quòd tempora sint eiusmodi, vt plures fiant aliptæ, quàm experti Medici & Pharmacopœi. Qua de re cùm mecum cogito, nihil fero molestius, quàm gentis nostræ inscientiam; quæ cùm in alijs ferè rebus omnibus nulli sit nationi secunda, nusquam aequè peccat, quàm quòd nostri ordinis hominibus sit iniquior. Id verò pluribus verbis aperire non est necesse. Quis enim est vel mediocriter in pharmacopolijs versatus, cui hoc non sit notissimum? Magna spes erat præterea, Ioannem Goropium Becanum, non tantùm rei Medicæ, sed vniuersæ Philosophiæ & antiquitatis peritissimum virum, aliquid de
A 3 pharma-

pharmaceutice scripturum. quod utinam fecisset. Sed quia nunc omni doctrina refer-
tum opus, quod verè veneranda antiquita-
tis plaustrum quis appellet, præ manibus ha-
bet, nostris certè rebus vacare non potest:
ideoque nec hortum, ut constituerat, colere.
Id quidem ego totis serè viginti annis feci
sedulo: & quidem nunc maximis labori-
bus & impensis, ad sexcenta exoticarum
stirpium genera in meo florere hortulo quo-
tidie, etsi rei familiaris cum iactura & di-
spendio, maxima tamen cum voluptate cer-
no. Et nisi cultor pauperis horti esset pau-
perior, darem operam, ne quid mihi dees-
set, quod nostra saltem tellus, licet summa
cura, ferre posset. Interea id quod possum
ago, quando quod volo non licet. Speran-
dum, inquit Euripides, & ferendum. Ce-
terum, ut ad institutum redeam, quæ in
hoc opusculo præstiti, illa tibi Gerarde Gra-
maie, singularis omnium bonarum artium
patro-

EPISTOLA.

7

patrone, dico dedicóque; partim vt obser-
uantiam erga te meam testificer, partim
vt hac quacumque nominis tui auctori-
tate munita, inuidiam & calumnias tanto
facilius ferant. Suscipies ergo hac, qua tua
est humanitas, benigno vultu, quo Petrum
Coudenbergium in tuam iam pridem clien-
telam recepisti; & receptum constanter tue-
ri pergis. Vale, Macenas optime. Ex offi-
cina nostra pharmaceutica, Antuerpia Ka-
lend. Martius cIo. Io. LXVIII.

A 4

PRÆ-

PRÆFATIO PRISCÆ
EDITIONIS, AD
LECTOREM.

CUM Valerius Cordus, Euritij illius
celeberrimi Medici filius, studiorum
gratia Italiam petiturus, obiter ad
urbem nostram Norimbergam per-
uenisset, atq. cum doctis quibusdam ac bonis
viris, præcipuè Medicis, mutuâ notitiâ, ami-
citiâ, familiaritatemq. studiosè contraheret:
inter cetera, quæ de bonis litteris atq. re Me-
dica, vtrò citroq. inter eos familiariter, ut fie-
ri solet, agitata sunt, mentio incidit Dispensa-
torij, quod ipse ex omni genere honorû aucto-
rum, cum veterû, tum recentium, de Pharma-
corum omniû, quatenus in usu sunt, cõficien-
dorum ratione collectum, diligenter & emen-
datissimè conscripserat. Cumq. cõstaret, illud
iam antea in aliquot Saxonix urbibus, præci-
pue Medicis approbâribus, in usum publicum
fuisse receptum, interimq. tamè ab eo & locu-
pletatû, & annotationibus eruditis magis atq.
magis illustratum; rogatus fuit à cõpluribus,
ut illud ipsum etiam nostris Pharmacopolis
impertiret. Cordus autè, etsi ad iuuandam rem
Medi-

Medicam iam tum mirificè esset accensus, pro sua tamen modestia atq. prudentia, non nihil subuerebatur priuatam suam auctoritatem ad Pharmacopolas permouēdos, ponderis haudquaquam satis esse habituram. Itaque librum suū Senatui potius offert, tum demū in vsum publicum assumēdum, cum esset illius iudicio & auctoritate comprobatus. Senatus verò, pro sua in studiosos omnes propensione, ac reipublicæ omni ex parte iuuandæ diligētia ac sollicitudine, officiū illud Cordi perquam gratum habuit, librumq. collegio Medicorum, Cordo præsentē, perlegendū & examinandū tradidit: ut si quid mutandū, adiiciendū, uel arbitrari essent, id auctore non modò sciente, verū etiam consentiente fieri posset. Quod cum sedulò ac magna diligentia factum esset, Senatusque ex Medicorum censura iam intellexisset, nihil hactenus absolutius aut emendatius in hoc descriptionum genere typis inuulgatum esse: librum nō solum in publicum edendū, verū etiam Pharmacopolis, ut eum veluti lumen quoddā deinceps sequantur, offerendum esse decreuit. Cuius quidem editioni, hac quoq. de causa studiosius inuigilatum est, ut auctore interim in Italia, dū ad metā studio-

A 3

rum

rum suorum quàm acerrimè cōtendit, imma-
tura morte sublato, aliquid tamen illius exta-
ret, quod ingeniū eius & industriā posteritati
restaretur, eumque ab obliuione vindicaret.

Hoc igitur Valerij Cordi, candidissimi &
diligentissimi iuuenis monumentum quale-
cunque, certè non pœnitendum, studiose le-
ctor, obuiis vlnis amplectere, & si quid ex eo
iuuaberis (iuuaberis autem, nisi fallor, quàm
plurimum) amplissimo Norimbergensi Sena-
tui, cuius liberalitate tibi communicatur, gra-
tias habe. Sin autem aliquid in eo displicue-
rit, ne Auctorem mortuum inhumaniter ca-
lumniis impetè: sed absolutiore opère in pu-
blicum edendo, illum vincere, & nomen eius
obscurate contende. Et bene vale.

I O A N N E S. P O S T H I V S

D. M E D I C V S G E R M A N V S.

Pharmaca quæ Cordus variis collegit in hortis

Lætus agens cui tempora verna sui,

Post obitum in multos transcripta fuere libellos,

Verum his errores non tolerandi ierant;

Quos gelido veniens Petrus de monte remouit,

Miscendo fida pharmaca cuncta manu.

Dij tibi, Coudenberge, senis dent Nestoris annos,

Ut quod habes, ingens perficiatur opus.

I N D E X

INDEX SECTIONVM.

II

| | |
|---|---------------|
| <i>Pharmacopœum qualem esse debeat</i> | Pag. 13 |
| <i>Confectiones aromatica</i> | 20 |
| <i>Confectiones Opiata</i> | 78 |
| <i>Condita</i> | 147 |
| <i>Conserua</i> | 148 |
| <i>Syrupi</i> | 152 |
| <i>Rob</i> | 195 |
| <i>Lohoch</i> | 199 |
| <i>Lenitiua & Solutiua</i> | 204 |
| <i>Pilule</i> | 243 |
| <i>Trochisci</i> | 272 |
| <i>Olea</i> | 299 |
| <i>Unguenta</i> | 332 |
| <i>Cerota</i> | 365 |
| <i>Emplastra</i> | 366 |
| <i>Preparationes quorundam simplicium</i> | 379 |
| <i>Ponderum ratio</i> | 388. nota 391 |
| <i>Accesserunt nunc primum Val. Cordi De pur-</i> <i>gantium medicamentorum extractione, ac</i> <i>Oleorū artificiosa distillatione (prater nonnul-</i> <i>la pharmaca locis suis inserta) libellus.</i> | 392 |
| <i>Epitaphium eiusdem.</i> | 416 |

APPEN.

A P P E N D I C I S E X
I A C O B O S I L V I O,
I N D E X.

*De collectione, Repositione, & Duratione
Simplicium.*

*De Adulterationibus Simplicium medica-
mentorum cognoscendis.*

*De Simplici aliquo absolutè scripto, quid
accipiendum.*

De Succedaneis, scilicet, Quid pro Quo.

L E C T O R I.

Scias, benigne Lector, asteriscos spar-
sim in hoc libello obuios loca emenda-
ta, mutata, vel restituta denotare.

V A L E -

13
VALERII CORDI

SIMESVSII PHARMA-

CORVM CONFICIEN-

DORVM RATIO.

*Qualem virum Pharmacopœum
esse deceat.*



AGNVM præsidium, hu-
manæ imbecillitati in Me-
dicina situm est, vt Home-
rus omnium poëtarū præ-
stantissimus, Medicū non
sine causa πολλῶν ἀντάξιον
ἔμμεν pronuntiasse videa-

tur. Verūm huius laudis, vt nunc quidem Me-
dicina administratur, non exiguam partem
Pharmacopola sibi vindicat, cū sit Medicū
quasi dextera manus, pericliteturq. ipsius cul-
pa sæpè, nō solum egrī valetudo, verū etiam
Medici, quantumvis præstātis, fama & existi-
matio, cū ea quæ Medicus rectè præscribit,
parum dextrè exequitur, aut materia vtitur
exoleta aut adulterata. Inde enim frequenter
accidit,

accidit, ut æger vel non iuuetur omnino, vel, quod multo peius est, etiam lædatur. Medicus autem, præterquam quòd pro imperito habetur, etiam in errorem ducitur, dum se aut de morbo nō rectè iudicasse, aut non debitā medicinam administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad huius muneris functionem admittere deberent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent. Verùm illi ut volent, suo fungātur officio, nos idoneum Pharmacopolam paucis delineabimus, ut ineptos & improbos à functione tam periculosa submoueamus, idoneos autem ad hoc munus capeffendum alacriores reddamus.

Principiò, Latinæ linguę nō vulgariter tantum, sed ad munditiem & proprietatem vsque peritum esse oportet, ut ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificium manuarium perdidicerit. Nam quum multa quotidie noua conficiendarum medicinarum ingenia inueniantur, multa etiam veterum, obliuione sepulta, iterum in lucem eruuntur, noua illi itidem quotidie discenda erunt,

esse conveniat.

15

erunt, neque semper habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculum demonstrat, ex eruditorum virorum descriptionibus ea ut discat necesse est. Quare si Latinae linguae probe peritus non fuerit, fructu novorum ingeniorum, aut omnino, aut magna ex parte expers manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione rerum minimè vulgari, aut protita, earum praesertim quae propriè ad functionem eius pertinent, cuiusmodi sunt Simplicia omnia, quorum descriptiones ex praestantissimis auctoribus petitas, ad res ipsas conferre debet, donec exactam illorum cognitionem hauriat, & prorsus imbibat. Cognita verò, visu, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitis modis saepe ac diligenter examinet, non solum ut falsa à veris, & adulterata à sinceris, verum etiam ut praestantissima à mediocribus, & mediocria à degenerioribus discernere consuecat.

Est & alia causa cur tam diligenti examine opus sit, quaedam enim alioqui ingrata & salubria, ob insignem tamen acrimoniam in vasculis aereis decocta, aut instrumentis ferreis diu tractata, tam tetrum ac horribile virus inde contrahunt, ut gustu fiant abominanda, & quovis valenti ventri-

ventriculo intolerabilia. Quare hoc quoque scire debet quo genere vasculorum & instrumentorum, vnaquæque medicina sit coquenda, tractanda, & conseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa sequitur, scilicet, vt herbas, flores, fructus, semina, radices, debito tempore colligat, & rite reponat, ne vel parum efficacia sint, vel putrescant, aut nimis arefacta, virtutem omnem amittant.

Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac variis reponendis conseruandisq. accommodas, nonnulla enim humido, pleraq. calido, quædam sicco, quædam etiam frigido loco rectius conseruantur, quam varietatem non qualibet domus præstare potest.

Diuitiæ quoque saltem mediocres adesse oportet, in primis autem animus liberalis, ab auaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, vt commodè habitet, & Medicinas quæ emendæ sunt, suo tempore quàm optimas coemat. Animus autem liberalis, minimeque auarus, cauebit, ne compendij, aut lucri sui causa, deteriores vili pretio libentius, quàm præstantissimas, paulo largiore compareret.

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter

genter collectis, coemptis & repositis, succedit industria compositarū ritè dispensandarum, vbi eum in primis vigilantem & circumspēctum esse oportet. Nec temerè confider ingenio suo in succedaneis eligendis, sed peritum Medicum consulat, quem etiam omnino in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus, ac magni momenti medicinis, vt præceptorem & iudicem adhibebit: cui adiungat, si commodè fieri poterit, vnum & alterum bonum atque doctum virum, vel Senatorij ordinis, vt eos habeat veluti testes suæ diligentiae, industriæ ac fidei. Deinde quamque medicinam sic ritè præparatam, debito ac præscripto tempore, fermentari sinat, antequam eam in vsum publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur in reiiciendis simplicibus atq. cōpositis, quàm in iisdem reponendis & componendis. Debet enim singulis mensibus, aut sæpius etiam, omnia lustrare, & diligenter considerare, vt corrupta, putria, mucosa, exoleta, & quouis modo inutilia, vel inefficacia reddita, reiiciat, bona fide, nec in iis quærat sumum lucrum, quibus aegroto crearetur vitæ periculum: sed sit, vt diximus, animo liberali & magno, cogitetque paruum

B

illud

illud damnum, fide sua iam perspecta, maioris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cum indefessam diligentiam & animum sibi semper præsentem requirant: hoc quoque obseruare conuenit, ne sit aleæ aut similibus ludis deditus, ne computationibus gaudeat, aut alioqui vinosus vel ebriosus, neque fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit: ebrietas, errores, obliuionem & stuporem inducit: turpis verò amor, etiã veneficia illi extorquere posset.

Quare omninò, si fieri potest, maritus sit, cui cum vxore rectè conueniat, liberosque habeat, quos honestè educare studeat; huiusmodi enim pignoribus obstrictus, vagas libidines detestabitur, neque illis fomenta sciens subministrabit: & posteritati suæ consulens, bonam conscientiam seruare adnitetur; nec metu, nec gratia, nec prece, nec pretio, ad vllum veneficium impelletur.

Quòd si accesserit vera pietas, hoc est, timor Dei, & fides in Christum, charitas erga proximum, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutiora, illustriora & feliciora. Tum enim cogitabit: Si quid per negligentiam in vitam aut valetudinem proximi peccauero, iudicium
Dei

Dei non effugiam : quanto minus effugiam, si sciens ac prudens venenum dederò, abortum procurauero, aut aliquod aliud ingens atque insigne flagitium designauero? Et si humanitas eorum qui infirmos & ægrotos tantum visitare solent, Christo adeò grata est, ut illud beneficium in seipsum collatum esse affirmet; quantò gratior erit illi mea cura & sollicitudo, dum studeo illis Medicinas rectè componere, tempestiuè exhibere: & non propter lucrum tantum, verum etiam humanitatis respectu operam dare, ut melius habeant & conualescant?

Hæc & similia si cogitabit, ultro, ac sua sponte, erit humanus, placidus, affabilis, benignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, & commodus erga imperitos; non enim in eorum ineptias, sed in necessitatem ægroti respiciet, ac Deum omnium inspectorem ac iudicem præ oculis habebit: qui rectè agenti longè maiora & beatiora præmia largietur, quàm ab vllò mortalium persolui possint.

CONFECTIONES AROMATICÆ.



Aromaticum Garyophyllatum descri- ptionis Mesua.

- ℞. Garyophyllorum ℥ vii.
 Macis Zedoariæ Galangæ
 Santali Machoziri Trochiscorū Diarhodon
 Cinnamomi Lignialoës Spicæ Indicæ
 * Piperis longi Cardamomi minoris ana ℥ j.
 Rosarum ℥ iiij. Glycyrrhizæ rasæ
 Galliæ moschatae veræ ana ℥ ij.
 Folij. [*Sumatur eius loco casia lignea vera,
 aut duplex pondus Cinnamomi.*]
 * Cubebæ ana ℥ ij. Ambrae ℥ j.
 Moschi ℥ ss. Sacchari optimi.

VAL. CORDI ANNOTAT.

- IN cōfectionibus aromaticis ad sacchari librā
 * unam pendente ℥ xij. accipiatur ℥ i. specierum.
 MYROPOLAE accipiant in cōfectionibus
 librā continentē ℥ xij. & secundum hanc di-
 * uidatur uncia, drachma & scrupuli. Scrupulus
 verò pēdeat grana electa xx. Nicolao præsertim.
 GALANGAE, id est, minoris Galangæ &
 rhizæ,

rufa, saporis aromatici: nam affertur hodie noua quaedam Galanga magna, crassa, foris subrufa, intus Zingiberis palliditate & filis, gustu acerrima, sine aromatica aliqua gratia, hac in nullas confectiones Galanga nomine iniicienda est. Quod semel dixisse satis sit.

SANTALVM Machoziri, est species citrini Santali, odoratissima, & valde aromatica, tam gustu quàm odore: & affertur ad nos cum santalo albo, & citrino vulgari.

GLYCYRRHIZA est dulcis radix, quam hodie vsitato nomine Liquiritiam appellant.

FOLIUM nondum allatū est ad nos in Germaniā; quare cū eo careamus, necesse est eius loco aliquod succedaneū accipere. Est autem eius succedaneū, vt Galenus nobis reliquit, Spica Indica, aut Cassia lignea vera. Cū autē hac confectio alioquin capiat Spicam Indicā, Folij vice cassiam ligneam veram accipiendam esse censeo.

MOSCHI scribendum est: nam Musci appellatione, arborum villosa canities dicitur.

PETRI Coudebergi in compositiones nonnullas, ac Val. Cordi annotationes aliquot, Scholia.

Santalum Machoz. est species, &c.] Santali citrini duas reperiri species, cū Cordum dicere

Franciscus Alexander in suo Apolline miretur, nos easdem quoque iisdem aceruis à Lusitanis Antuerpiam aduectas interdū obseruauimus. Vnam nempe (Santali albi corde ad rufedinem accedente, ignaris quandoque imponitur) inter vulgarem optimā, ex pallido rufescentem, odoratam ac aromaticam. Alteram verò prorsus luteam, aut quasi croco tinctam, odoratissimam & valde aromaticam tam gūstu quàm odore, ut & Cordus ait: atque insuper unguinosam, sed eam admodum raram. De hac itaque specie cū Cordum hīc locutum esse existimem: non obpropter tamen idipsum quartum Santalum dici debere putamus, ut Franciscus sinistrè colligit, haud secus atque nigri Piperis species plures cū sint, magnitudine, duritie, pondere atque acredine differentes, illorum aliquod quartum piper esse dici non possit. Ceterū de Santalis plura, eaque magis indubitata, quàm à quoquam hactenus scriptitatū est, qui cupit, Garçia ab horto de Aromatibus Indicis libellum, nuperrimè ex Lusitanico in Latinam linguam à Carolo Clusio conuersum, consulat.

B Folium.] Folio tribus nervis distincto, laurino simili. quod Folij Indi nomine in officinis passim prostat: Folij in medicamentis locum non incommodè

commodè obtinere possit, dum genuinum adferatur, haberiq; abunde queat. De hoc quoque pluribus Garcia libellus.

Ventriculū & cor confortat, nauseam & vomitum sedat, & valet cōtra putrefactionem in partibus ventriculi. Membra verò nutritionis calefacit, ac ventositates dissolvit & terminat.

*Aromaticum Rosatum Gabrielis,
descript. Mesuæ.*

℞. Rosarum rubrarum ℥ xv.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ vii.
Ligni aloës Santali Machoziri ana ℥ iij.
Cinnamomi electi ℥ v.
Macis Caryophyllorum ana ℥ ij. β.
Gummi Arabici
Tragacanthæ ana ℥ ij. ∅ ij.
Nucis moschatæ Cardamomi minoris
Galangæ ana ℥ j.
Spicæ Indicæ Ambre griseæ ana ∅ ij.
Moschi ∅ j. Sacchari

CARDAMOMI, videlicet minoris: nā cū simpliciter Cardamomū scribunt auctores, minus Cardamomum id est, usuale intelligunt.

MOSCHI, hoc est, ut vulgò dicitur corrupto vocabulo. Musci, pro illud aromaticum.

VENTRICULO imbecillo, aliisque nutritioni deseruientibus instrumentis succurrit. Ventriculi humiditatem, omnemque in eo putredinem emendat, concoctionem iuuat, & ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Dianisum D. Mesue.

R. Anisi electi. ʒ xx.

Glycyrrhizæ rasæ Mastiches ana ʒ j.

Carei [.i. carui.] Macis Galangæ Fœniculi

Zingiberis Cinnamomi ana ʒ v.

Macropiperis Melanopiperis Leucopiperis

Calaminthæ Pyrethri

Cassæ lignæ veræ ana ʒ ij.

* Cardamomi minoris Garyophyllorum

Cubebarum Spicæ Indicæ

Croci ana ʒ j. β. Sacchari.

MASTICHES, hoc est, ut vulgò dicitur, Masticeis.

CASSIA lignea vera debet accipi, quæ nuper cœpit afferri: figura Cinnamomi, gustu aliquantulum lubrica, & Cinnamomi æmula: at non ille parvus cortex saporis insipidi ac stiptici, ut hæctenus factum est.

CRASSIS flatibus in vētriculo natis, eisdemque perfrictioni succurrit. Pituitam in eo crudam

crudam abluunt, tussi que diuturnæ prodest.

Diambra D. Mesua.

℞. Cinnamomi Doronici
Garyophyllorum Macis Nucis Moscatae
Folij [*aut succedanei eius.*] Galāgē ana ℥ iij.
Spicæ Indicæ Cardamomi maioris
Cardamomi minoris ana ℥ j.
Zingiberis ℥ j. β.
Santali citrini Ligni aloës
Piperis longi ana ℥ ij. Ambræ ℥ j.
Moschi ℥ β. Sacchari albissimi.

CONTRA omnem corporis imbecillita-
tem efficax est, omnemq. corporis perfrictio-
nem discutit, nativum suscitatur calorem, & re-
divivum recreat, refarcitque eos qui frigido
torquentur humore. Iuvat articulos, & mem-
bris omnibus magnifice subuenit. Venticu-
lum fastidientem, quiq. cibum continere non
potest, roborat: & inappetentiam cibi summe
corrigit. Cor ipsum roborat.

Diathamaron D. Nicolai.

A

R^x. Antophyllorum
 Zingiberis ana ʒ v. ʒ j. ʒ xvj.
 Cinnamomi
 Garyophyll. ana ʒ iiij. ʒ j. ʒ iiij.
 B s Carnium

- Carnium dactylorum 3 iij. ꝑ. 6 viij.
 * Galangæ Spicæ Indicæ Zedoariæ
 Costi Pyrethri Corallij rubri
 B. Rhenpontici [*accipiaturs eius panuria rha-*
 * *barbarum sic vocatum.*]
 Saliuncæ Tragacanthæ Anacardij
 Ossium dactylorum Carpobalsami Anisi
 * Baccarum Juniperi ana 3 ij. 3 ij. 6 viij.
 Leucopiperis
 * Macropiperis ana 3 j. 3 j. 6 ij.
 Limaturæ auri puri Limaturæ argenti meri
 * Ossium e corde cerui ana 3 ij. ꝑ. 6 vj.
 Rasuræ Eboris Moschi ana 3 j. 6 vij.
 Ambra 3 j. Sacchari.

THAMAR Arabibus dactylum, palma arboris fructum significat, unde confectiois nomen
 * Diathamaron: corruptè Diacameron.

ANTOPHYLLI sunt grandes Garyophylli, qui ad maturitatem pervenerunt, nucleo intus duro bifidoq; sapore non tam acres ut Garyophylli, præterquam in superficie.

COSTI, videlicet albi, feruidum & aromaticum saporem habentis. Non vulgaris illius grandis, qui teterrimum & rancidum saporem habet, & adulterinus est, atque ex Helvetiorum alpihus & Italia ad nos affertur.

CAR-

CARPOBALSAMI. Non habentur Opebalsamum, Carpobalsamū, & Xylobalsamum secundū eorum verā descriptionem: verū cū experientia didicerimus, quod olea Cinnamomi & Garyophyllorum secundam nostram artem distillandi, veteribus ignota, parata, in probis Balsami veri, & virtutibus similia esse (quare etiam pro Opebalsamo, oleum Garyophyllorum in Theriacam nostram accepimus:) nō inconsultum esset, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Garyophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semen, quod haberet mordacitatem in gustu, cum quadā redolentia, secundum Carpobalsami descriptionem, si horū nūllum antea esset in descriptione.

SALIUNCA Germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celtica vera, quam in Pharmacopoliis Spicam Romanam appellant. Sed in Nicolae Alexandrino Greco, inuenitur loco Saliunca Elelissphacum, id est, Salvia, praesertim in Auroa Alexandrina.

LIMATURA auri & argēti. Cū aurum sit metallicū & valde ponderosum corpus, limatura eius vel scobs semper fundū petit, nec aequaliter confectionibus cōmiscetur; quare & hic, & reliquis omnibus locis, sumantur folia auri.

P. C.

A *Pondera apud Cordum hacce in compositione deprauatissima restitui: sed non veluti L. Fuchsius ex suo Myrepso vult, bocce in medicamento, innumerisq; aliis corruptissimo.*

B *Corallium album, quod à Cordo perperam appositum erat, deleui.*

EFFICACITER prodest difficulter spirantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis & omni thoracis & stomachi offensa: Aquæ subter cutem fusæ, renum doloribus: Voluptatem parit, corporaque saginat.

Diacalaminthon D. Mesuæ.

℞. Calaminthæ montanæ
Calaminthæ campestris Seselios
Petroselini Macedonici ana ʒ vj.
Zingiberis ʒ iij. Seminis Apij
Comarū Thymi ana ʒ ij. Ligustici ʒ vj.
Piperis ʒ xij. Sacchari albissimi.

CALAMINTHA montana nascitur copiosissimè in montibus circa Confluentiam urbem ad Rheni & Mosellæ confluentes.

CALAMINTHA campestris, hoc est, vsualis Calamintha, quæ in aruis nascitur (Mesuæ fluuiatilem requirit) hac enim efficacior est,

est, quàm in humidis locis nata. Germanicè Kornmyntz vocatur.

SESELIOS, id est Sifelios, quod etiam Siler montanum vocatur.

COMARVM Thymi, id est, summitatum foliorum, & florum Thymi.

PETROSELINVM Macedonicū non est Olsatrum, vel, ut corruptè pronūtiant, Olixatrum, aut Alexandrum; semine oblongo, magno, nigro, amaro, ac myrrham amulante sapore. Sed quia iam vero Macedonico Petroselino caremus, licet nobis eius loco Olsatri semen accipere (quod vulgò in Pharmacopoliis Petroselinum Macedonicum, falsò tamen, appellatur) donec aliquando verum nobis contingat.

PIPERIS, id est, piperis nigri: nam cum piper simpliciter pronuntiamus, semper nigrum intelligimus.

AVXILIATVR iis quos cibi fastidium urget, appetentiam reuocās: ægrè quoque spirantibus, ventriculo refrigerationē sentienti, & flatibus distento, confert.

*Diacalaminthon Galeni, Sanitatis
tuende lib. 4.*

R2. Calaminthæ Pulegij Petroselini

Sese-

Seselios ana ℥ j.

Apij Cacuminum Thymi ana ℥ ij.

Ligustici seminis ℥ viij.

Piperis ℥ xxiiij. Sacchari

* CRASSA ac lenta attenuat & discutit,
vrinas mouet, ac mulieribus menses.

Diacuminum D. Nicolai.

* R. Cumini præparati [*id est, pridie in aceto in-*
fusi, & iterum exiccati] ℥ viij. ʒ j.

Cinnamomi

A Garyophyllorum ana ℥ ij. ʒ.

Melanopiperis

Zingiberis ana ℥ ij. ʒ v.

Galangæ

Thymbrae [*eius loco sume Satureiam.*]

Calaminthæ ana ℥ j. ʒ ij.

Anmios

Ligustici ana ℥ j. ʒ xvij.

Macropiperis ʒ j.

Spicæ Indicæ Cardamomi

Nucis Moschatæ ana ʒ ij. ʒ.

Sacchari.

THYMBRA est propriè Satureia siluestris,
circa quam nascitur Cuscuta Epithymo similis,
qua Epithymum appellatur. Affertur iam ad

nos

nos ex Orientalibus partibus, verum raro, ideoq;
in defectu eius satiuam Thymbraam, hoc est, Sa-
tureiam accipere nobis licet.

P. C. SCOL.

Ana ℥ ij. β.] *Cacutit Fuchsius, ℥ iij. ℥ ij. A*
ex Pseudomyrepso suo legendum existimans.

ARTERIACIS, difficultati spirandi, tus-
siculosis, inflationibus efficaci est adiuumento.
Noxam ventriculi corrigit, concoctionem ad-
fert, adstrictionum vitia sanat.

Diacinnamomum Mesue.

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Rx. Cinnamomi tenuis | ℥ xv. | A |
| Cinnamomi crassi boni | | |
| Enulæ ana | ℥ iiij. | B |
| Galangæ | ℥ vij. | |
| Garyophyllorum | | |
| Piperis longi | | |
| Cardamomi maioris | Cardamomi minoris | |
| Zingiberis | Macis | |
| Nucis moschatæ | | |
| Ligni aloës ana | ℥ ij. | * |
| Croci | ℥ j. | |
| Sacchari tabarzeth | ℥ v. | |
| Sacchari albißimi. | | |

SACCHARI tabarzeth, idest, purissimi
atq. optimi Sacchari, cuius ℥ v. miscetur specie-
bus:

bus: idq; idèd hoc loco accipitur, ut species eò melius cõseruentur ad vsum. Vltimùm Saccharum additur, cùm vis rotulas facere ex speciebus.

P. C. SCHOL.

A Cinnamomi tenuis, Cinnamomi crassi,]
 Per Darseni vel potius Darchini, lignum Chinen-
 nense, seu lignum odoratum, hoc est Chinamomum,
 tanquam China amomum, siue Cinamomum
 intelligunt Persæ atque scriptores Arabes;
 cortices quandoque ligna appellantes, ut
 Xylöcinnamomum Græci. Quod interim crassi
 corticis est, Cinnamum vocant. Per Darseni
 Cinami igitur, Cinamomum crassi corticis,
 tanquam ligneum significare volunt; est enim
 & in genere crassioris Cinamomi, quod & valde
 bonum est, hoc est, acre, odoratum ac aromaticum.
 Nec caret hac Mesuæ mens, ubi crassum
 Cinamomum requirit, suis rationibus: quas
 perpēdat Francisci Alexand. Apollo oportet.
 Itaque Cinnamomum tenuis corticis electum,
 per se, aequè atque per Darseni Cinami,
 crassi corticis Cinamomum bonum, distinctim
 cum Cordo hic interpretandum, intelligendū atque
 legendum existimo: utrumque tanquam in
 suo genere optimum. De Cinnamomo autem &
 Casia, Garçia de Aromatibus librum quem
 dixi

ixi, consule: ubi doctissimorum etiam hactenus
virosum de hisce rebus altercationes, aniles,
rorsusque futiles esse animaduertes.

Cyminum à Cordo huic medicamento temerè **B**
impositum, hortante & id quoque Fuchsius, Mo-
nachis id prius monstrantibus, expunxi.

EST medicina salubris ad humorositatem
ventriculi, & putrefactionem in eo. Phlegma
digerit, & digestionem adiuvat.

Dianthos D. Nicolai.

℞. Florum Rosmarini ʒ j.
Violarum Rosarum
Glycyrrhizæ ana ʒ vj.
Garyophyllorum Spicæ Indicæ
Nucis moschatæ
Galangæ Cinnamomi
Zingiberis Zedoariæ
Macis Ligni aloës
Cardamomi Anisi
Anethi [videlicet seminis] ana ʒ iij.
Sacchari.

PRODEST præter rationē tribulatis, car-
diacis, animi lætitiā auget. Eos roborat qui
longo morbo debiles adhuc sese recolligunt,
ventriculum perpulchrè emendat.

C

Dia-

Diamargariton frigidum.

D. Nicolai.

ʒij. Nucleorum sem. Citrulli
 Cucurbitæ Melonis Cucumeris
 Seminis portulacæ
 Papaueris albi
 Santali albi
 Santali moschatellini [id est, Citrini boni odo-
 Ligni aloës Zingiberis (ris.)
 Rosarum rubrarum
 Florum Nymphææ albæ [id est, Nenupharis.]
 Florum Borraginis
 Myrtillorum verorum ana ʒ i.
 Corallij albi
 Corallij rubri ana ʒ ʒ
 Margaritarum ʒ iij.
 Sacchari.

NUCLEVS seminum, est ipsa in medio se-
 minum medulla. Sunt autem eximendi horum
 seminum nuclei, cum iam preparanda est confe-
 ctio hac aut alia, qua durare debent: nam diu
 antè exempti rancidi fiunt.

OMNEM virium imbecillitatem firmat,
 iis quos animus deficit, siue à corde siue à sto-
 macho deliquium originem ducat, omnem.

NOXÆ

noxa causam vitalium partium discurit. Insuper asthmaticis, ruffientibus, tabidis auxiliatur. Longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur conducit.

Diamargariton calidum

D. Auicenna.

℞. Margaritarum non perforatarum

Pyrethri ana ʒ j. Zingiberis

Mastiches ana ʒ iiij.

Zedoariae Doronici.

Seminis apij Cassia.

Cardamomi Nucis moschatae

Macis Cinnami ana ʒ ij.

Been albi. Been rubci.

Piperis

Macropiperis ana ʒ iiij.

Cinnamomi ʒ v.

Sacchari

A

B

C

D

E

F

G

H

P. C. SCHOL.

Zedoariae.] Auicenna exemplaria editionis Apianultima, Zurumbet, postrema autem à Valgrisio inquam exhibita, Zedoarie legunt, ut hinc vorum harum & rerum vicinitatem atque ambiguitatem (de quibus à plerisque concertatur)

C 2

tur)

tur) tibi expendendam nunc relinquam.

B Doronici.] L. Fuchsius Doronicum hic expunxit, quod tamen omnia Auicenna exemplaria aptissimè etiam recipiunt.

C Casia.] Cum Cordus huius loco rad. Tapsia pessimè haberet, correctiora Auicenna exemplaria Seit aragi legunt, nonnulla Capsia: quod non nisi Casia est. Nam ineptiores Itali etiā Casiam addita p ante s Capsiam scribere solent. Seytaragi autē cum plura significata habeat, littera vnius forsitan aut carentia, aut mutatione (ut in plurimis dictionibus usu venit) quandoq. Lepidiū designat, quandoq. Casiam: quam hic intelligendā, commodissimèq. indendā dico. Quare Francisci Alex. Apollinis stupidā pertinaciam, Fuchsius etiam mihi astipulante, demiror: Tapsiam hic (medicamento huic adeò iniquam) sumendam esse mordicus defendentis. Interim non tantum quomodo C in T mutata, sed Radicis vox accedere quī potuerit, forsā exclamabitur: verūm Lacones habeo hic mihi imperantes.

D Cinnami.] Hac voce Cordus carebat, æquè atque Been albi. In Auicenna Cherse legitur, quod Cinnamum interpretantur.

VALET mulieribus, rectificat enim dispositionem matricis, & ventriculorum earum.

Dia-

Diamoschum dulce D. Mesua.

ꝛ. Croci Doronici
 Zedoariæ Ligni aloës
 Macis ana 3 ij.
 Margaritarum albarum Serici crudi tosti
 Charabæ [*id est, Succini.*]
 Corallij rubri ana 3 ij. β.
 Gallia moschata veræ
 Ocimi citrati ana 3 j. β.
 Been albi Been rubri
 Folij [*aut succedanei eius.*] Spicæ Indicæ
 Garyophyllorum ana 3 j.
 Zingiberis Cubebarum
 Piperis longi ana 3 j. β.
 Moschi 3 ij.
 Sacchari albi.

OCIMUM citratum non est Melissa, sed species quædam Ocimi siue Basilici, odore Melissa aut citrei mali, cuius defectu, garyophyllatum Ocimum sumi potest.

PRODEST contra cordis palpitationem: ei quoque cui tumultuosa insomnia obuersantur, item iis qui incertis timoribus corripuntur. Malis cerebri frigidis, vertigini, comitialibus, & difficulter spirantibus succurrit.

C 3

Dia-

Diamoschum amarum D. Mesue.

- ℞. Croci Doronici
 Zedoariæ Ligni aloës
 * Macis ana ʒ ij.
 Margaritarum albarum
 A Serici crudi tosti Charabæ
 * Corallij rubri ana ʒ ij. β.
 Galliæ moschatae veræ
 * Ocimi citrati ana ʒ j. β.
 Been albi Been rubri
 Folij [aut succedanei eius.]
 Spicæ Indicæ
 Garyophyllorum ana ʒ j.
 Zingiberis Cubebarum
 Piperis longi ana ʒ j. β.
 Moschi ʒ ij.
 Absinthij
 * Rosarum ana ʒ iiij.
 * Aloës lotæ ʒ iiij.
 Castorei
 Ligustici ana ʒ j.
 Cinnamomi ʒ ij. β.
 Sacchari.
 * SERICVM crudum tostum significat Serica bombycis vellus, nullo colore tinctum, nulliq;
 humori

humori aut succo qui tingendo sit, incoctum: sed tale quale natura est, fictiliq; inditum, ac donec conteri possit tostum aut assatum, vulgò dicitur Sericum vstum, quamuis comburi non debeat, sed torreretur aut assari tantum.

P. C. SCHOL.

Setam pro Serico Cordus undique barbare legebat.

Hæc confectio valentior est ad ea quæ supra dicta sunt: & propriè ad exiccandum humiditates ventriculi, & putrefactiones eius.

Diagalanga D. Mesue.

℞. Galangæ

Ligni aloës ana 3 vi.

Garyophyllorum Macis

Ligustici ana 3 ij.

Zingiberis Macropiperis

Leucopiperis Calami aromatici

Cinnamomi ana 3 j. β.

Calaminthæ siccæ Mentæ siccæ

Cardamomi maioris

Spicæ Indicæ Seminis Apij

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Seminis Carni ana 3 j.

Sacchari albissimi

C 4

P. C.

A 3. vi.] Legendū esse 3. vi]. Fuchsius rectē
monet, non 3. vii. ut Cordus malē habebat.

VALET aduersus crassiores flatus, acidos
ructus, prauamq. concoctionem. item actio-
nes ventriculi & iecoris à frigiditate impedi-
tas, robustiores reddit, easdemque emendat.

Diapenidion D. Nicolai.

* R. Penidiarum 3. ij.

Pincarum

A Amygdalorum dulcium

Papaueris albi ana 3. iij. 3. j.

A Cinnamomi

Garyophyllorum

Zingiberis Succu Glycyrrhizæ

Tragacanthæ Gummi Arabici

Amyli candidissimi

Seminis enucleati Cucurbitæ

Citrulli

Cucumeris

Melonis

ana 3. j. 3. ij.

* Camphoræ 3. β.

* Sacchari albissimi.

AMYLVN hodie corrupto vocabulo dicitur
Amydnum.

Deleui Amygd. amaras, quas Cordus perpe- A
am addiderat.

VALET aduersus omnē thoracis noxam, tuf-
 m à frigore contractā, vocis iacturam, tabidis
 enique & purulenta excreantibus succurrit.

Diarris simplex.

Ireos ℥ β. Sacchari candi
 pecierum diatragacanthi frigidi ana ℥ ij.
 acchari albissimi.

POTESSE ferē eadem quod sequens, licet
 imbecillius.

Diarris Salomonis, ex Nicolao.

Iridis ℥ j.
 Pulegij Hyssopi
 Glycyrrhizæ ana ℥ vj.
 Tragacanthæ
 Amygdalorum Pinearum
 Cinnamomi Zingiberis
 Piperis ana ℥ iij.
 Caricarum Passularum enucleatarum
 Carnium dactylorum ana ℥ iij. β.
 Styracis calamitæ rubæ [potius rufa, legis
 P. C.] ℥ ij. ℥ j.
 Sacchari albissimi.

C s

TVSSI-

Tussiculosis, difficulter spirantibus auxiliatur, abscissæ vocis iacturam refarcit, quæ refrigeratione contracta sit.

Diatragacanthum frigidum

D. Nicolai.

℞. Tragacanthæ albiſſimæ ℥ ij.
 Gummi Arabici ℥ i. 3 ij.
 Amyli ℥ β.
 Glycyrrhizæ
 Nucleorum ſeminum Cucurbitæ
 Cucumeris Citrulli
 Melonis ana 3 ij.
 Camphoræ 3 β.
 Penidiarum 3 iij.
 Sacchari albiſſimi.

Medetur omnibus pulmonū & thoracis vitiiſ aridis, maximè tabidis, macie cōfectis. Inflammatione lateris laborātibus, omnibuſq. tuffibus calidis & ſiccis, exaſperationi linguæ & fauciu. Deuoratū tam diu ægrotans in ore contineat, quò ad liquefactum perfectè exugatur.

Diatragacanthum calidum

D. Nicolai.

* ℞. Gummi Tragacanthæ ℥ iij.
 * Hyſſopi Pineorum nucleorum
 Amygda-

nygdalorum amborum, purgatorum
 minis Lini ana ʒvj. Seminis foenigræci
 minnamomi ana ʒβ.
 Glycyrrhizæ rasæ Succiglycyrrhizæ
 Zingiberis ana ʒij.
 Sacchari albi.

Valet tussientibus ex frigido phlegmate, &
 non valentibus elicere. asthmaticis, empyicis,
 helosis, suspitiosis, peripneumonicis, pthi-
 sis, & ad omnem coarctationē pectoris, sto-
 machum confortat, digestionem procurat.

Manus Christi perlata.

Sacchari clarifacii ℞ij.
 Rosarum ℞β.

Concoquantur dum aqua rosacea igni eua-
 lescat, & saccharum iustam crassitiē cōsequa-
 tur, in fine margaritarum minutissimè trita-
 tum ʒβ. addatur, atque super marmor aqua ro-
 sacea inspersum infundatur, & fiant rotulæ.

P. C. SCHOL.

*Quantis cachinnis Cordus, & tanquam caci-
 co duce Fuchs. Colonienses medici, ac Fran-
 cisci Alex. Apollo, vel pueris Pharmacopœorū,
 hoc scripto sese deridendos exhibuerint, vix ex-
 rimari possit: ut hinc non tractari à fabris fabri-
 lia,*

lia, lucidè cerni queat. Eo pacto quod huiusce
modi imaginariis, extraq̃ arenam Medicorum
quorundam scriptionibus, nullā debitā miscend
conficiendiq̃ rationem, ut neque modum, & eo
consequenti parū aut nihil artis sua frugis, ope
risq̃ manuarū commodi, haurire discerēne pos
sint Pharmacopœi: ni margaritas, oleum &
operam omnem frequentissimè perdere, ac vitia
tas materias porcis obiicere velint.

MEDETUR deiectis viribus, ardentibus fe
bribus, & imaginationes falsas abolet.

Diahyssopum D. Nicolai.

℞. Hyssopi Ircos Thymi
Melanopiperis ana ℥ xxx.
Pulegij
Thymbra [eius loco sume Satureiam.]
Rutæ Cumini ana ℥ xx.
Carnium dactylorum
Tragacanthæ Glycyrrhizæ
Caricarum pinguiū Passularū enucleatarum
Fœniculi ana ℥ x.
Zingiberis Sem. Anisi
Carui
Ligustici ana ℥ v.
Sacchari.

Accom-

Accommodatum est ad capitis querelam ex
 rigido. vnam exiccat, arterias purgat, tussim
 impescit, omnes frigiditates pectoris & sto-
 machi emendat; digestionem procurat, pleu-
 riticis & empyicis mirabiliter opitulatur.

Diacostum D. Mesue.

Costi candidi, aromatici, amari
 Asiae lignae verae Cinamomi ana 3 v.
 Seminis Apij Seminis Anisi
 Schoenanthi
 habarbari ana 3 iij.
 Asari 3 iij.
 Croci Aristolochiae
 Myrrhae ana 3 ij.
 Sacchari.

SCHOENANTHI, hodie corrupto nomi-
 ne, dicunt Squinanthum.

COSTI AMARI coepit hisce annis affer-
 ri loco veri costi adulterinus quidam, qui ne-
 quaquam accipiendus est, ut supra dictum est.
 Sed candidus, amarus & aromaticus.

ASARI, id est, radicum eius; sola enim radi-
 ces ad medicinam accipi debent.

VALET ad dolorem viscerum & oppila-
 tionem in eis, & ad principium hydropisis.

Dia-

Diarhodon Abbatis, ex Nicolao.

℞. Santali albi

Santali rubri ana ʒ ij. β.

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Spodij ana ʒ ij.

Asari

Massiches

Spicæ Indicæ

Cardamomi

Succi Glycyrrhizæ

Crocī

Xyloaloës [*id est, ligni aloës.*]

Garyophyllorum

* Galliæ moschatae Nicolai

Anisi

Foeniculi

Cinnamomi

Rhabarbari

Seminis Ocimi

A Berberis [*id est, acinorum eius.*]

B Seminis Scariolæ Seminis Portulacæ

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citulli

Cucumeris

Melonis

Seminis Papaveris albi ana ʒ j.

Margaritarum

Ossis e corde cerui ana ʒ β.

Sacchari cadi [*ut eodem melius species cōseruentur.*]

Rosarum ana ʒ j. ʒ ij.

Camphoræ ʒ vij.

Moschi

oschi ꝑ iij. ꝑ.
 chari albiſſimi.

SCARIOLA propriè eſt Endivia illa vul- B.
 ris, qua in dorſo foliorum eſt ſpinoſa. Quid
 vera ſit Endivia, ubi locus poſtulauerit,
 emus.

P. C. SCHOL. (gri.

erberis.] acini ſunt hic fructus Berberis ante- A
 Scariola.] Cordum nō nouiſſe Scariolam hoc B
 erine vulgarē admodum plantā. monente ꝑ.
 Francisco Alex. ſatis liquet; ex eo quòd in fo-
 rum dorſo eam ſpinoſam faciat, vt. Sonchum
 oculis habuiſſe videatur.

V A L E T aduerſus ventriculi calorem, ieci-
 ris, lienis, pulmonumq̃ue. Contra viſcerum
 dolores, & omnem totius corporis noxam à
 dolore proficiſcentem.

Dialacca maior D. Meſua.

Laccæ præparatæ [eius præparatio in ſino
 habebitur.]

habarbari ana 3 iij.

ficæ Indicæ

laſtiches.

Apij

oliculotum Schœnanthi Abſinthij

ucci Eupatorii Meſuæ

Ammios

Ammios Sabinæ

Amygdalorum amarorum

Costi Myrrhæ

Rubeæ tinctorum Fœniculi

Anisi Asari

A Aristolochiæ rotundæ veræ

Gentianæ Croci

Cinnamomi Hyssopi

Casia lignæ veræ Summitatū Schœnanthi

Bdellij ana ʒ j. β.

Piperis

Zingiberis ana ʒ j.

Sacchari albißimi.

COLICVLORVM Schœnanthi.] herbi
hæc aromatica à Græcis dicitur σχοίνον, id est
Schœnus, & significat iuncum aromaticum, qu
hactenus improprie dictus est Squinanthū. Nam
Schœnanthum siue σχοίνον ἀνθόν, significat iun.
ci huius aromatici florem, qui non affertur ad
nos. In hanc autem compositionē ingreditur bis
Schœnanthum, hoc quidem loco coliculi aut sti-
pites eius, inferius verò summitates eiusdem.

SUMMITATVM Schœnanthi, id est, flo-
rum eius: nam flores in summitate huius herba
constituti sunt, & proprie Schœnanthum appel-
lantur: sed quia flores non ad nos feruntur, cogi-

mur

ur tenerrimas eius partes in sacumine decer-
as, eorum vice medicamentis miscere.

SVCCI Eupatorii] hic succus non debet fieri B
vulgaris Eupatorio, neque ex Eupatorio Gra-
rum, id est, Agrimonia falso hodie vocata,
d ex Eupatorio quod Mesue describit. Est au-
tem Eupatorium Mesue ea herba, qua ab Italis
dicitur Gratia Dei, siue Gratiola, cuius ma-
nus est prouentus Wittemberge, in pratis ad
Albim fluvium fitis.

P. C.

SCHOL.

Aristolochiam longamerroneè in contextum A
Cordo intrusam, deleui.

Succi Eupatorii.] Gratiola vocata, purga- B
ria herba, foliis hyssopi, Eupatorium Mesue
nunc dubio, ut & L. Fuchsius, Mathiolus, ac
Franciscus Alex. rectè monent, esse non potest.
Satius igitur erit, Ageratum Dioscoridis, quod
& hodie Eupatorii Mesues nomen obtinuit, in
ius locum substituere, donec melius doceatur.

V A L E T aduersus frigus ventriculi, obstru-
ctiones, inflationes iecinoris, & renum duri-
as sanat. aquæ inter cutem causas omnes
discutit. menses ciet, flatuosos spiritus ab alto
corpore abigit.

D

Dia-

*Diacurcuma, id est, Διά κροκῶ
maior D. Mesura.*

| | |
|------------------------|---|
| Rz. Croci | Alari |
| Petroselini Macedonici | |
| Dauci | Anisi |
| Apij | ana 3 iiij. |
| Rhabarbari | Meu |
| Spicæ Indicæ | ana 3 vj. |
| Costi | Myrrhæ |
| Casæ lignæ veræ | Schoenanthi |
| Carpobalsami | [aut aliquod succedaneum, ut superius significatum est.] |
| Rubæ tinctorum | |
| Succi Absinthij | |
| Succi Eupatorii Mesuræ | [i. Gratiola.] |
| Opobalsami | [aut aliquod succedaneum, siue oleum Garyophyllorum, aut aliud crassum odoriferum oleum.] |
| | ana 3 ij. |
| Calami aromatici | |
| Cinnamomi | ana 3 j. β. |
| Scordij | [videlicet veri.] |
| * Scolopendriæ | [ceterach, intellige.] |
| Succi glycyrrhizæ | ana 5 ij. β. |
| Tragacanthæ | 3 j. |
| Sacchari albissimi. | |

Con-

AROMATICAE.

57.

Confert ad ægri tudines antiquas, & cache-
 riam, & ad hydropisim iuuamentū est mani-
 festū, & eradicat ægri tudines hepatis & lienis
 chronicas, quæ iā induratæ sunt, & confert ad
 corruptionem stomachi, & humiditatem fri-
 gidam, & ventositates grossas in eis, & ad do-
 lorem renum & vesicæ, & urinam prouocat.

Diaprasium D. Nicolas.

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| Prassij | 3 | v. β. |
| Tragacanthæ | Pinearum mundatarum | |
| Mygdalorum dulcium | | |
| Pistaciorum | Carnium dactylorum | |
| Caricarum pinguium | | |
| Passularum enucleatarum | ana | 3 iij. β. |
| Cinnamomi | | |
| Garyophyllorum | | |
| Nucis moschatæ | | |
| Macis | Ligni aloës | |
| Galangæ | Spicæ Indicæ | |
| Zingiberis | Zedoariæ | |
| Glycyrrhizæ | Rhapontici | |
| Anacardij | Syracis calamitæ | |
| Galbani | Terebinthinæ | |
| Mastiches | Myrrhæ | |
| oreos | Aristolochiæ rotundæ | |

D 2

Cor.

Corticum radicum Capparis

Gentianæ Melanopiperis

Anisi Fœniculi

Anethi Apij

Petroselinij Macedonici

Saxifragiæ ana ʒ ij.

Hermodactylorum

Origani Peucedani

Schoenanthi Cardamomi

Leucopiperis

Carui Ligustici

Viaceroxici ana ʒ i. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.

Balsamiæ Pulegij

Dictamni Cretici

Costi Pyrethri

Thymbræ Basiliconis

Præniæ [videlicet radicis eius aut seminis.]

Macropiperis. Amomi Sinoni

Orobiveri ana ʒ i. ʒ. ij. ʒ.

Xylobalsami [aut succedaneum aliquod simili-
le descriptioni Xylobalsami.]

Casie fistulæ

Corallij rubri Rasuræ Eboris

Carpobalsami [aut aliquod succedaneum, ut
suprà]

Dauci Cretici ana ʒ ʒ.

Moschi

Moschi Ambrae

Ossis è corde cerui ana ḡ xliij.

Sacchari albiſſimi.

SAXIFRAGIA in Italia dicitur ea herba, quam in Germania Pimpinellam vocamus. Itali habent diuersam Pimpinellam.

BALSAMITAE. } Nicolaus Alexandri-
nus Latinè impressus, non Balsamitam habet, sed Balsamum: significat tamen Balsami vox, nonnunquam etiam Mentam: cuius species est Balsamita hoc loco recipienda: nam si Balsami liquorem intellexisset Nicolaus, non simpliciter Balsamum, sed Opobalsamum posuisset.

SINONVM secundum Matthæum Syriaticum, est Petroselinum agreste. Sed de eo infra in annotationibus Aureæ Alexandrina.

CASIAE fistula nomine hoc loco nequaquam debet intelligi Casia fistula, cuius nigra medulla bilem per aluum purgat; sed Casia lignea aromatica, qua Cinnamomo similis est: nam hac etiam apud probatos veteres auctores Casia fistula vocatur.

DAUCVS Creticus hodie ignotus est, ideo B possumus eius loco Seseli Creticum accipere, id est, Berovurtz, aromaticam herbam foliis feniculi, sed multò minoribus.

D 3

P. C.

A Balsamitæ.] Cum Nicolai codex, ut & Cordus fatetur, Balsami legat; eo non herba Balsamita vocata, neque cum Fuchsio Balsami veri folia, sed oleū seu succus veri Balsami, Opobalsamūne hic intelligendum esse existimo.

B Daucus Creticus.] Berovurtz Germanis vocata herba, seu Foeniculus porcinnus Belgis, non est Seseli Creticum, ut neque Daucus Creticus, sed potius Meū Diosc. aut illi proximum. Daucus autem Creticus verus, Diosc. delineationi admissim conueniens semine acri, albo, hirsuto, oblongo, nuperrimè cognosci cœpit, virétque in hortulo hodie, inter plurimas raras plantas, nostro.

Sanat capitis vertigines, oculorum caligines abstergit, palatum & arterias purgat, distillationem vix astringit, dentium dolorem mitigat. Asthmaticis & suspiriosis peculiariter opitulatur; pectoris & pulmonis causas faciliè amputat. Stomachi & hepatis dolores & debilitates sedat, spleneticorum & pleureticorum angustias paragonisat, omniū interaneorum vitiiis prodest, inflationes & torsiones ab eis aufert. Nephriticos, calculosos, stranguriosos & colicos purgat, & dolorem releuat. Sæpius

1998

of Germany

卷之四

2. 1861



Dia-

Diaxylo aloës D. Mesua.

℞. Ligni aloës crudi

Rosarum ana ℥ j.

Caryophyllorum spicæ Indicæ

Macis Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ Mesuæ Cubebarum

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

* Zingiberis Mastiches

Cinnamomi

Cyperī Schœnanthi

Zedoariæ Been albi

Been rubri

Folij [aut macis, siue spica nardi.]

Serici crudi Margaritarum

Coralli rubri Charabæ

Foliorum citrei mali Corticum citrei mali

Ocimi garyophyllati

Silymbrii Mentæ siccæ

Sampsochi [id est, Maiorana.]

Piperis longi

Zingiberis ana ℥ iiij.

Moschi boni ℥ j.

Ambre ℥ j. β.

Sacchari albiissimi.

CYPE.

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi: nam
tunda radices Cyperi propriè & simpliciter ab
actoribus Cyperus vocantur. Longis verò ra-
cibus Cyperus, vocatur ab iisdem Cyperis.
Quoniam verò non semper rotundum habere li-
t, necesse est in paupertate eius, longo uti.

SISYMBRIVM est menta aquatica mi-
ricantibus, ut purpura, caulibus.

PRODEST malis vetriculi, cordis & ieci-
toris frigidis, animæ defectioni, concoctioni-
que. Oris foetorem abigit, lætitiāque parit.

Diatrion pipereon Mesue.

| | |
|-----------------|---|
| 2. Macropiperis | Melanopiperis |
| Leucopiperis | ana 3 v. |
| Zingiberis | Thymi |
| Anisi | ana 3 ij. |
| opica Indica | Ammios |
| Amomi | [quod nō habetur, & loco eius capiuntur carpesium sine cubeba, aut calamus aremati- cus officinarum, qui pro vero acoro habetur.] |
| Cinnamomi | ana 3 j. |
| Cassia lignea | Seminis Apij |
| Seseliros | |
| Asari | |
| Enulæ sicca | ana 3 β. |
| | D 5 |
| | Sacchari |

Sacchari albiſſimi.

Refrigerato ventriculo, & acido ructu
quartanis, exolutis, iecinorosis, & inflationib
bus auxiliatur. Item ruſſientibus.

Diazingiber D. Nicolai.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| ℞. Zingiberis | Galangæ |
| Garyophyllorum | Cinnamomi |
| Nucis moſchatae | Granorum paradisi |
| Piperis longi | Macis |
| Cardamomi | Spicæ Indicæ |
| Rhabarbari | Rosarum rubrarum ana ʒ xv. |
| Pincarum mundatarum | ʒ β. |
| Phisticorum [id est, pistaciorum.] | ʒ ij. |
| Aniſi | Fœniculi |
| Glycyrrhizæ raſæ | Croci ana ʒ β. |
| Sacchari albiſſimi. | |

Ventriculum roborat & firmat.

Electuariam Ducis D. Nicolai.

| | | |
|-------------|------------|-----------|
| ℞. Aniſi | ʒ ij. | ʒ xv. |
| Glycyrrhizæ | | |
| Mastiches | ana ʒ ij. | ʒ v. |
| Cinnamomi | | |
| Chamædryos | Zingiberis | |
| Galangæ | Fœniculi | |
| Carui | ana ʒ j. | ʒ xv. |
| | | Xylocasie |

| | |
|---|---------------|
| Calaminthæ | |
| Pyrethri | |
| Piperis albi | Piperis longi |
| Piperis [scilicet rotundi.] | |
| Ireos | |
| nomi [aut succedaneum eius.] | |
| lij [aut succedaneum eius.] | |
| fari ana 3 j. | |
| Croci | |
| Tragacanthæ | |
| Calami aromatici | |
| Garyophyllorum | |
| Seminis Olusatris | |
| Seselios | |
| entaphylli [videlicet radicem eius.] | |
| Seminis Asparagi | |
| Seminis Citri | |
| Galacori [aut loco eius Galanga.] | |
| Rhabarbari | |
| Nucis myristicæ [id est, nucis moschata.] | |
| Seminis Aloës | |
| Seminis garyophyllati | |
| Milij solis | |
| Seminis Saxifragiæ | |
| Nucleorum seminis Citrulli | |

Cucume.

Cucumeris

Melonis

Cucurbitæ

Seminis Scariolæ

Petrofclini

Been albi

Been rubri

Styracis calamitæ

Cardamomi ana ʒß. ʒv.

Penidiarum ʒ iiii. ʒ ij. β.

Sacchari albiſſimi.

CHAMAEDRYOS, videlicet vera, quae
folia habent similia quercus. nascitur in monti-
bus Iena, & inter Herspruck atq. Ambergam.

OLVSATRISemen, est magnū semen quod
in omnibus Pharmacopoliis dicitur Macedoni-
cum, siue Petroselinum Macedonicum.

Valet ad indigestionem & ventositatē sto-
machi & intestinorū, & ilei dolorē & lapidis.

Electuarium de Gemmis D. Mesua.

℞. Margaritarum albarum 3 iij.

Sapphiri Hyacinthi

Sardæ Granatorum

Smaragdi ana 3 i. B.

Zedoariae Doronici

Corticum Citrei mali Macis

Seminis Ocymigaryophyllati ana ʒ ij.

Corallij

Crallij rubri Charabæ
 furæ Eboris ana ʒ ij.
 en albi Been rubri
 ryophyllorum
 ngiberis Piperis longi
 cæ Indicæ

lij [aut succedanei eius]
 oci

rdamomi ana ʒ j.
 ochiscoreum Diarhodon
 igni aloës ana ʒ v.
 onamomi Galangæ
 rumbeth ana ʒ j. β.

oliorum Auri
 oliorum Argenti ana ʒ ij.
 mbræ ʒ ij. Moschi ʒ β.
 acchari albißimi.

SAPPHIRVS & Smaragdus qui passim in
 tyropoliis habetur, nihil valët, cum flammam
 ant in igne, & ex argentifodinis colligantur:
 uare omittendi sunt, aut loco eorum, de Hya-
 ntho & Granato maius pondus sumatur.

SARDA est gemma qua neotericis Carne-
 vocatur; quod diligenter est notandum. Ha-
 tenus enim qualis esset gemma Sarda; ignora-
 imus omnes.

Z V R V M

ZURUMBETH est species Zedoaria, quæ radicem habet rotundam & globosam, & affertur cum Zedoaria longa.

P. C. SCHOL.

A Zurumbeth est spec.] Inter tres Zedoariæ species quæ Antuerpiam aduehuntur radiculæ oblongis, quartum quid optimo Zedoario potissimum inmixtum reperitur, rotundis globulis & ea propter truncosa Zedoaria à Materialistis nostris vocitata: hac utentur zurumbeth loco Pharmacopœi, & Garciam ab horto d' Aromatibus Indicis hisce de rebus consulant plura noscere qui voluerint.

Malis cordis, ventriculi, cerebri, iecinoris, & vteri frigidis auxiliatur. Item palpitacioni cordis, defectioni animæ, ac concoctioni, tristitiam denique citra causam ortam amouet.

Electuarium Iustinum D. Nicolai.

R. Cinnamomi

Folij [ant succedanei eius.]

Costi

Nardi [id est, Spica Indica.]

Cassie lignæ

Aristolochiæ longæ

Aristolochiæ rotundæ Enulæ campanæ

Hyssopti

Pulegij

Artemisiæ

Per-

Antaphylli [*videlicet radicis eius.*]

Cucopiperis Orobi veri

Petroselini Ligustici

Busatri [*.i. Petroselini Macedonici vocati.*]

Seminis Vrticæ

Milij Solis

Xifragiæ seminis [*sumatur eius loco semen
bimpinella nostræ, Germanorū videlicet, non
Sanguiserba vocatæ.*]

Accarum Iuniperi Seminis Asparagi

Sileris montani

Seminis Apij Seminis Anethi

Seminis Rutæ Seminis Citrei mali

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Accarum Lauri ana ʒ j. ʒ.

Acchari albissimi.

Valet ad dolorem renum, calculos frangit,
arenas expellit, ac stranguriam dissoluit.

Confectio Liberans [scilicet à peste.]

Radicum Tormentillæ

Seminis Acetosæ

Endiuix

Coriandri præparati

Citrei mali ana ʒ j. ʒ.

Antialorum omnium

Dictamni

Dictamni albi ana ℥ j.

Boli Armeni præparati

Terræ sigillatæ [*loco eius Bolus leuanticus, i
est, orientalis, sumatur.*] ana ℥ iij.

Margaritarum

Corallij albi

Corallij rubri

Charabæ

Rasuræ Eboris

Spodij [*id est, Eboris resti, de quo in fine.*]

Ossis è corde cerui

Been albi

Been rubri

Doronici

Cardamomi

Cinnamomi

Macis

Ligni Aloës

Canæ ligneæ [*aut succedanetum eius.*]

Groci

Zedoariæ

ana ℥ ss.

Smaragdi [*loco eius Hyacinthi aut Granati.*]

Hyacinthi

Granati

Seriei crudi incisi & torrefacti ana ℥ j.

Penidij

Sacchari Candi ana ℥ ij.

Florum Nenupharis [*id est, Nymphae.*]

Buglossæ

Rosarum

ana

℥ j.

Camphoræ

℥

vij.

Moschi

Ambrae

ana

℥

ij.

Sacchari

ecchari albissimi.

Contra pestem plurimum valet, tutatur cor-
ne lædatur à pestifero aëre, & præseruat
mores à corruptione.

Confectio Cordialis.

M. Margaritarum

Ammodij [*id est, Eboris vsti*]

granatorum verorum

cinamomi

Tormentillæ

Boli Armeni ana ʒ iij.

amantalorum omnium Rasuræ Eboris

modicoru ana ʒ ij. Hyacinthorum

capphiri [*loco eius maius pondus Hyacintbi.*]

corallij albi Corallij rubri

charabæ albi Valerianæ veræ

dictamni Zedoariæ

gigni aloës ana ʒ j.

erræ figillatæ [*aut Boli leuanticæ, hoc est,*

orientalis.] ʒ j. ʒ ij.

perici crudi modicum torrefacti ʒ ij.

ossium è corde cerui ʒ j. ʒ.

seen albi

seen rubri ana ʒ ij.

coliorum auri fini numero v.

Moschi

℞

Ambræ

Ambrae ana ḡ x.

Sacchari albiſſimi.

PRÆSERVAT cor à peste.

Electuarium Letitiae Galeni

ex Nicolao.

℞. Florum Ocimi garyophyllati

Croci

Zedoariae

Xylobalsami [*pro quo lignum aloës, cū in ista descriptione non habeatur.*]

Garyophyllorum

Corticum citrei mali

Galangae

Macis

Nucis moschatae

Styracis calamitae

ana ʒ ij. β.

Anisi

Rasurae Eboris

Thymi

Epithymi

ana ʒ j.

Camphorae

Moschi

Ambrae

Margaritarum perforatarum

Ossium de corde cerui

ana ʒ β.

Auri foliati meri [*id est, purissimi.*]

Argenti foliati meri

ana ʒ β

Sacchari albiſſimi.

Fiat confectio solida.

Si verò volueris facere in forma liquida siue opiatae, tunc adde

Succi Cydoniorum

Pomo-

Pomorum odoratorum dulcium

Boraginis

Vini veteris optimi, ana partes æquales in
 tanta mensura, quanta despumando & deco-
 brendo saccharo satis fuerit: nulla enim aqua
 prædictarum dissolui aut decoqui ad spissitudi-
 nem debet in hac confectione.

LAETITIAM colorisque bonitatem efficit,
 concoctionem iuuat, & canitiem retardat.

Electuarium Latificans Rhasis.

| | |
|----------------|-------------------------|
| Melissæ | Corticum Citrei mali |
| Garyophyllorum | Galliæ moschatae Mesuræ |
| Castiches | Croci |
| Innamomi | Nucis moschatae |
| Cardamomi | |

Veremisch [pro quo potest semen prœonia accipi]

Been albi Been rubri

Doronici

Ocimi

Ocimi garyophyllati ana ʒ β *

Moschi ʒ xxiiij. *

Sacchari albi. Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris facere in liquida forma, vt

recet, tunc prædictas species sequenti Syrupo

alisco, & fac in modum opiatae.

E 2

R. My-

- * R^x. Myrobalanorum, Chebulorum, numero xx.
- * Emblicorum numero xxx.
- * Aquæ P^{iij}. aut quantum sufficit. Coquantur trita myrobalani in prædicta aqua, donec remaneat tertia pars, deinde cola. Colaturæ adde de mellis despumati P^j. loco prædicti sacchari bulliat postea usque ad iustam spissitudinem & insperge species prædictas, postquam feruor Syrupi remissior factus fuerit.

NEREMISCH. apud Rhazin est Rosa asinina. Auerrois autem interpres dicit Paoniam esse rosam asinorum. Ergo, secundum hunc Neremisch idem esset quod Paonia: nisi Rhasis de utraque, id est, de Neremisch & de Paonia, duo propria faceret capitula, tamquam de rebus diuersis. Certum igitur statuere non possumus, quid sit Neremisch.

Confortat omnia membra principalia, e quibus virtutes manant naturales & animales, iuuat calorem naturalem, & spiritum viuificat, compescit malas cogitationes, & bonos mores, lætitiā & gaudium gignit.

*Electuarium Plurisarcoticum, seu potius,
Pleres archonticon, D. Nicolai.*

| | |
|----------------------------|----------------|
| R ^x . Cinnamomi | Garyophyllorum |
| Ligni aloës | Galangæ |

Spica

| | |
|---|-------------------|
| Spicæ Indicæ | Nucis moschatæ |
| Zingiberis | Spodij |
| Schœnanthi | |
| Cyperī | Rosarum |
| Violarum | ana ʒ i. ʒ xv. |
| Folij [<i>loco ipsius Macis sumatur.</i>] | |
| Glycyrrhizæ | Mastiches |
| Styracis calamitæ | |
| Sampsuchi [<i>id est, Maiorana.</i>] | |
| Balsamitæ | Ocimi |
| Cardamomi | Macropiperis |
| Leucopiperis | |
| Myrtillorum | |
| Corticis Citrei mali | ana ʒ ij. ʒ v. * |
| Margaritarum splendorum | |
| Been albi | Been rubri |
| Corallij rubri | |
| Serici tosti | ana ʒ i. ʒ ij. ʒ. |
| Moschi | ʒ vij. ʒ. |
| Camphoræ | ʒ v. |
| Sacchari albißimi. | |

Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde proficiscenti succurrit. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

E 3

Lithen-

Lithontribon D. Nicolai.

℞. Spicæ Indicæ Zingiberis
 Xylobalsami [*aut ligni aloës ut suprâ.*]
 Acori [*sive calami aromatici hodie vocati.*]
 Cinnamomi
 Peucedani [*videlicet radicis eius.*]
 Mei [*loco eius accipe Seseli Cretici radicem, in
est, Beruvurtz, Germanis vocatam*]
 Melanopiperis Macropiperis
 Leucopiperis Saxifragiæ ana ʒ ij. ʒ
 Opobalsami [*loco eius sumatur oleum ex gra-
nis Iuniperi.*]
 Garyophyllorum
 Costi Rhapontici
 Glycyrrhizæ Cyperi
 Tragacanthæ
 Seminis Olusatris [*est semen quod Macedoni-
cum vulgò perperam vocant.*]
 Chamædryos Seminis Apij
 Ammios Asparagi Ocimi Vrticæ
 Citrei mali ana ʒ i. ʒ xv.
 Folij [*aut succedanei eius.*]
 Croci Schœnanthi
 Lignæ Casiæ [*aut succedanei eius.*]
 Bdellij Mastiches

Ircos

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Ireos | Amomi |
| Ligustici | Milij solis |
| Petroselini Macedonici | Seseli |
| Sinoni [<i>de quo supra.</i>] | |
| Cardamomi | |
| Anethi | Euphorbij |
| Lapidis Lyncis | Olei Nardini |
| Olei Moschelini | ana 3 ℥. 6 vij. ℥. |
| Sacchari albiſſimi. | |

Si volueris facere in forma Opiatæ, tunc speciebus adde triplum mellis deſpumati, loco ſacchari: diutius enim durant ſpecies melle exceptæ, quàm ſaccharo: poteſt tamen utroque modo fieri.

Olei Moschelini præparatio infra habebitur.

P. C. SCHOL.

Meu] *Seseli Creticum*. Cordo vocatum, quod *A Beruvurt* Germani, *Fœniculum porcinũ* Belgæ appellant, eſſe ipſiſſimum *Meu* ſeu *Meum* *Dioſc.* omnino perſuaſum habeo. Nec radicem eius tantam, tamve craſſam eſſe, (natalibus præſertim locis natam) neque tam graviter olere, veluti *Mathiolus* metuit, ut neque tenuitatis nec odoris à *Dioſc.* deſcriptos limites, ita trãſire putem, quin genuinum *Meum* eſſe queat: Cræſſitudo cum cræſſitudine comparanda cum
 E 4 sit,

fit, simul atque suauiter olere, & simplicitate
 odoratum esse, aliquantulum cum etiam differ-
 rant. Eo modo, ut quæ de Meo Asturia ac Sistr.
 Monachi obseruarunt & scribunt: ego, utpot
 mihi quoque comperta, approbem, illisq; mani-
 dem. Proinde si quispiam adhuc nihilominus re-
 fragari voluerit, pro Meo vero tamen eo tan-
 tisper utetur Pharmacopœi, deserto illo quo ha-
 etenus vsi sunt nostrates, dum ipse Diosc. Geniu-
 nobis aliud proferat. Ceterum imprudenter ad-
 modum Mathiolum carpit Fuchsius, quod ille
 unâ cum Monachis, hanc herbam Apulis Im-
 peratoriam nominari inquit, quam Angeli-
 cam esse (sic à Germanis appellatam) malè in-
 terpretatur Fuchsius: cum Imperatoria nomine
 ab isthoc Meo admodum diuersa, à Germanis
 demonstrantur planta.

Præclarum ad indigestionem stomachi ex
 frigiditate. Iliorum lumborumq; dolores com-
 pescit, lapides in renibus & vesica potenter
 confringit, & inde mirabiliter expellit. Stran-
 guriâ & dysuriâ è vestigio soluit.

Resata Nouella D. Nicolai.

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| ℞. Rosarum | Sacchari | |
| Glycyrrhizæ | ana | ℥ j. 3 j. ʒ ij. ʒ. |
| | | Cinna- |

Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij. minus ʒ ij. *
 Caryophyllorum
 Nardi [*id est, Spica Indica.*]
 Zingiberis Galangæ
 Nucis moschatae Zedoariae
 Sytracis calamitæ Cardamomi
 Seminis Apij ana ʒ j. ʒ vj. *
 Sacchari albissimi.

CONFERT apprimè calori & siccitati
 stomachi, cordis, hepatis & pulmonis. Sitim
 compescit & vomitum, abscindit debilitatem
 stomachi, adstringit laxa. Cardiacis subuenit,
 sudorem diaphoreticum reprimit, ex chroni-
 ca infirmitate debiles recreat.

Electuarium Diapæonias.

℞. Radicis Præniæ ʒ j.
 Macis Spicæ Indicæ
 Croci Coralliorū rubrorum
 Margaritarum non perforatarum
 Mastiches ana ʒ β.
 Myrtillorum verorum ʒ j. β.
 Cinnamomi
 Nucis moschatae
 Caryophyllorum
 Folij [*loco eius Cassia lignea vera.*]
 E s Zingi-

Zingiberis

Piperis longi

Cardamomi

Granorum paradisi ana ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Anacardi ʒ j. β.

Moschi Ambrae ana ʒ vj.

Sacchari albiſſimi

Fiat confectio in tabulis in æſtate.

In hieme verò adde ſpeciebus triplum mellis
deſpumati, & conficiatur electuarium.

CONFERT epileſiæ.

Electuarium Reſumptiuum

D. Nicolai.

℞. Roſarum

Glycyrrhizæ

Sacchari ana ʒ ij. ʒ v.

Gummi Arabici

* Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.

Santali albi

Santali rubri ana ʒ j. β. Papaueris albi

Succi glycyrrhizæ Amyli

Seminis Portulacæ

Laſtucae

Scariolæ ana ʒ iij.

Garyophyllorum

Spodij [pro eo, Eboris uſti.]

* Cinnamomi ana ʒ j.

Zingi.

Zingiberis
 Styracis calamitæ ana ʒ ij.
 Croci ḡ v.
 Penidiarum ʒ β.
 Nucleorum seminis Cucurbitæ
 Citrulli Cucumeris Melonis ana ʒ ij.
 Seminis cydoniorum ʒ ij.
 Amygdalorum dulcium Pineorū nucleorum
 Berberis Seminis Maluæ
 Seminis Cotisue Bombacis
 Seminis violarum Sebesten
 Nymphææ ana ʒ ij.
 Cum Syrupi violati quātitate sufficienti fiat
 Electuarium.

RESTAVRAT humiditatem radicalem,
 lenit, humectat, nutrit, & cōfortat. Aperit po-
 ros, obsistit cholerae, sedat febrem, tussim & si-
 tim. Restituit integras vires, & pristinam sa-
 nitatem, extenuatis, consumptis & hecticis.

*Diacorum D. Mesuæ, in sua praxi, cap. 1.
 de affectibus neruorum.*

R. Radicum Secacul Acori
 Pinearum ana ℥ j. β.
 Radices Secacul mūdare & incisæ coquātur
 in aqua clara, donec aqua consumatur, postea
 opti-

optimè pistentur, & in minutissimas partes
 conterantur, donec pulti similes fiant. Deinde
 adfunde eis mellis odorati & optimè despu-
 mati P^x. coquatur lento igne, donec tota aqua
 quam radices Secaculi imbibierunt, in vaporem
 resoluta sit; diligenter agitando, ne ad vasis
 fundum adurantur radices. Cum autem iusta
 spissitudinis consistentiâ acquisuerit, ab igne
 deponito, & adde radices Acori tenuissimè
 tritas, & Pineas minutissimè incisas, cum sub-
 sequenti puluere optimè mistas.

R. Piperis ℥ j. Piperis longi
 Garyophyllorum Zingiberis

A. Macis ana ℥ iiij.
 Nucis moschatae Galangae
 Cardamomi ana ℥ iiij.

Omnia ista simul cum melle & radicibus
 Secaculi misceto & vnito, diligenter agitando
 ne grumi aliqui relinquantur.

B. SECACULUM verum est Siser, quod Germani
 vocant Gritzelmoren, & Klinghilmoren, Galli
 Escheruis & Seruiles, Banari Nudle, Sueni
 Geyrle.

ACORUS, id est, vulgò vocatus Calamus
 aromaticus. Mesue iubet etiam Acori radice
 elixari. Sed quia nos recentes & virides non ha-
 bemus

meus, ut ij qui in calidis regionibus habitant,
leò melius est eas tritas melli admiscere.

P. C. SCHOL.

Rosas è contextu, à Cordo perperam imposi- A
us, Fuchsis quoque & id volente, sustuli.

Secacul verum.] Secacul nō est Siser, ut Cor- B
us existimat: sed veluti Francisco Alexand.
uoque placet, esse posset ea planta quam Crith-
um spinosum, seu Pastinacam marinam vocāt
Anspessulani: unde mihi in horto meo à Ma-
hia Lobelio doctore Medico semine transmissio,
unc viret. Genuinum interim si id non fuerit,
eius locum tamen commodè substitui posset,
respondentibus facultatibus: dum Arabs quis-
iam ipsissimum nobis commonstrauerit.

Confert mirum in modum ægitudinibus
eruorum, acuit omnes sensus & ingenium,
edat dolores capitis; est peculiare remedium
rigidarum ægitudinum, senum, & maximè
atarrihi.

Pulvis ad Epithemata cordis.

℞. Santali rubri ℥ j.
Corticum Citrei mali Santali albi
Rosarum Corallij albi
Corallij rubri Charabæ

Spodij

Spodij [*accipe Eboris vsti.*] ana ℥ β

Ossis cordis ceruini

Croci ana ℥ j.

Specierum Lætitia Galeni

Specierum electuarij de Gemmis

Specierum Diamargariton ana ʒ iiij

Camphoræ ʒ j.

In puluerem redactæ species cōmisceantur

Pulus ad Epithemata hepatis.

℞ Rosarum Santali albi Santali rubri

Absinthij Schoenanthi

Spodij [*pro eo Eboris vsti.*]

Spicæ Indicæ ana ℥ β.

Contrita in puluerem misce & reponc.

CONFECTIO NES

OPIATÆ.

Diaolibanum D. Nicolai.

℞. Castorei Opij

Hyoscyami albi ana ℥ iiij.

* Calicæ lignæ ℥ ij. ʒ ij.

Folij [*aut succedanei eorum.*]

Croci

Thuris

Thuris masculi ana ʒ ij.
 hapontici
 momi [pro quo Carpesium] ana ʒ j. ʒ ij.
 Myrrhæ ʒ j. β.
 xoniæ Styrcis calamitæ
 Macropiperis ana ʒ j.
 picæ Indicæ
 yrethri Euphorbij
 eucopiperis ana ʒ ij. β.
 Mellis despumati triplex pondus.

EST verò obseruandum in omnibus opiatis,
 & singulis unciis specierum, misceantur tres
 uncia mellis despumati. Si minus fuerit, exic-
 atur confectio facilè: si verò plus addatur, vi-
 es eius disperguntur.

THVS Masculum, est Thus album aut
 auum purissimum in globulos rotundos singu-
 s, aut testiculorum figura geminos concretum,
 deoq; Masculi cognomen accepit.

VTILE est ad diuersas passionēs capitis,
 emicranicum dolorem placat, & supercilij
 chrymas potenter stringit; fauces rheuma-
 izatas & arterias lenit. Hæmoptoicis & tussi-
 ntibus medetur. Vomitus cōpescit, dolorem
 machi & nauseam aufert. Peripneumoni-
 is, pleureticis, empyicis sine dubio subuenit.

Conor-

Gonorrhœam & satyriam emendat, & mensuralem sanguinem sistit.

A *Musa Enea, siue ZaZenea, vel Egetea*
D. *Mesue.*

R. Castorei

Myrrhæ

Melanopiperis

Galbani

Cinnamomi

Meu [aut loco eius *Seseli Creticum*, id est, *Berberis*]

Dauci

Croci ana 3 iiij.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

P. C. SCHOL.

A *Musa.*] *Erroneè à Cordo Musa hac confectio inscribitur, veluti & Francis. Alex. ritè obseruauit cùm Sagzenea à Mesue vocetur. Musa enim Enea apud Nicolaum confectio est, ab hac plurimum differens.*

VALET ad omnes passiones frigidas, & ventositates crassas, & dolorem dentium & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi, tarditatem digestionis, colicam, difficultatem vrinæ, & ad frigus & phlegma, & ad muccositatem vrinæ.

Philonium

Philonium Maius, siue Romanum

D. Nicolai.

Leucopiperis

Polyoscyami albi [i. seminis eius] ana ʒ v. *

Pipij ʒ ij. β.

Alia lignea [aut succedanei eius] ʒ j. β.

Seminis Apij ʒ j.

Petroselini Macedonici Fœniculi

Dauci Cretici ana ʒ β.

Roci ʒ j. Spica Indica *

Cedoaria *

Pyrethri ana ʒ β. ʒ v.

Cinnamomi ʒ j. β.

Luphorbij Costi ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

Pro Dauco Cretico accipere licet Seseli Creticum, id est, Beruvurtz.

P. C. SCHOL.

Sem. Apij ʒ j. & paulo post, Sem. Dauci A

na ʒ β] Pro ʒ j. Cordus male ʒ j. sicuti B

& pro ʒ β erroneè ʒ j. legebat: ut Fran-

isco Alex. quoque placet.

Emendat tussim cum vino multo oblatum,

eripneumoniam cū hydromelite, sanguinis

putum cum polygonia succo. Indigestionem

E

stoma-

stomachi & vomitum cum posca, dolorem hepatis cum cœnomelite curat, spleneticis & auribus gignosis cum oxymelite subuenit, cœliacis cum apozemate pegani. Pleuriticis, iliois, nephriticis & vesicæ symptomatis cholerice medetur.

Philonium D. Mesuæ.

℞. Piperis albi

Seminis Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opii ʒ x. Croci ʒ v.

Spicæ nardi Indicæ Pyrethri

Castorei ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum pondus.

MIRVM in modum mitigat dolores, præcipuè stomachi, matricis, laterum, totius ventris, & colicæ cum decoctione chamæmeli verutæ, & statim prouocat somnum cum aqua lactucæ vel syrupo papaueris. Tollit dolorem capitis cum decoctione stœchadis, prohibet catarrhum cum decoctione olibani vel spicæ. Contra spasmus & paralyfim bibitur cum decoctione nucis moschata. Facilitat anhelitum cum decoctione baccarū lauri vel hyssopi, & sedat tussim cum aqua mellis. Prouocat urinam, faciliat mictum, & frangit lapides vesicæ.

eficæ, cum decoctione Saxifragiæ vel aqua
pij. Compescit vomitū & fluxum sanguinis
x ore, cum succo plantaginis vel decoctione
pastiches, & sedat prouocationes & singultus,
vitia matricis, & potenter somnū inducit.

Philonium ex Galeno &

P. Ægineta.

℞. Croci 3 v.
Pyrethri Euphorbij
Opicæ Indicæ ana 3 j.
Piperis albi 3 xx.
Hyoscyami 3 viij.
Eachrymæ Papaueris 3 x.
Mellis despumati optimi triplum.

P. C. SCHOL.

Hyoscyami 3 viij.] *Cum non Galeni, sed* A
P. Ægineta tantum corrupta exemplaria perpe-
ram legant Hyoscyami 3 viij. atque ex Corna-
rij Dolabella 3 xx, pro 3 viij. restituenda sint,
cum Mesues descriptione hoc pacto conueniet, ut
note qui ex hisce eandem desumerit; Castorium
in Euphorbij locum substitutum si exceperis.

Philonium Persicum D. Mesue.

℞. Piperis albi
Hyoscyami albi ana 3 xx.
F 2. Opij

Opij

Terræ sigillatæ [*pro qua Boli Armeni ut si*
præ] ana ʒ x.

Lapidis Hæmatitis Croci ana ʒ v.

Castorei

Spicæ Indicæ

Euphorbij

Pyrethri

Margaritarum

Charabæ

Zedoariæ

Doronici

Trochiscorū Ramich [*de quibus infra*] ana ʒ

Camphoræ

ʒ i.

Mellis rosati optimi triplum.

P. C. SCHOL.

Piperis albi.] *Insulsè admodum Papauer*
huius locum surrogauerat Cordus, quod
suboluit facile Euchsio: sequētibus nihilominus
Cordum Coloniensibus medicis, in ab ipsis euu-
gato non ita diu Dispensariolo.

INVENTVM est ad retinendum sangui-
nem menstruorum, hæmorrhoidarum, fluxum
ventris, vomitum, & sputum sanguineū; præ-
sertim si cum succo plantaginis dissolutum
bibatur, & ad fluxum menstruorum mittatur
in vuluam, & ad fluxum sanguinis excoriatio-
nium clysterizetur. Cōsolidat fermè vlcera &
venas, & nihil est quod magis & tutius præ-
seruet ab abortu prægnantem grauidam.

Requies

Requies Nicolai.

℞. Rosarum
 Violarum ana ʒ iij.
 Opij Hyoscyami
 Papaveris [videlicet albi.]
 Mandragoræ [videlicet cort. radice eius.]
 Scariolæ [videlicet seminis.]
 Lactucæ [videlicet seminis.]
 Seminis Portulacæ

Psyllij

Nucis moschatæ Cinnamomi
 Sacchari ana ʒ j. β.
 Santali albi Santali citrini
 Santali rubri Spodij
 Tragacanthæ ana ʒ ij. ḡ v.
 Mellis despumati optimi triplum.

REQUIES dicitur, quia requiem acci-
 pientibus præstat: maximè typicè febricitan-
 tibus, quotidianariis, tertianariis, quartana-
 riis, acutis & peracutis.

Tryphera magna D. Nicolai.

℞. Opij ʒ ij.
 Cinnamomi
 Caryophyllorum Galangæ
 Spicæ Indicæ Zedoariæ
 F ʒ zingi-

Zingiberis

Costi

Styracis calamitæ

Calami aromatici

Cyperi

Iridis Illyricæ

Peucedani

Acori [*aut Calami aromatici hodie vocati.*]

Mandragoræ

Nardi Celticæ

Rosarum

Piperis

Sem. Anisi

Apij

Petroselinii Macedonici

Fœniculi

Dauci

Hyoscyami

Cumini

Ocimi ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum.

IRIS Illyrica, est eadem qua in Pharmacopoliis dicitur Ireos.

NARDVS Celtica siue Spica Celtica, & Saliunca est eadem herba qua in Pharmacopoliis dicitur Spica Romana.

AUXILIATUR dolori stomachi ex frigidityte, & cum accepta fuerit, statim patientē ad sudorem prouocat. Phreneticis, & mulieribus quæ ex melâcholia de matrice insomnes sunt, rheumaticis, peripneumonicis, & qui excernunt excrementa cum sanguine, vtilissima est.

Try-

*Tryphera minor Fœnonis,
ex Mesue.*

2. Myrobalan. Chebulorum
Bellericorum Indorum Emblicorum
Nucis moschatæ ana ℥ v.
Nasturtij assati Asari
Origani Persici Piperis
Olibani Ammios
Zingiberis Fructus Tamarisci sativæ
Nardi Indicæ Schœnanthi
Cyperî ana ℥ iiij.
Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto macerata,
& deinde tostæ ℥ xx.
Myrobalani cum butyro recenti noni salito
assentur modicum, reliqua oleo amygdalino
dulci inuoluantur: deinde addantur
Moschi ℥ i.
Mellis despumati triplex pondus.

Oportet autē diligenter attendere, ne Myrobalani cōburantur, cū in butyro assantur.

ORIGANVM Persicum, idem est quod origanum Orientale: nascitur etiam in Creta insula, & Græcia: habet autem surculos, capitula, folia, & ramulos maiorana similia, saporem verò inter Satureiam & Dictamnū Creticum

medium, estq³ valdè odoratum & aromaticum
affertur ex Oriente in Italiam: loco autem eius
accipere licet Diétamnium Creticum verum.

TAMARISCUS sativa arbor est procera
sed ea nos caremus, ideoq³ cogimur loco eius no-
stratis Tamarisci foliis uti.

SCORIA ferri, propriè significat ferri re-
crementum, id est, eysenschlacken Germanis vo-
catum, verùm id non debet hoc loco accipi, sed
Squama aut Batitura ferri optimi aut Chaly-
bis, quam Græci Stomoma appellant.

VALET ad corruptionem & exuberan-
tiam menstruorum, & hæmorrhoidarum, &
ad corruptionem formæ, & debilitatem sto-
machi, & destruit humorem crudum, & clari-
ficat calorem. Confortat vesicam, & abscindit
fluxum ventris.

Tryphera Sarracenicæ

D. Mesue.

℞. Myrobal. Chebulorum
Indorum Bellericorum Emblicorum
Citrinorum ana ꝑ v.
Cinnamomi Leucopiperis
Macropiperis Melanopiperis
Secacul [id est, Siseris, ut supra.]

Folij

olij [aut succedanei.]
 picæ
 Cardamomi maioris Cardamomi minoris
 Asiaæ ligneæ [aut succedanei eius.]
 Citræ Indi Cyperi
 pipi Linguaë auis
 Caryophyllorum
 Cinnamon albi Cinnamon rubri
 Zingiberis ana ʒ ij.
 Nucis moschatae Macis
 Sesami excorticati ana ʒ iiij.
 Amygdalorum dulcium
 Amygdalorum amarorum ana ʒ v.
 Ligni aloës Rhabarbari
 Rutæ Seminis Fœniculi
 Mastiches ana ʒ ij.
 Ocimi caryophyllati Menthæ sicca
 Origanii Persici [eius loco Dictamnium Creticum accipe.] ana ʒ j. β.
 Fricentur Myrobalani trita cum butyro
 vaccino recenti & non salito, alia verò species
 cum oleo amygdalino dulci, & confice cum
 mellis despumati optimi triplo.

SECACUL, non est Iringus siue Eriogonum,
 neque Iringus qui habet folia Cretami marini,
 neque Sigillum Salomonis. Sed verum Secacul

F ʒ est

est veterū Sifer, hoc est, radix illa qua Germanicè dicitur Klingelmorn, Gritzelmorn, Nudlen, & Geyrlen: Gallicè Eschernis & Servilles.

LINGVA avis, est semen fraxini.

SEITARAGI Indum, est herba Nasturtij odore & sapore, foliis longis, radice simili eius herba quam Merretich vocant Germani, & Ffefferwurtz, Raphanum magnum.

CONCOCTIONEM ventriculi & hepatis suo calore inuat, ob id flatus dissipat, humores in ventriculo & aliis visceribus putres absumit, oris & corporis odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit. Sanitatem præsentem tuetur, & morborum generationem prohibet. Venerem auget, hæmorrhoides sanat.

Tryphera Persica D. Mesue.

R. Succorum Solatri siue Solani

Endiuie veræ & satiuæ

* Apij ana P ij.

Lupulorum depuratorum P ij.

Proiciantur desuper

Violarum siccarum aut viridium

* Rosarum ana ℥ iiij.

Foliculorum Senæ ℥ ij.

Agarici ℥ i.

Pruno

unorū Damascenorum pinguiū numero L. *

uscutæ ℥ β.

opica Indicæ ℥ iiij.

alliāt molliusculo igne, donec supersint ℞ ij.
t iniiciantur

pithymi ℥ xl.

lyrobalanorum Citrinorum

Chebulatorum

Indorum fricatorum in oleo amygdalo-
rum dulcium ana ℥ ij. *

Bulliant leuiter, deinde ab igne deponan-
tur & percoleantur, atque dissoluantur in vna
parte istius percolati.

Camarindorum recentium ℥ iiij.

Mannæ electæ ℥ j. β.

Pulpæ cassiæ ℥ iiij.

Sacchari violati ℞ j.

Percolentur & mudentur à granis & sordi-
bus, atque in aliam aquæ partem proiciantur

Sacchari albissimi ℞ iiij.

Aceti vini ℞ j.

Coquātur leuiusculo igne, deinde proiciā-
tur super illud quod dissolutum est in succis, &
aggredientur simul in vnū, atq. coquantur do-
nec mellis crassitie obtineāt: postremo in pul-
uerem redactæ sequētes species inspergantur.

Rha-

Rhabarbari optimi ℥ ij.
 Myrobalan. Citrinorum ℥ j. β.

Chebulatorum

Indorum ana ℥ j.

Bellericorum

Emblicorum ana ℥ iiij.

Seminis Fumiterræ

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches

Cubebæ

Spodij [*loco eius Eboris vsti.*]

* Santali citrini ana ℥ ij.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli

* Cucumeris

Melonis ana ℥ ij. β.

Anisi ℥ iiij.

Spicæ Indicæ ℥ ij.

Inuoluantur hæ species in oleo violato. & confectio reponatur in vase vitreo.

CONFERT febribus acutis, & inflammationi stomachi & hepatis, ictericis calidis. de oppilatione incolumitatem acquirit. Visum à fumis cholericis deperditum, reparat. Sitim mitigat, morbos adustionis fieri prohibet.

Confe-

Confectio Anacardina D. Mesuae.

2. Piperis nigri
 Piperis longi
 Myrobal. Chebulorum
 Emblicorum Bellericorum Indorum
 Castorei ana ʒ ij.
 Costi Anacardij

Sacchari tabarzeth

Burungi

Baccarum Lauri ana ʒ vj.

Cyperij ʒ iiij.

Anacardi per se terantur, & aliis tritis ad-
 misceantur: deinde omnia cum butyri recen-
 tis non saliti &

Mellis despumati ana ʒ v. ʒ.

Simul coctis bullitione vnica conficiantur. *

P. C. SCHOL.

Burungi.] Cordus huius loco semen Eruca A
 posuerat, hanc dictionem ita interpretatus;
 cum Melissam esse existiment plerique, vt G
 monet Fuchsius, Mathiolo aliter sentiente. Si
 verò dictionem hanc Eruca semen esse Mesua
 mens fuerit, per id Sinapi semen à colore al-
 bum vulgo hic nuncupatum, atque ab officinis
 nostris perperam Eruca semen vocitatum, in-
 telligen-

telligendum erit; ab huius confectiois virtutis scope non alienum.

Est cōfectio sapientum, & eorum qui de siderant scire: acuit enim intellectū, subtilis facit sensum, memoriam recuperat, & confert dolori stomachi & vētris à frigiditate facto. & clarificat sanguinem, colorem bonum facit.

Aurea Alexandrina D. Nicolai.

R. Afari

(præ-

Carpobalsami [aut aliquod succedaneū, ut su-

Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ij. ʒ.

Garyophyllorum

Opij Thebaici

Myrrhæ.

Cyperii rotundi

ana ʒ ij.

A Balsami [loco eius oleum Garyophyllorum.]

Cinnamomi

Folij [aut succedanei eius.]

Zedoariæ

Zingiberis

Costi veri

Corallij

Cassia lignæ veræ

Euphorbij

Tragacanthæ

Thuris masculi

Meu [vel potius Mei.]

Syracis calamitæ

Saliuncæ [id est, Spica Celtica, qua nunc Roma

na di-

dicatur. Sed in Græco Alexandrino habetur

Helisphacon, id est Salvia.]

Cardamomi minoris Seselios

Seminis napi Seminis saxifragiæ B.

Anethi

Anisi ana 3 j.

gigni aloës

Chapontici

Aliptæ moschatæ

Castorei

Alipicæ nardi Indicæ

Galangæ

Opopanax

Anacardi

Mastiches

Sulphuris viui.

Radiciis Pæoniæ

Eringij [*videlicet radici eius.*]

Kosarum

Thymi

Acori veri [*sive Calami aromatici.*]

Pulegij

Aristolochiæ longæ

Gentianæ

Corticum rad. Mandragoræ

Chamædryos

Phu

Baccarum Lauri

Ammij [*id est, ammeos.*]

Dauci Cretici. [*eius loco licet accipere Seseli*

Creticum, id est, Beruvurtz.]

Macropiperis

Leucopiperis

Xylo-

Xylobalsami [aut aliquod succedaneum.]

Sem. Carui

Amomi

Ligustici

Sinoni

Petrosclini

Rutæ

ana 3 β.

Auri cocti [.i. omnino igne depurati & sinceri.]

Argenti meri

* Margaritarum albarum

Blattæ Byzantiæ

* Ossis è corde cerui ana ḡ xv.

Limaturæ Eboris

Calami aromatici

* Pyrethri ana ḡ vij.

Mellis despumati triplum.

*I N Græco Alexandrino Nicolao etiam alii
quadam pretiosa habentur in fine, ni fallor. Sa-
cut videbitur, si in lucem venerit.*

*M Y R R H A E. Actuarius auctor, quæ Rue-
lius interpretatus est, pro Myrrha habet Myr-
baccarum, id est, Myrtillerum, facili ex altera
in alterutram vocem lapsu: nam Myrta in plu-
rali numero Græcis sunt fructus Myrti, quæ vo-
cæ magnam habet similitudinem cum Myrrha.*

*M E V vero nos caremus, eius loco accipere li-
cet Sisonis semen, quod iam dicitur Amomum
aut Sefeli Creticum, hoc est Beruvurtz. sed hoc
inferius*

ferius est accipiendum pro Dauco Cretico.

N A P V S, est parua, densa, at solida rapa, quam appellamus Germanicè Merseburgisch, ortfeldisch, & Bairischrublein.

P H V verum, quod ad medicinam requirunt luctores, non est Valeriana vulgaris, nempe grestis: sed alia herba qua Germanicè dicitur Gartensoliunck, Teriacskraut & Spicvurtel. Caulem & flores habet Valeriana, radicem maiorem & odoratiorem, folia longa & mollia. colitur à nobis in hortis.

A M O M V M verū] est Rosa Hierichuntis odorata, sed eo Pharmacopola hactenus caruerunt. ius succedaneū est verus acorus aut carpesium.

S I N O N V M siue Sison, siue Sinnus, siue E sinon, est semen nigrum aromaticum, quod hodie Amomū in Pharmacopoliis vocitatur falsò.

A M B A R V M Margaritarū] hoc est, perforatarum & non perforatarū: alij legunt albarum Margaritarum. Actuarius habet simpliciter Margaritarum: non malè ergo quis aget, si tam perforatarū quàm non perforatarū, ana ʒ β. ʒ vj. & β. acceperit. ita ex utrisq. unū fiet pondus, videlicet ut Nicolaus habet, ʒ i. ʒ xij.

P. C. SCHOL.

Balsami.] Opobalsami, legebat Cordus, an- A
G Floris

etoris potius mentē interpretā's & ponens, quā
 vocem eam quam repererat seruans. Per Balsa-
 mum verò absolute scriptum, herbam ipsam ip-
 sius Balsami fruticis intelligi vult Fuchs. My-
 repsum Xylobalsamo, Carpebalsamo, Opobal-
 samo, & Balsamo, quatuor distinctis vocibu-
 s uti perhibens. Sed eundem Myrepsum quatuor
 illis simul in eodem usurpari medicamento, ne-
 dit nec demonstrat. Quare per Balsamū, Ni-
 colaum succum seu Opobalsamum intellexisse
 unā cum Francis. Alex. Apolline censeo.

B Sem. Napi.] Seminis Sinapis legit Fuchs in
 huius loco ex Myrepso, cui & aliquot vetust
 mea exemplaria consentiunt.

C Rhapontici.] Rhabarbari perperam legeba-
 Cordus, indicante & id quoque Fuchsio, quo
 à Rhapontico diuersum est. Id ipsum autem a
 amussim. Dioscoridis descriptioni conuenien-
 hisce nuperrimis annis primū adferri denuo at-
 à peritioribus nonnullis cognosci coepit. Non it-
 diu enim, eius uncias paucas (variusculum
 enim adhuc est) ex urbe Veneta, in qua tū ag-
 bat, ad me dono misit, non minus doctus, quā
 bacce in nostra arte si quis alius versatissim
 atq. diligētissimus Valerandus Doreus, Lugd
 ui pharmaca nūc faciens. Verū in huius Rha-

panur

anuria Rhabarbore non incommode uteris.

Amonium verum. } Rosa Hierichuntis vo- D
ata vulgò, Amomum hercle esse non potest, ut
Mathiol. Fuchsius, & Francis. Alex. rectè sen-
iunt. Quare eius utendum succedaneo.

Sinonum. } Cordimentem ut neq. Anguilla- E
ra, intelligit Fräcisxi Alex. Apollo. Dicere enim
volunt, Sinonum seu Sisonem verum, esse semen
quoddam nigrum, acre, aromaticum, exiguum,
apij semini simile: eius herba, inquā, cuius ima-
go à Hieronymo Trago, & Cordo, Sisonis nomi-
ne depicta est; ac cuius semen Belgij atque Ger-
mania officina Amomum falsò vocitant, proq̃
eo sinistrè utuntur. Idipsum interim si Sinonum
non fuerit, facultate cum illi sit satis vicinum,
pro eodem vsui esse poterit.

Ambarum Margar. } Cùm ita legeret Corvius E
unà cum multis aliis, longè aliter sese res habet;
nempe ut in contextu, restitui.

CONTRA defluxiones capitis frigore con-
ceptas efficax est, oculorum lachrymas exiecat,
dentium dolores lenit, aduersus capitis cru-
ciatum summopere prodest. Illitum fronti co-
mitiales, insanos, vertiginosos, & in vnuer-
sum omnem capitis noxam mulcet. Tabidis,
russiculosis, humorem à thorace reicientibus,
G 2 cardiacis,

100 CONFECTIONES

cardiacis, sanguinem excreantibus præsentis
est auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus.
Aduersus iliorum noxam, difficultatem urinae,
& eiusdem stillicidii valet, calculos cominuit,
omni ventris malo liberat. Quotidianis &
tertianis febribus circa accessionis initium,
sufferuefacto stæchadis iusculo, medetur.

Diacodion simplex D. Mesua.

* R. Caput Papaueris mediocrium flaccidorum numero x.

* Macerata horis xxiii. in Aquæ cælestis sextario vno, coquantur ad tertias, id est, tamdiu usque quò tertia pars aquæ super sit.

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ ℥ iiij.

Mellis optimi ℥ i.

Coquantur ad perfectionem.

Diacodii compositum verò ut fiat, addantur

Acaciæ, non ita aridæ, sed liquidæ:

* Rubiæ tinctoriæ Hypocistidis

Croci Myrrhæ

Balaustiorum [hoc est, florum malogranat. siluestrium] ana ℥ i.

Ranich ℥ iiij.

FLACCIDORVM, id est, non omnino recentium

centium, neque aridorum, sed medio habitu,
qualia sunt pridie decerpta. Si verò sicciora fue-
rint capita, biduo maceranda erunt.

SEXTARIUS mensura genus est, quod si
velle repleatur, pendet ℥ xxx. si oleo, pendet ℥
viiij. si verò aqua repleatur, pendet aqua ℥ xx.
hoc autem loco accipiendus est sextarius aqua
alestis: ergo aqua oportet esse uncias xx. ponde-
rales. Variant tamen Auctores in sextarij defi-
nitione, ut inferius in unguentis dicetur.

HYPOCISTIS, id est, ut hodie corrupto
nomine vocant, Hypocistidos.

RAMICH, compositio est peculiaris, qua
ponitur in Trechiscis.

MELLIS quantitas admodum parua vide-
tur esse in hac confectioe. Actuarius aliud ha-
bet Diacodion; quod huic subiiciemus statim.

DIACODION simplex confert eis qui-
bus ex capite ad pectus & ad pulmonem sub-
tiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.

Compositum autē, naturæ impetum sistit,
& sanguinis reiectionem à visceribus thoracis.

Diacodion D. Actuarij.

℞. Capita Papaveris, neque perquam viridia,
neque etiam ariditate exucca, numero xiiij.

G 3

Rosa-

Rosarum ʒ i. ʒ j. ʒ.

Croci Acaciæ

Dulcisradicis [id est, Glycyrrhiza.] ana ʒ j.

* Armenæ glebæ [id est, Boli Armeni.] ʒ ʒ.

Cinnamomi Hali

Hypocistidis

Florū siluestris Punicæ [id est, balaustrorum.]

ana ʒ j.

Myrti Dauci ana ʒ j.

Corallij candidi [id est, albi.]

Corallij rutili [id est, rubri.]

Rhois culinarij [id est, obsoniorum.]

Sanguinis Draconis

Florum Althææ ana ʒ j.

Seminis portulacæ ʒ j. ʒ.

Capita papaueris in celesti imbre sufficien-
ti duos dies macerato, postridie ad tertias co-
quito, & decoctum expressum ad iustam con-
sistentiam coquito cum mellis optimi ℥ ij. Po-
stremo deposito ab igne vase, species subtilis-
simè tritas adicito, & bene unito.

ʒ. hoc signum significat pondus, quod dicitur
Sicilicum, pendet autem tantum quantum ʒ ij.
& est quarta pars uncia unius.

HALVS aut Halum siue Alum, est Cōsoli-
da saxatilis, id est, Symphytum petraum, quod
hodie

die non habent Pharmacopola, ideoq; necesse
 Symphyti, siue Consolida maioris radices ac-
 bere. nam Galenus dicit, utile esse magnum
 symphytum, id est, Consolidam, ad omnia ad
 uerba Petraum, id est, Alum.

R H V S Culinarium, id est, quod nunc vo-
 cant Arabico nomine Sumach: oportet autem
 nucleatum, & pulpam eius accipere.

AUXILIO est coeliacis, dysentericis, lenitati
 intestinorum, alui profluvio cum aqua celesti,
 in qua spodium infusuerit aut succinum tor-
 re factum, vel cum stillaticio rosarum liquore.

Diacastorium D. Nicolai.

A

| | |
|------------------------------|--------------------|
| ℞. Castorij | |
| Myrobalanorum citrinorum | ana ʒ iiij. |
| minus ʒ j. β. | |
| Assæ fœtidæ | Myrrhæ |
| Euphorbij | ana ʒ j. ʒ xvij. |
| Aloës | ʒ j. β. minus ʒ j. |
| Folij [aut succedanei eius.] | |
| Artimoni [id est, Pyrethri.] | |
| Glycyrrhizæ | Tragacanthæ |
| Calami aromatici | |
| Nitri | Galbani |
| Schœnanthi | Opopanax |
| | G 4 Spicæ |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Spicæ Nardi Indicæ | |
| Sagapeni | Nucis moschatae |
| Cassiae lignæ | Leucopiperis |
| Macropiperis | Melanopiperis |
| Xylobalsami | [aut succedanei eius.] |
| Carpobalsami | [aut succedanei eius.] |
| * Colocynthis | Rhapontici |
| Styracis calamitæ | Zingiberis |
| Cinnamomi | ana 3 j. ̄ ij. |
| Staphisagriæ | |
| Dauci | Fœniculi |
| Petroselini | Apij |
| Sileris montani | Baccarum Lauri |
| Petrolei | Seminis Sinoni |
| * Styracis rubræ | [id est, rufa, purissima.] |
| Sanguinis draconis | Cardamomi maioris |
| * & minoris | |
| Thuris | Agarici |
| Mastiches | |
| * Salis Hammoniæ | Zedoariæ |
| * Anisi | ana 3 j. ̄ ix. |
| Thymbrae | Hysopi |
| Chamædryos | Pulegij |
| Origani | Balsamitæ |
| Ocimi | Brançæ ursinæ |
| Di&amni | [videlicet Cretenfis.] |

Semi-

minis Rutæ Aristolochiæ longæ
 Aristolochiæ rotundæ Ari
 bathematicum Afari
 luæ [videlicet minoris.]
 farum
 tellij ana ḡ xvij.
 bithymi Polypodij quercini
 opobalsami [loco eius oleū Garyophyllorum.]
 ana ḡ xiiij.
 typiados
 apparis [id est, radicis eius.] ana ḡ xij. *
 nacardij Sabinæ Gentianæ
 orticum rad. Mandragoræ ana ḡ x. *
 eucedani
 bsinthij ana ḡ viij.
 eos ḡ iij. ḡ
 tellis despumati triplum.

PETROLEVM hoc loco accipiendum est
 arum, flauum atque liquidissima tenuitatis:
 non nigrum & crassum.

STYRACIS rubea, id est, calamita rubea:
 oc enim loco non est accipiendus cortex ille fus-
 us & aridus, quem vocant Thymiana, atque
 nale Storacem rubeam. Sed Styracis calamita
 urissima gutta quibus rufus est color.

S A L I S Hammoniæ, hodie dicunt Armo-
 niaci.

niaci est autem hic duplex. Facticius, quo utuntur Chymista, Aurifabri & Ærarij. Atq. Natiuus, qui ad medicinam recipitur. Cum autem careamus natiuo, necesse est eius loco salē gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur sal hammoniacus facticius, ut puto; potest tamen tantilla eius portio tuto misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA Vrsina, hoc loco non significat eam herbā quam Germani Bernklau vocant foliis asperis, umbella & semine Anethi, odor & sapore cimicum, radice acri & feruida: sed eam brancam quæ in Italia Vrsina vocatur, radicibus longis, Tragacantha modo mucosis.

MABATHEMATICHVM, aiunt esse cauliculi siluestris succum; est autē cauliculus seu caulis agrestis id olus quod Cato & alij rei rustice scriptores apud Latinos Brassicam siluestrem vocant, cuius multa sunt species.

BALYPIAS, siue Alypum, quid sit, nondum constat: quidam interpretantur Mezereon, est, Chamelæam, sed falso: utrumque enim seorsum peculiari capite ab auctoribus depingitur vires habet acres, & atram bilem per aluū purgandi. possumus autem eius loco accipere Ephimum, Thymbra, aut Thymum.

P.

Huius confectionis descriptionem cum non A
legitimam, sed corruptissimam, Fuchsius &
Franciscus Alex. merito conquerantur, eam nos
sua integritati restituiamus; quamquam non
Fuchsi Myrepso deprauatissimo, ut neque
Francis. Apolline.

Alypias siue Alypum.] Eius, quæ hoc nomine B
die cognoscitur, herbam affabre tibi Mathiolus
suis illis heroicis commentariis depictam exhibet.

CONFERT cephalalgicis, epilepticis, ver-
ginosis, hemicranicis, paralyti omnium mem-
torum, & omnibus frigidis ægritudinibus,
tempore frigido nocentibus confert.

Michleta D. Nicolai.

Myrobalan. citrinorum
Chebulorum
Indorum omnium tostorum ana ʒ ij. β.
Myrobal. Bellericorum
Emblicorum tostorum ana ʒ ij.
Nasturtij tosti [id est, seminis eius.] ʒ ij. β.
Camini Anisi
Fœniculi Ammios
Carui ana ʒ j. β.
Omnia cruda terantur & macerentur in aceto
vini

vini modico xxiiij. horis, exiccentur cum in-
 sperso aceto; postea torreantur supra prunas,
 tostis addantur subsequencia.

Spodij [*id est, Eboris vsti.*]

Balaustiorum

Pulpæ Sumachij

Mastiches

Gummi Arabici

ana ʒ i, ʒ xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & com-
 misceantur cum Syrupi myrtini triplo.

Proprie valet ad hæmorrhoides, & ad ven-
 tris torsionem & rugitum lyenterix, & dysen-
 terix, & optima est omni solutioni ventris.

Electarium de Baccis lauri

D. Rhafis.

℞. Fol. Rutæ siccorum

ʒ x.

Ammios

Cumini

Nigellæ

Ligustici [*id est, seminis eius.*]

Origani

Carui

• Petroselini

Amygdalorum amarorum

Piperis nigri

Piperis longi

Mentastri

Dauci

Acori

Baccarum Lauri

Castorei ana ʒ ij.

Sagapeni

ʒ ʒ

Opopogon

Opopanacis 3 iiij.

Mellis despumati triplū [.i. lib. j. 3 iiij. 3 vij.]

SAGAPENV corrupto nomine vocatur
rapinum in Pharmacopoliis.

VALE ad colicam & iliacam passionem,
et doloribus intestinorum ex causa frigida vel
stomachica confert.

Diasatyrium D. Nicolai.

Testiculorum Satyrii recentium densorum
radicum Pastinacæ sativæ recentium

radicum Secacul [id est, Grietzelmoren.]

Lucis Indicæ Pincarum

Castaciorum ana 3 xij. ʒ.

Myriophyllorum

Zingiberis Anisi

Caruæ seminis

linguæ avis [.i. seminis fraxini.] ana 3 v. *

̄ xv.

Cinnamomi Caudarum Scincorum

seminis bulbi ana 3 ij. ʒ.

Moschi ̄ vij. ʒ.

Mellis despumati optimi ʒ iiij.

SATYRIUM habet duas radices, unam so-
lidam, alteram flaccidam: ex his tantum su-
nenda sunt densa & solida.

SEMI-

IIIO CONFECTIONES

SEMINIS Bulbi: Bulbus vulgò non est cognitus quare eius loco urtica semè accipere lice

SCINCORVM notandū est in primis non esse accipienda reptilia illa quadrupedia ex fossis quæ nos vocamus Vvassermolchen, siue Vvasser Eydexen; ut hætenus factitatum est. Veri autē Scinci iam denno in copia afferuntur ex Alexandria Ægypti, quos à Materialist expetant Pharmacopola in posterum.

POLLET contra vesicæ & renum imbecillitatem; iis etiam auxilio est, qui urinam reddere nequeunt; venerem stimulat, eamq. cetera de causâ cessantem, haud segniter restituit.

Diasatyrion aliud D. Mesue.

℞. Secacul albi & mundi, & elixati in decoctione cicerum, quorum prima aqua in qua decoquebantur, sit effusa ℥ j.

Testiculorum vulpis ℥ viij.

Radice Raphani ℥ iij.

Radice Lophi plani ℥ ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infundatur super eas lactis bubuli aut ouilli raturum, ut lac duos digitos emineat, adiciendum Olei sesamini

Butyri recentis non saliti ana ℥ iiij.

Coquantur

Coquantur cum facilitate vsque ad cōsum-
 tionem lactis, & donec omnino remollitæ
 sint radices, & habeant iustam spissitudinem
 sicut pultis crassioris: nam si aqueum quod in
 pectore & radicibus est, non consumatur, situm
 contrahit hoc medicamentum.

Postea affunde omnibus hisce prædictis
 radicibus,

Stellis despumati optimi P vj.

Succi Ceparum recentium P j.

Coque omnia simul ad perfectā decoctio-
 nem, deinde ab igne depone, & insperge sub-
 sequentium specierū minutissimū puluerem.

Caudarum Scinci cum renibus & sumine ℥ j.

Seminis Eruæ Zingiberis

Been albi Been rubri

Linguae auis [*id est, seminis fraxini arboris.*]

Seminis nasturtij Cinnamomi

Piperis longi Seminis Bauciæ

Seminis napi

Pulpæ seminis asparagi maximè recentis ana
 ℥ iiij.

Confice cum eis: ultimò verò adiiciantur sub-
 sequentia,

Pinearum mundatarum P j.

Fisticorum [*i. Pistaciorum mundatorum*] ℥ x.

Cere-

* Cerebellorum passerum 3 ij.

Confice & misce omnia optimè, & aromatiza cum

Moschi boni 3 j.

RADICIS Raphani, videlicet sativam quam vocamus Rettich.

LUPH planū] Duplex est Luph (id est, Serpentaria) crispum scilicet & planum: Crispum folia habet diuisa & crispa. Planum verò latius & plana, veluti Aron, unde utrique nomen inditum est. Vulgò autè apud nos caremus Luph id est, vera Serpentaria: idè eius loco accipiendæ sunt radices herba quam Aron vocant.

A TESTICULI vulpis] hoc loco non sunt accipiendi testes animalis, dicti vulpes; sed radices Satyrij siue Orchios, quæ habent similitudinem testiculorum vulpinum. Vnde etiã nomen herba accepit. qua in re quosdam turpiter errasse sci-

NAPUS est paruum, oblongum, densumque rapum: cuius sunt species plures, Bayerriſch rublein, Stechrublein, Merseburgisch & Bonfeldisch rublein.

BAUCIA est pastinaca sativa siue Caryota, Ghelbenmoren Germani vocant.

FISTICUM siue Phisticum, idem est quod Pistachium siue Pistacium.

P.

Testiculi vulpis hoc loco.] *Cordus hic Or-*
ix cū Satyrione cōfundit, ut ritè inquit Fran-
scus Alex. Quare Orchios dictio delenda est.
 VALET ad erectionem virgæ, multiplicat
 perma, & desiderium coeundi.

Theriaca D. Andromachi, ex Aëtio.

Trochiscorum scylliticorum ʒ xlviij.
 Trochiscorum de vipera, seu Pastillorū The-
 riacorum
 Trochiscorum Hedychroi Piperis nigri
 Opii Thebaici recentis ana ʒ xxviij.
 Rosarum siccarum Scordij Cretici
 eminis Buniadis agrestis Iridis Illyricæ
 Agarici albi Pontici [*id est, in Porto nati.*]
 Cinnamomi Succi Glycyrrhizæ sicci
 Opobalsami [*loco eius olei Garyophyllorum.*]
 ana ʒ xij.
 Myrrhæ Troglodyticæ
 Croci Cilicij Zingiberis
 Rheupontici [*id est, Rhabarbari.*]
 Radicum Quinquefolij
 Calaminthæ montanæ Marrubij comarum
 Stæchadis cacuminum & foliorum
 Petroselini Macedon.

H.

Costi:

114 CONFECTIONES

Costi recentis [*videlicet veri, non adulterini.*]
Piperis albi Piperis longi
Dictamni Cretici Thuris masculi
Schoenanthi [*id est, lunci odorati floris.*]
Terebinthinæ Chiæ [*i. in Chio insula nata.*]
Casia fistulæ [*videlicet Casia lignea vera.*]
Spicæ Nardi ana ʒ vj.
* Gentianæ radicis Polij comarum
Styracis calamitæ Seselios Massiliensis
A Abrotoni Seminis Thlaspios
Ammij Chamædryos comarum
Chamæpityos comarum
Hypocistidis succi Malobathri foliorum
Spicæ Celticæ [*id est, spica Romana.*]
Anisi Helladici [*hoc est cognomen Anisi à re-
gione, ubi optimum est.*]
Mei Athamantici [*vulgò Meu.*]
Fœniculi seminis
* Sigilli Lemnij [*aut eius panuria Boli Arme-
ni.*]
Chalcitidis seminastræ
Amomi racemi Acori radicis
Phu Pōtici [*accipe, verū, quod in hortis colitur.*]
Carpobalsami Hyperici cacuminum
Acaciæ liquidioris Gummi vermiculati
* Cardamomi ana ʒ iiij.
Dauci Cretici Galbani puri
Opopap

popanacis Sagapeni Perfici
 tuminis Iudaici [id est, Asphalti.]
 mentaurij minoris comarum Castorij
 ristolochiae tenuis ana ℥ ij.
 ini veteris odorati, quantum liquoribus &
 gummis dissoluendis satisfecerit.

stellis despumati optimi triplum. Hoc est
 ℞ xiiij. ℥ vj. vt sequetur paulo post.

Confice sic: Cinnamomum Crocumq. (vt
 Aëtius vult) vnumquodque per se terito, & si
 uoles etiam Rhabarbarū & Hedychroos Tro-
 chiscos: misce deinde inuicem optimè, postea
 reliquas herbas ac radices, & omnia arida si-
 militer tundito, semper similia cum suis simi-
 libus, aromata per se ac reliqua etiam per se
 seorsum. Postea (vt Aëtiiū imitari est animus)
 Crocum, Cassiam, Cinnamomū, & Lemniam
 terram in pila cum vino optimo tere atq. vni-
 o, ac reliqua omnia secundum artem addito,
 & melle despumato vniuersa excipito.

Ego verò ita pręparate consueui simili ferē
 ratione.

℞. Piper nigrum Piper album
 Piper longum Iridem Illyricam
 Zingiber Costum
 Amomum [aut eius succedaneum.]

H 2

Acorum

Acorum Cardamomum Carpobalsamum
 Incidenda minutim cōcidito, & in minutissi-
 mum puluerem conterito, & per angustissi-
 mum cribrum excernito, postea in scatula di-
 ligenter, ne expiret, extracta reponito, donec
 reliquis admisceas.

Postea

R. Radices Quinquefolij Gentianam
 Meon [*aut eius succedaneum.*] Phu
 Dauci Cretici radicem [*aut eius succedaneū.*]
 Aristolochiæ tenuis radicem Rosas
 Trochiscos scylliticos Scordium
 Trochiscos de vipera
 Calamitæ montanæ
 Marrubij comas Stœchadis comas
 Dictamnū Creticum Schœnanthum
 Polij montani comas Abrotonum
 Chamædryos comas Chamæpityos comas
 Nardum Celticam Hyperici comas
 Centaurij minoris comas, atque
 Castorium, & semina omnia.

Concidito omnia minutim, teritoque in
 tenuissimum puluerem, & per angustissimum
 cribrum excutito. Excussum puluerem prædi-
 cto quem reposuisti adicito, diuque donec
 perfectè commisti sint, in mortario terito, ad

hibitio

libita diligēti cura, ne quid inter tundendum
excernendumque percat, aut temerè ponderi
decedat: mox è mortario exemptū pulverem
iterum ne expiret reponito, vsquequò omnia
conficiantur. Interea R. Agarici optimi albis-
simi, atque in longa rectaq. capillamenta fis-
silibilis, frustra electa, ab his scobē deradito ℥ ij.
sed quia non facilè per se tunditur, neq. etiam
cum aliis, proptereà quòd in pulverem vola-
tilem resolutus euanescit, ita vt multum pon-
deri eius decedat: ideò ad scobem Agarici præ-
dictam infunde optimum vinum, & fac Tro-
chiscos minutos in tepida vmbra exiccandos,
exiccatos minutissimè contundito, atque per
cribrum excernito angustissimum, excreti de-
inde Agarici cape pondus, quod requirit com-
positio, videlicet ℥ xij. & prædicto pulveri
summa diligentia commisceto: quo facto,

R. Opium

Succum Glycyrrhizæ

Myrrham

Acaciam

Gummi

Hypocistida.

Concidito omnia in minutas partes, & mi-
stis superinfundito vini optimi quantū dissol-
uendis atque eliquandis succis satis fore con-
ieceris, exprimito, postea per rarum colū lique-

H ;

factam

factam & modicè calefactam pulticulam colato, ita ut nihil præter sordes in colo remaneat. Quòd si succi & liquores isti sordidi, & furculis foliisq. pleni fuerint, ponderi eorum aliquid addendum esse facile æstimare quis potest: quod in sequentibus densatis liquoribus etiam obseruandum est. Deinde

℞. Galbanum

Opopanacum & Sagapenum. hæc affuso optimo vino, modeste supra prunas dissoluantur, & per rarum linteum fortiter exprimantur: his dissolutis,

℞. Thus masculum

Bitumen Iudaicum, terantur quàm minutissimè poterint, addendo Terebinthinam & sincerissimam, aut ex scobe ac sordibus expressam Styracem, dissoluantur lento admodum igne, cum mellis despumati sufficienti copia, & ita calidam pulticulam postea cum reliquis calentibus misceto, & diligenter rudicula agitato, ne rursus in grumos concreseant thus & bitumen, ubi refrixerint: quapropter aliquando contritorum puluere est admiscendum. Quòd si hoc modo dissoluere, & miscere distingas, bitumen & thus vnà cum reliquis aridit, & cundito, & tantum Styracem atque Terebinthinam

minam dissoluto, atque melli despumato ca-
 denti admisceto. his factis,

℞. Cinnamomum

Malobathrum [*aut eius succedaneum.*]

Casiam fistulam veram

Trochiscos Hedychroi

Spicam Nardi Indicam; & simul tundito in
 tenuissimum puluerem:

Postea

℞. Crocum

Rheon siue Rhaponticum, id est, quod ho-
 die Rhabarbarum vocatur, & vnumquodque
 seorsum tundito, deinde iis misceto

Trochiscorum Hedychroi Cinnamomi

Casiae Spicae Nardi

Croci & Rhei Pontici, pulueres, diligētissime:

Postea

℞. Mellis optimi & aromatici, quale ē Li-
 thuania Dantiscū affertur, despumetur sedu-
 lō, despumari postremo mellis sume ℞ xiiij.
 ℥ vj. ex eo modicum infunde in amplum ahe-
 num ex aurichalco factum, & insperge paula-
 tim commistos paulō ante Trochiscorū He-
 dychroi, Cinnamomi, Casiae, Spicae, Croci &
 Rhei Pontici pulueres, alternis vicibus, mel
 despumatum tepidum, atq. pulueres iniicien-

H 4

do: quæ

do: quæ diligentissimè interim pistillo ligneo
agitanda sunt. Cum hæc optimè fuerint com-
mista, & floridum puniceumque colorem con-
traxerint, iniicito Lemniam terrâ antea sub-
tilissimè per se, deinde cū vino tritam, & vnâ
etiam Chalcitida aslatam, quâ hoc modo assa-
bis: Accipe purissimæ Chalcitidis circiter ℥
iij. eam in fictile nō ita profundum iniectam,
supra prunas ponito, donec liquefiat & bul-
liat; deinde ab igne auferto, & abiicito id quod
in superficie durum est atq. rufescit, & ex me-
dio eius sume ℥ iiij. & cum vino tritam atque
dissolutam medicamentum admisce. Postea pau-
latim etiam infundito tepesfactos liquores &
succos quos antea in vino dissoluisti, alternis
vicibus, succos, mel & reliquos pulueres, quos
primò contriuiisti iniiciens, simul etiâ admisce
Styracem Terebinthinamque & Opoballa-
mum, ita vt omnia exactissimè admisceantur,
atque sigillatim mel & pulueres commisce,
donec vniuersa vnita & in vnâ substantiam
reducta sint, assiduè agitando, ne grumi ali-
qui relinquantur, aut nodi.

Postquàm verò optimè totam cōfectionem
miscueris, indito in vas ex densa materia fa-
ctum, videlicet ex plumbo albo, quod hodie
stannum

annum appellant: oportet verò vt tertia aut
quarta pars vasis relinquatur vacua, vt effe-
rescens medicamentum attollere se queat, nec
refluat. Reponendum autem est hoc medica-
mentum, donec feruescat in tepido & sicco loco:
postquã verò subsederit, in frigido & sicco lo-
co conseruandum erit. Porro ego hac ratione
preparavi Theriacen: alij verò paulò aliter
conficiunt. Sed omniũ pessimè faciũt qui suc-
cos & liquores & reliqua omnia simul tũdunt,
postea tũsum puluerem impuro melli inco-
nuunt. Animaduertendũ etiã est, ne vini plus
quàm opus sit liquoribus & succis dissoluen-
tis adfundatur. Nã si vltra modũ vinũ succis
addatur, situm contrahet Theriaca: propterea
etiam non cõsueui Casiam, & Crocũ, & Cin-
namomũ vino permiscere, sed mel. vñ a quo-
us est vinũ nostrate: quod intelligentes qui-
ã ex recentioribus, qui de Cõpositis medica-
mentis scripserũt, iubẽt pro vino accipere co-
ctũ mustũ. hoc est, sapã passum aut defrutum,
quibustamen non assentior. Nã hæc vina sunt
pissiora, quàm vt in eis concreti atq. densati
succis, & liquores dissolui queant. Nam eius
tantũ rei gratia vinũ Antidoto huic permisce-
re soliti sunt veteres, quos & nos imitabimur.

H 5

Hæc

Hæc descriptio est sumpta ex Aëtio: paulo post ponetur ea quam transtuli ex Græco carmine Andromachi senioris.

VIPERAE serpentes sunt in Italia: inde etiam facti ex eis Trochisci petendi sunt.

TROCHISCI Hedychroi, inferius in Trochiscis describentur.

PIPERIS nigri. Andromachus senior qui inuentor est huius compositionis, hoc loco habet PIPER longum, in Carmine Elegiaco Græco

SCORDII Cretici. Optimum Scordium nascitur in Creta insula: nos interim nostrat utamur, satis efficaci. Porro verum Scordium herba est Chamadry similis, odore aliquo allij & nullo modo allium siluestre, ut hætenus magno errore crediderunt: nascitur in Saxonia quemadmodum & circa Nurembergam.

BVNIAS, id est, Napus: quid verò sit Napus dictum est in Diasatyrio Mesua & antea etiam

MYRRHAE Troglodytica. Troglodyta populi sunt Arabibus vicini: apud quos optimi nascitur Myrrha.

OPOBALSAMO vero caremus, ideoque eius loco accipiendum est succedaneum aliquod veluti est oleum Garyophyllorum.

CROCI Cilicij, id est, in Cilicia Asia regione nati

nati. & idem est quod Crocus Orientalis.

R H A P O N T I C U M hoc loco significat
habitarum. nam magna illa radix quā he-
re Rhaponticum vocant, falso hoc nomē habet.

C O M A E sunt folia & flores plantarum.

P I P E R I S longi. Andromachus senior hoc
habet P I P E R nigrum: Iunior verò An-
dromachus, id est, Senioris filius, ordinem nigri
& longi piperis inuertit, quem in hac composi-
tione sequimur: paulo post etiam Senioris The-
iacen adscripturi.

D I C T A M N U S Creticus folia habet alba,
anugine obducta, gustu acris ut Thymus: af-
fertur rursum ex Creta insula ad nos.

C A S I A fistula hoc loco significat Casiam
ligneam veram, qua iam iterum affertur, est q̃
Cinnamomo similis.

P O L I U M montanum duplex est: unū plu-
ribus surculis fruticosum, ac humi sparsum; al-
terum candidius & rectius se attollens. Maius
nascitur apud nos: minus affertur ex monte Pes-
sulano, & haec sunt veri Polij species, & totam
hiemem virent, ut Lauendula aut Thymus.
Vulgò non habuerunt verum Polium Pharma-
copola usque ad hoc tempus.

S T Y R A X, id est, Storax calamita: accipien-
da au-

da autem est hoc loco purissima eius resina: micas concreta.

SESELI, id est, Sileris montani. dicitur autem Massiliense, à prouincia Massiliensi, in qua prouenit optimum.

THLASPI est species agrestis Nasturtij, qua passim nascitur secus vias, semine rufo. sapore acri & glutinoso: quod ut habeant diligenter curent Pharmacopola. vocatur Germanic Vvegecressen.

CHAMAEPITYS vera est Iua: herba est tenuibus foliis, floribus paruis & luteis: nascitur copiosè ad Rhenum in Franconia in vineis & agris quiescentibus, praesertim Spira, Vvor. macia, & Vvirtzburgi, & aliis locis.

MALOBATHRVM est foliū Indū, cuius succedaneū est Spica tam Indica, quàm Celtica.

MEV, seu potius Meum non habemus: loco eius sumimus Sefeli Creticū, id est, Beruvurtz, aut potius Sison hoc loco: inferius enim sequitur Daucus Creticus.

SIGILLVM Lemnium, id est, terra Sigillata, qua signatur in Lemno insula, in qua effoditur haec terra, in cuius defectu sumatur bolus Armenus Leuanticus.

CHALCITIS hodie non à quouis cognoscitur:

est autem vitrioli nativi species. hac qui ca-
t, accipere possant vitriolū viride optimum:
ile est Goslarianum in Saxonia. Porro An-
machus mihi videtur Chalcitida Theriaca
cuisse, nigri coloris gratia: qui color ab omni-
in Theriaca requiritur sine aliqua ratione.
hi itaque videtur non necessario eam addi.
m horribili & aruginoso sapore totam com-
itionem inficit. At cum ego aliquando in
eriacā compositionē non adiecissem Chalciti-
saporē gratiore acquisivit hoc medicamentū.
nsulantur igitur hac de re Doctores Medici.
A M O M O vero caremus: eius loco accipimus
rpesium aut Acorum verum, id est, nostrum
laxum aromaticum.

A C O R V S verus, est illa radix quam hodie
sō vocant Calamum aromaticum.

A C A C I A, succus est fructus ex arbore, è qua
stillat gummi Arabicum, loco eius accipimus
uestrium Prunellorum succum inspissatum.

G V M M I vermiculati, id est, Arabici gum-
quod concretū est in grumos vermiū figura.

D A V C I Cretici vice accipere licet Sefeli Cre-
ū, id est Beruurtz, videlicet radicem eius.

S A G A P E N V M hodie vocant Serapi-
m, quod in Perside optimum provenit: Senior
Andro-

Andromachus Sagapeni habet 3 iiij.

Iunior verò tantum 3 ij.

ARISTOLOCHIA tenuis, id est, Aristolechia nostra longa vulgaris.

P. C. SCHOL.

A Abrotoni.] hanc dictionem, in Aëtio à Cornelio nario verso, non reperio.

B Rhaponticum.] Idipsum à Rhabarbaro differre alibi diximus. Radix autem illa magnae stat, Centaurium magnum Dioscoridis est.

Chalcitis.] Chalcitida commodè ac necessario semper Theriaca immiscenda esse, unà cum L. Fuchsio, & Franc. Apolline censesmus. Simulque somniū esse, aruginosum & horridum eius saporem in Theriaca praeter ceteris persentiri, ut imaginantur nonnulli, scimus & dicimus. rationibus autē hac aliāq; quae scholiis profero confirmare compendij egestas cum nō permittat, in nostrum opus, si fauerint Superi, ea omnia asseruantur.

Theriaca in omnibus antidotis ob multiplicem vsum potiores partes obtinet. Est enim famosa & salubris contra genera aegritudinū plurima, valet enim ad grauissimas passiones totius corporis humani: Epilepticis, catalepticis, apoplecticis, cephalalgicis, stomachicis, hemiplegicis.

micrani

tronicis prodest. Ad raucedinem vocis, &
 strictionē pectoris optima est: arteriacis,
 inflammaticis, hemoptoicis, ictericis, hydropicis,
 pneumonicis; iliosis, & vulnera in intesti-
 nis habentibus. Nephriticis, calculosis & coli-
 cis subuenit: mēstrua educit, & fœtū mortuum
 pellit: lepras, & variolas, & frigus periodi-
 cum, & cæteras passiones inueteratas emēdat.
 præcipuè contra omnia venena & serpentium
 morsus & reptilium valet. Sed diuersa est eius
 vis pro quantitate & qualitate vniuscuiusq.
 affectionis. Omnem defectionem sensuū rele-
 uit. Cor, cerebrū, hepar, stomachū confortat,
 & corpus incorruptum ducit & custodit.

*Theriaca Andromachi Senioris, è carmi-
 ne eiusdem elegiaco translata.*

. Trochiscorum Scylliticorum ℥ xlvij.
 Trochiscorum Theriacorum Piperis longi
 liquoris Papauerini [*id est, Opij.*]
 Lagmatidis Hedychroi ana ℥ xxiiij.
 foliorum Rosarum siccarum
 Indidis Illyricæ [*id est, Ircos.*]
 Syriacæ Glycyrrhizæ
 seminis Buniadis [*id est, Napi, vulgò Beyer-
 sche rublein*]

Scordij

Scordij

(lorum.

Liquoris Balsami [loco cuius oleū Garyophyl

Cinnamomi Agarici ana ʒ xij

Myrrhæ Costi Croci Coricij

Cassia [id est, Cassia lignea vera, aut succedanea

Nardi Indicæ (eius.

Iunci Arabici [id est, Schœnanthi.]

Thuris [videlicet masculi & electi.]

Piperis candidi Piperis nigri

Comarum Dictamni [id est, foliorum & flor
rum Dictamni Cretici veri.]

Marrubij

Rhei [.i. quod hodie vocatur Rhabarbarum.

Stœchadis

Petroselini [id est, seminis eius.]

Calaminthæ [.i. Calaminthi montani tenuifol

Lachrymæ terebinthi Libystiadis (lij.

Zingiberis

Quinque folij [.i. radicum eius.] ana ʒ vj

Polij [videlicet montani & albi, quod è Lugdu
no affertur.]

Chamæpityos

Styracis [.i. Styracis calamita sincera & electa.

Mei [quod vulgò Meu vocatur.]

Amomi racemosi [aut succedanei eius ut su

Nardi Galaticæ [id est, Celtica.] (præ.

Rubri

Subricæ Lemniæ [*id est, terra sigillata vera,*
aut Boli Armeni, vt suprâ.]

inu Pontici

Chamedryadis Creticæ [*.i. Chamadryos vera.*]

Blilorū Malobathri [*eius loco ponatur Macis.*]

halcitidis tostæ

adiciis Gentiadis [*id est, Gentiana.*]

inifi

Succi Hypocistidis

fructus Balsami [*id est, Carpobalsami, pro quo*

etiam succedaneum sumatur, sicut suprâ fa-
cta est mentio.]

ummi splendidi Seminis fœniculi

ardamomi Indici [*id est, minoris.*]

esellos tenuis Lachrymæ nigræ spinæ

halasprios Hyperici Ammios

agapeni ana 3 iiij.

astorei Aristolochiæ tenuis

reminis Dauci Bituminis

liquoris panacis [*id est, Opopanacis.*]

centaurij [*videlicet minoris.*]

halbanidis pinguis [*id est, Galbani recentis*
& puri.] ana 3 ij.

confice cum vino & melle. Hactenus An-
dromachus.

ini autem tantum accipias, quantū liquori-
us & succis dissoluendis satis fore conieccheris,

ut proximè dictum est. Mellis verò optimi
accipe ꝑ xiiij. ꝑ iij. ita detrahis Mellis ꝑ iij
de priori Theriaca, quia huic defunt Abroto
ni & Acori ana. ꝑ iij.

Confice autē & hāc Theriacā ut proximam
Andromachus Neronis medicus, primū cō
didit medicamentū hoc, eiꝯ declarationē heroi
cis carminibus descriptā nuncupavit. Sed *Gale
nus* mutata forma, cōpositionē reddidit meliorē

TROCHISCI Theriaci, sunt Trochisci de
vipera siue de Thiro, ut hodie vocant.

MAGMA hedychroū. i. Trochisci hedychroū
quos *Auicenna* vocat *Alinda rācaron*: quorū
compositionē in tractatū de Trochiscis inquire

CYANEAE, id est, Carulea vel nigra Gly
cyrrhiza, seu, ut hodie vocant, Liquiritia, qui
nigrum colorem habet. Intelligit autem *Andro
machus* succum Glycyrrhiza.

CROCVS Coricius, id est, in Corico Sicilia
monte nati, hoc est, Croci Orientalis.

LACHRYMAE Terebinthi Libyſtiadis. i.
Resina Terebinthina Libyca, in Libya Aphrica
regione nata. eius loco nos accipere possumus La
ricis resinam, qua ubique in Germania Tere
binthina improprie vocatur.

MEI loco, quo caremus, possumus accipere

Seseli

Seseli Creticum, id est, Beruvurtz, aut semen
grum & odoratum, quod hodie vocant impro-
prie Amomum, veteres autem Sison.

PHV Ponticum, non est Valeriana vulgaris,
sed ea herba quæ in Hestia vocatur Theriac-
raut, vel Gartenseliunck.

MALOBATHRVM nō habemus: eius loco
accipe Spica Romana radículas, vel Spica Ro-
mana & Macis ana partes æquales, vt Arabes
recipiunt, vel Casiam ligneam veram.

RADICIS Gentiadis, id est, Gentiana, à
Gentio Illyrici rege sic appellata, qui eam pri-
mū inuenisse creditur.

GUMMI splendidi, i mundi, sinceri & trans-
ucidī, videlicet Gummi Arabici cognominati.

NIGRA vel carulea spina, est arbor quæ
aliās dicitur spina Ægyptia: ex qua manat
gummi Arabicū. Per lachrymā verò etiam Andro-
nachus intelligit succum eius, qui Acacia vo-
catur, & fit ex fructu siliquacis huius spina eius
loco accipimus succum Prunellorum agrestium.

SESELI tenue, est Seseli Creticum, quod ex
manibus speciebus Seselios minimum & tenuis-
imum est. Germanicè vocatur Beruvurtz. po-
test tamen etiam vulgare intelligi.

DAUCVS, id est, Daucus Creticus. hoc loco

eius vice accipe semen Pimpinella nostratis, aut
radices Seselios Cretici: nihil enim refert, quod
bis accipiatur in hac compositione. est autē Seseli
Creticū, quod Germanicè vocatur Bervvurtz.

ARISTOLOCHIA tenuis, est illa qua
apud nos nascitur, longa cognomento, cuius ra-
dices gracilitate sua & longitudine imitantur
farmenta vitium.

Theriaca Diatessaron D. Mesue.

R. Gentianæ Baccarum lauri Myrrhæ
Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.
Mellis despumati optimi ℞ ij. id est, ℥ xxiiij.

DIATESSARON, hoc est, ex quatuor
simplicibus composita.

ARISTOLOCHIA rotunda, non est illa
radix quam nos Holvvurtz vocamus: sed alia
multo maior & tuberosa, intus solida, colore
buxi flauo, odore & sapore similis Aristolochia
longa nostrati. Affertur ex Italia & Heluetia.

THERIACA antidotus Diatessaron ad
affectus frigidos, tum cerebri, vt epilepsiam,
paralysem, spasmus cynicum: tum ventri-
culi, vt inflationem, & ab ea dolorem, tardam
coctionem: tum denique hepatis, vt hydro-
pem, cachexiam, obstructionem. Præterea
mor-

orsui Scorpionis, & potioni veneni confert.

*itbridatum ex Damocratis Græco carmi-
ne in Latinam linguam translatum.*

Myrrhæ Arabicæ Troglodytidis

roci Agarici Zingiberis

cinnamomi Spicæ Nardi

huris [*videlicet electi.*]

hlaſprios ana ʒ x.

esellos

Opobalsami [*aut oleum Garyophyllorum.*]

chœni [*id est, Squinanthi, ut hodie vocant.*]

cœchadis Terebinthinæ Chalbanae

Costi [*videlicet veri & aromatici.*]

Piperis longi Castorei Pontici

ucci Hypotistidis Syracis bonæ

Opopanacis

olij Malebathri recētis [*aut succedanei eius*]

ana ʒ viij.

Cassia nigra [*lignea aut succedanei eius.*]

olij Piperis albi Scordij

Seminis Dauci Cretici

roctus Balsami [*aut succedanei eius.*]

Cypheos

Bdellij ana ʒ viij.

Nardi Celticæ purgatæ Gummi

I ʒ Petro-

Petroselinii [*id est, seminis eius.*]

Opii papaueracei

Cardamomi

Seminis Fœniculi

Gentianæ

Foliorum Rosarum

Dictamni Cretici ana ꝓ v. boni ponderis.

Anisi

Arijitæ

Acori [*sine Calami aromatici.*]

Phu

Sagapeni ana ꝓ iij.

Mei Athamantici

Acaciæ

Ventris Scinci [*videlicet veri.*]

Fructus Hyperici [*id est, summitatum eius.*]

ana ꝓ ii.

Vini quantum sufficit

Mellis mensuram convenientem.

VINI quantum sufficit, id est, quantum satis est succis & liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensuram convenientem. in Græco est *σύνπυρρον*, quod idem significat. sint autem mellis optimi odorati & despumati ℥ ix. ꝓ viij. ꝓ ij.

CYPHI sunt Trochisci qui ad odorem suffiuntur. eius compositio habetur in tractatu de Trochiscis.

NARDVS Celtica, est Spica Romana. Pur-gata, id est, à paleis, terra & sordibus mundata. Radices eius tantum debent accipi.

ARI, in Græco est *ἄρις*, id est, *Arin*, quod nomen

men apud nullū alium auctore in Mithrida-
o scriptū inuenitur. Intelligit autē Democra-
s per Arion, siue Arium, Aron, id est, Arum,
quantum ego ratiocinari possum: nam Aron
regiam facit contra venenata medicinam.

ACACIA vera caremus: accipe ergo loco eius
succū Prunellorū siluestrium; diligenter spissa-
um, aut aliū quendā, quē Doctores substituent.
Nos inferius ponemus Acaciam succedaneam.

P. C. SCHOL.

Ari.] Asaripotius legendum esse, ex Gracis
nonnullis exemplaribus, existimo.

MITHRIDATICVM proximum est
in qualitate & virtute Theriacæ, & parum dif-
ferant: nisi fortē quod Theriaca est parum ca-
lidior & potentior contra venena serpentum.
Curat omnes passionēs capitis virorū vel mu-
lierū, si fuerint ex frigidityte, & maximē me-
lancholicis & timidis, epilepticis & hemicra-
nicis confert, & dolorē supercilij patientibus,
& lachrymaribus oculis, & ad omnia capitis
vitia vel aurium subuenit. Dentium dolori-
bus & palato, & omnibus vitiis oris & maxilla-
rum medetur, si super locū dolentem ponatur,
& itidem ad modū emplastri ponatur in tem-
poribus, vnde fit discursio. Synanchen soluit.

I 4

Apo-

Apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæmoptoicis, peripneumonicis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanū fiunt, succurrit: Iliacis, dysentericis, & lientericis cōfert, si datur cū decoctione balaustiorū: Extensionē humerorū, tetanos siue spasmos patientes, & paralyticos sine mora sanat: Diaphragmati & hypochondriis subuenit. Renibus & vesicæ opitulatur. Calculos frangit. Menstrua prouocat, * omniaq. vitia matricis excludit: Arthriticam atq. Ischiasim patientibus, & podagricis singulare præsidium est. Præcipuè datur contra venena omnia. Venenatos morsus siue rabidi canis, seu cuiuscunq. reptilis impositū siue bibitum, cū magna admiratione emēdat. Quotidianariis & quartanariis etiā ante horā accessionis cum vino tepido datū mirificè prodest.

Mithridatium aliud, vt ex Cleopatro & Antipatro, Galenus & Aëtius exscripserunt.

| | | | | | |
|------------------|---|-------|----|-------|-------|
| ℞. Myrrhæ | 3 | vij. | β. | ∞ | iiij. |
| Nardi tantundem. | | | | | |
| Croci | 3 | vij. | ∞ | iiij. | |
| Opij | 3 | iiij. | ∞ | ij. | β. |
| Styracis | 3 | v. | | | |

Cinna

namomi 3 vij. s. iij.
 corei 3 vj. s. j.
 ij 3 vj. s. iij.
 ardij 3 vij. s. iij.
 digiberis tantundem.
 isti 3 vj. s. iij.
 heris albi 3 v. s. ij.
 heris longi 3 vj. s. iij.
 elios 3 v. s. ij.
 rotoni tantundem
 troselini [*videlicet seminis.*] 3 iij.
 luci seminis 3 vj. s. iij.
 hæ 3 v. s. iij.
 uris 3 vj. s. ij.
 cci Hypocistidis 3 vj. s. ij. **ß**
 iardi Gallicæ 3 iij.
 eniculi seminis 3 iij.
 iardi Indicæ 3 iij. **A**
 iori [*aut Calami aromatici.*]
 u Pontici Sagapeni
 uctus balsami [*aut succedanei eius.*]
 yperici
 idis Illyricæ [*id est, Ireos.*] ana 3 ij.
 lubricæ Lemniæ [*loco eius Bolus leuanticus.*]
 umborum Scinci [*videlicet veri.*] (3 vj.
 ypheos, ana tantundem, i. 3 vj.

I s

Acaciæ

Acaciæ .iiij. Gummi Cardamomi

Pelecini ana ℥ ij.

Thlaspios ℥ vj. ℥ iiij.

Gentianæ ℥ iiij.

Anisi ℥ iiij.

Rosarum siccarum ℥ iiij.

Mei Athamantici tantundem

Schoeni [*id est, Squinanthi.*] ℥ vj. ℥ iiij.

Opopanacis ℥ vj.

Galbani ℥ vj. ℥ iiij.

Opobalsami tantundem [*cuius loco, ut supra,
oleum Garyophyllorum.*]

Aristolochiæ [*videlicet rotunda vera.*] ℥ ij.

Hyssopi ℥ iiij.

Marrubij ℥ j.

Chamæpityos ℥ iiij.

Libanotidis ℥ v.

Terebinthinæ ℥ vj. ℥ iiij.

Mellis Attici quod sufficit. (tipater

Vinū ne addas. Haftenus Cleophrantus & An.

Mellis autē despumati optimi & odorati su-
me ad totam confectiōē ℥ vij. ℥ vj. ℥ vj.
vinū ne addatur præcepit Cleophrantus, ideo
in aceto sunt dissoluendi liquores concreti, ut
Sagapenum, Opopanax & Galbanum: Con-
fice secundum artem.

M E L.

HELLIS Attici nobis copia non sit: ideoq;
id, quod optimum fuerit, recipiendum erit.

Compositio hac est valde mendosa in ponde-
re apud Aëtium, apud Galenum verò est
mendatior. Rursum simplicium numero aliqua
sunt apud Galenum, quæ ex Aëtio confectioni
hic restitui. Aëtius hunc Auctore vocat Cleo-
phantem, Galenus verò Cleophantem.

Hic character significat obolum: est au-
tem obolus pondus γ β . scrupuli videlicet dimi-
dum: itaque γ . oboli faciunt ζ \jmath .

NARDVS Indica hoc loco non significat Spi-
cam nardi Indicam, sed Malobathrum, id est,
Indum, quod nardi est species, & in In-
dia gignitur. Aëtius propterea hoc loco pro
Indica habet Phyllon, id est folium In-
dicum, cuius loco accipe Casiam ligneam veram,
quæ Cinnamomo est similis, aut Macis & radi-
cem Spica Romana ana ζ \ij .

ACORI, id est, radicis quæ nunc improprie
vocatur Calamus aromaticus.

PELECINI, seminis eius: in eius panuria
accipe semen Nigella agrestis & cornuta: est au-
tem omnino similis vera Nigella: nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmari-
num, sed Angelicam siluestrem minorem. Nam
plures

plures sunt Libanotidis species. Semen autē eius accipi debet, quod Cachrys vocatur.

P. C. SCHOL.

A Nardi Indicæ.] Galenus & Aëtius hic non Nardi Indica, sed Fol. Malobathri legunt.

Mithridatium D. Andromachi.

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|---|-------|
| R. Glycyrrhizæ | ℥ | vij. | ℥ | iiij. |
| Opij | ℥ | iiij. | ℥ | ij. |
| Castorei | ℥ | vj. | | |
| Polij | ℥ | v. | ℥ | ij. |
| Costi | ℥ | v. | ℥ | ij. |
| Nardi spicæ | ℥ | vj. | ℥ | ij. |
| Cassæ [videlicet vera.] | ℥ | v. | ℥ | ij. |
| Thuris | ℥ | vj. | | |
| Sesēlios | ℥ | v. | ℥ | ij. |
| Succi Hypocistidis | ℥ | vj. | | |
| Acori [id est, Calami aromatici.] | ℥ | ij. | | |
| Scordij [videlicet veri.] | ℥ | vj. | ℥ | ij. |
| Folij [loco eius sumatur Macis.] | ℥ | iiij. | | |
| Gallij | ℥ | v. | ℥ | ij. |
| Cypheos | ℥ | vj. | ℥ | ij. |
| Myrrhæ | ℥ | vj. | | |
| Groci | ℥ | vij. | ℥ | ij. |
| Cinnamomi | ℥ | vij. | ℥ | ij. |
| Styracis [videlicet optima.] | ℥ | v. | ℥ | iiij. |
| | | | | Dauci |

Nucis seminis 3 vj. s. iij.
 Cardamomi 3 vij. s. ij.
 Cardamomi Pontici 3 ij.
 Cardamomi [videlicet seminis.] 3 iij. s. iij.
 Cardamomi Gallicæ 3 iij.
 Cardamomi seminis 3 iij.
 Cardamomi Indicæ 3 iij.
 Cardamomi 3 ij.
 Cardamomi 3 ij.
 Cardamomi 3 iij.
 Cardamomi 3 iij.
 Cardamomi 3 vj. s. iij.
 Cardamomi Athamantici 3 iij.
 Cardamomi siccarum 3 iij.
 Cardamomi [videlicet Arabici.] 3 ij.
 Cardamomi 3 iij.
 Cardamomi [id est, Squinanthi.] 3 vj. s. ij.
 Cardamomi 3 vj. s. ij.
 Cardamomi [sive olei Garyophyllorum.] 3 vj.
 s. iij.
 Cardamomi 3 vij.
 Cardamomi [videlicet veri.] 3 ij. s. ij.
 Cardamomi 3 vj. s. ij.
 Cardamomi Chij quod sufficit.
 Mellis Attici cocti quod sufficit, hoc est, 2 vj.
 3 iij. 3 ij.

FOLIUM

FOLIUM duas res significat: folium Nardi
videlicet, aut Malobathrum, quod hic recipien-
dum est.

GALLION herba est multis minimis
floribus, luteis & odoratis. est autem speciei
Aspergula: Germanicè vocatur Ranritzen.

NARDVS Indica hoc loco nō significat Ma-
lobathrum, id est, folium; sed radicem Indici
nardi: nam nardi partes tres olim in vſu fue-
runt, videlicet radix, folium & spica. antea ve-
rò praecepit in hanc compositionem sumendam
esse Spicam nardi, & Folium, id est, Maloba-
thrum: idèò necessariò hoc loco per Indicam nar-
dum intelligit radicem Indici nardi.

Esdra antidotus ex Aëtio.

Rx. Amomi

℥ xij.

Florū iurci odorati [id est, florum Schoenanthi
earū loco sume summitates Schoenanthi.] ℥ ix.

Pyrethri

℥ vj.

Croci

℥ xxxvj.

Cinnamomi

℥ vj.

Myrrhæ troglodyticae

℥ xij.

Styracis calamitæ

℥ xvij.

Petroselini

℥ iij.

Seminis Dauci

℥ iij.

Traga-

| | |
|---|-----------|
| gacanthæ | Θ vj. |
| Hypocistidis | Θ ix. |
| Illyricæ [<i>id est, Ireos.</i>] | Θ xv. |
| feniculi | Θ vj. |
| ellij | Θ ix. |
| turis | Θ i. |
| phuris viui | Θ vj. |
| minis Hyoscyami albi | Θ xxvij. |
| lignæ [<i>aut succedanei eius.</i>] | Θ ix. |
| minis papaueris | Θ xxx. |
| Nardi | Θ xij. |
| minis Rutæ | Θ iij. |
| minis Ocimi | Θ iij. |
| ois Culinarij | Θ lv. |
| minis Anethi | Θ vj. |
| lari [<i>id est, radicum eius.</i>] | Θ i. |
| minis Cardamomi | Θ vj. |
| opij | Θ xxvij. |
| phorbij | Θ vj. |
| peris nigri | Θ xxx. |
| osarum siccarum | Θ ix. |
| hylli [<i>id est, Folij.</i>] | Θ xij. |
| obalsami [<i>sive olei Garyophyllorum.</i>] | Θ xxiiij. |
| entris mergi | Θ vj. |
| accæ | Θ xij. |
| | Lycij |

| | |
|--|-------------------|
| Lycij Indici | ⊖ xij. |
| Garyophylli | ⊖ xij. |
| Stercoris reperti in aluo mergi | ⊖ vj. |
| Rheu Pontici [.i. <i>Rhabarbari.</i>] | ⊖ xij. |
| Mei Athamantici | ⊖ vj. |
| Floris Nerij | ⊖ iiij. <i>β.</i> |
| Terræ Cimoliæ | ⊖ xij. |
| Succi Artemisiæ | ⊖ xx. |
| Foliorum Seridis [.i. <i>Cichorea.</i>] | ⊖ ix. |
| Spicæ Celticæ | ⊖ xij. |
| Castorei | ⊖ iiij. |
| Costi | ⊖ xij. |
| Gentianæ | ⊖ xij. |
| Confectionis Hedychroi | ⊖ ix. |
| Anisi | ⊖ vj. |
| Sifonis | ⊖ xvij. |
| Thymiamatis ammoniaci | ⊖ xij. |
| Foliorum citri | ⊖ xij. |

Vini veteris odorati quantū satis fuerit succis & liquoribus resoluendis. Mellis despumati optimi, vt Aëtius scribit interprete Cornario, libras v. aut vj. Sed nos singulis specierum vncias ternas vncias mellis adiiciemus. itaque sume mellis despumati odorati quā opti-
mi ℥ vj. ℥ vij. ℥ ij. *β.*

Arida omnia minutissimè contundito.

Opium

ium verò & Myrrham, Hypocistidē, Bdel-
 n, Lycium, Ammoniacum in vino dissol-
 o. Tragacantham deinde seorsum per se
 o vino dissoluto. Deinde omnia simul
 ceto, addendo etiam despumatam Arte-
 nia succum. In vniuersum hanc confectio-
 n eodem modo conficies, quo Theriacam,
 eodem modo dimittenda est vt efferuescat,
 a omnino repleto vase.

NICOLAUS Alexandrinus duas habet Esdra
 positiones, alteram Magna, alteram verò
 spaniensis cognomento: sed quia confusa &
 digesta tantum sunt moles, & numerosis,
 nulla harmonia coeuntibus simplicibus con-
 t, ideo nolimus eas hic ascribere, his duabus
 receptis paulo exactius compositis contenti.

RHOIS Culinarij, id est, Sumach, videlicet
 lpa eius sine osseis seminibus.

PHYLLI, id est, Folij, cuius loco pene Spica
 mana, Macis ana \odot vj.

TERRA Cimolia, eius loco accipe Bolum
 rum praparatum.

SISON est semen illud nigrum quod apio si-
 le est, & vocatur improprie Amomi semen.

THYMIAMA Hammoniacum, i. Gummi
 ammoniacum, quod vocant Ammoniacum.

K

VEN-

VENTRIS Mergi, id est, Stomachi au-
Mergi. Germanicè vocatur ein Taxcher.

NERTON. i. arbor Oleander, pro cuius flo-
ribus accipe radices Vincetoxici. Legitur etiam
in Aëtio rosarū Rhododaphnis; sed idē est quo
flos Nerij: idē alterū tantū eorum posuimus.

Mirificè contra lethalia venena prodest
aliosq. vsus multos habet, quos apud Aëtium li-
bro 13. cap. 101. Paulum libro 7. cap. 11
Actuar. in libro De composit. medica. reperie-

Esdra Antidotus ex Actuario.

| | |
|--|------------|
| ℞. Mameræ | ℥ j. |
| Amomi [eius loco sume nostrum Calamum aromaticum.] | ℥ ij |
| Iunci odorati [id est, Squinanthi.] | ℥ β |
| Pyrethri | ℥ viij. |
| Croci | ℥ j. |
| Myrrhæ | ℥ iiij. |
| Styracis | ℥ β. ℥ ij. |
| Petroselinii | ℥ iiij. |
| Tragacanthæ | ℥ j. |
| Succi Hypocistidis | ℥ iiij. |
| Ireos | ℥ β. ℥ ij. |
| Seminis fœniculi | ℥ j. |
| Folij [aut succedanei eius.] | ℥ iiij. |
| | Radic |

Radici Ponticæ [*id est, Rhabarbari.*]
 Rosarum siccarum Glycyrrhizæ
 lorum siluestris Punicæ
 cinnamomi ana ℥ iij.
 Jardi Celticæ ℥ j.
 Mellis despumati ℞ vi. ℥ ix. ℥ vij.
 Myrrham & Hypocistidem in vino dissol-
 ue modico; Tragacantham verò per se etiam
 dissolue, & confice secundum artem. Actuarius
 ponit absurdum conficiendi modum, quem
 non sequimur.

*Mamera loco sume Doronicum Romanum.
 lorum siluestris Punicæ, i. florū Balaustiorum,*

C O N D I T A.

Caro Citri Cortices Citri Flores Citri
 Arantia integra Cortices Arantiorum
 Flores Arantiorum Limones
*Limones cōditi frequēter pro Chebulis cōditis
 vendūtur. Sed facile deprehenditur dolus. Nam
 chebuli unū tantū magnū & lignosum habent
 nucleum: Limones verò multa semina, &c.*
 Chebuli Myrobalani Bellerici Myrobalani
 Emblici Myrobalani Citrini Myrobalani
 Radi Myrobalani

K 2

Omnes

Omnes quinque Myrobalanorum species i
afferuntur ex India condita. (11)

Nuces moschatę integrę vt ex India afferu

Iuglandes Citonia Mespyla

Pyra moschatella Cerasa

Pruna siluestria Garyophylli

Piper in racemis vt ex India affertur.

Calamus aromaticus [id est, verus Acorus

Galanga Zingiber Enula campan

Secacul [id est, Sifer: Germanicè Gritzelm
ren, Clingelmoren.]

Eringium

Pimpinella [nostra.]

Crethami [agrestis radix.]

CRETHAMVS agrestis herba est Ering
propemodũ foliis: Germanicè vocatur Sichel
ren & Sichelkraut: nascitur in agris pinguib

Omnia diligenter Saccharo clarificato co
diantur secundum artem.

CONSERVÆ.

Anthos [id est, flos Rosmarini.]

Boraginis Buglossi

Cichorij Fumi terræ Lauendulæ

Maioranæ Melissæ Menthæ

Nyr

Nymphaeæ seu Nenupharis
 Primulae veris. *Primula veris, idem est quod
 herba paralyfis.*

Colosarum Paeoniae
 Violarum Cardui benedicti

Liliorum conuallium
 Liliorum tiliæ Euphrasiae

Sambuci Hyssopi Acetosae
 Betonicae Scabiosae Salviae

Flores minutissime incidantur, & singulis
 libris florum addantur Sacchari albissimi li-
 brae duae, videlicet qui humidi & mucilaginosi
 fuerint, vt Boraginis, Buglossi, &c. Siccioribus
 vero, quales sunt Anthos, Lauendulae, Maio-
 ranæ, Melissa, Salvia, Mèthe & similibus, ad-
 dantur Sacchari albissimi librae duae & semis.

Diacitonium simplex.

℞. Carnium Citoniorum vapore aquae dulcis
 coctorum, & ad spissitudinem coctorum.
 Sacchari albissimi despumati, & ad spissitudi-
 nem iustam cocti ana ℥ viij.

Coquantur ad solidam consistentiam, & extenda-
 tur in tabulam feruens massa, refrigerata in par-
 tes incidatur. Quidam octo ℥ carniū Cito-
 niorum, addunt sex ℥ Sacchari clarificati.

K i

Poteris

Poteris etiam ita facere.

R. Citoniorum excocticorum & ab interioribus mundatorum ℞ viij. Sacchari clarificati ℞ iiij. Coque Citonia super vaporem aquae dulcis: deinde vnā cum Saccharo ad iustam spissitudinem coque.

Peculiare remediū est fluxus, vel vomitus, quoniam stipticat & corroborat membra colapsa, debilia. Confortat stomachū, virtutem retentiuam & digestiuam: & summopere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum, & ad vomitum compescendum post cibum.

Diacitonium compositum D. Nicolai.

R. Carnium Citoniorum comminutarum & coctura inspissatarum ℞ iiij.

Mellis despumati ℞ iiij.

Coquantur simul ad iustam consistentiam; & postquam ab igne deposueris antequam refrigerentur, insperge subsequentes species in tenuissimum puluerem contritas:

Cinnamomi ℥ j. β.

Zingiberis ℥ j.

Piperis

Galangæ ana ℥ β.

Garyophyllorum

Nucis

cncis mōschata ana 3 iij.
 mica Nardi
 igni aloës Macis
 cardamomi ana 3 ij.
 edoaria 3 i.

Extendatur tota massa in tabula marmorea
 ius rosacea aqua inuncta, in qua aliquid
 loschi dissolutum fuerit.

Et quando ut alium soluat conficere volue-
 s, antequam in tabula marmorea extenda-
 ur, in vnamquamque lib. adde Scammoneæ
 β. quæ bene trita subigatur composito.

MEL habet Nicolaus, ego potius consulerem
 ut Saccharum loco mellis adderetur.

Quadam exemplaria habent Mellis lib. iij.
 sed Nicolai exemplar, quod ad meas manus per-
 venit, habet lib. iij. Nam necesse est etiam, ut
 species suum conseruatuum habeant.

Hoc est calidius & melius ad ea quæ diximus,
 resoluit vëtositates, remouet fœtorē corporis,
 restituit pristinū colorem & magis restaurat.

Diacitonium è succo Citoniorum.

Succi Citoniorum despumati 2℥ xij.

Mellis optimi despumati 2℥ xij.

Sacchari albissimi clarificati ana 1℥ ij.

modica K 4 Coquan-

Coquantur simul ad iustam spissitudinem:
deinde ab igne remotis & adhuc repentibus
insperge subsequentium specierum pulveres
minutissimè tritos, & per cribrum excussos.

℞. Cinnamomi

Nucis moschatae ana ℥ iiij.

Garyophyllorum Zingiberis

Galangæ ana ℥ ij.

Radicularum nardi Celticæ

Piperis nigri Ligni aloës

Macis Zedoariæ Cubebæ

Cardamomi ana ℥ j.

Confice secundum artem.

S Y R U P I.

Syrupus de Duabus radicibus.

℞. Radicum Petroselinii

Radicum Fœniculi ana ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit

Sacchari clarificati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

* VISCERA obstructione laborantia reseruat.

Syrupus de Quinque radicibus.

℞. Radicum Apii Radicum Fœniculi

Radicum Petroselinii Radicum Runci

Radicum

Radicum Asparagi ana ℥ iiij. A

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari ℞ iiij.

Coquantur secundum artem.

CONFERT febribus pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

P. C. SCHOL.

Ana ℥ iiij.] Sacchari quod in hunc Syru- A
 um recipitur, perpensa quãtitate, nimiam non
 esse hic radicum cuiusque unciam quatuor
 assumptionem industriè Cordus existimauit;
 Euchsio quamquam secus videatur.

Syrupus acetosus simplex, ex descri-
 ptione Mesua.

℞. Aceti vini ℞ iiij.

Sacchari clarificati in aqua ℞ v.

Coquantur secundum artem.

EST communis ad omnẽ materiam, digerit
 choleram, phlegma & melancholiam, ratione-
 que aceti attenuat crassos humores; incidit
 viscosos, duros mollit, ineptos euellit, ubique
 penetrat, oppilationes aperit, prouocat vri-
 nam, putredini resistit, & corrigit malitiam
 humorum: idcirco in febribus pestiferis iuuat:
 sed ratione remissæ frigiditatis, tenues & sub-

K 5

riles

riles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat.

Syrupus Acetosus compositus,

D. Mesue.

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apij

Radicum Endiuix ana ℥ iij.

Seminis Anisi Seminis Fœniculi

Seminis Apij ana ℥ i.

• Seminis Endiuix ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit.

• Sacchari optimi ℞ iij.

Aceti acerrimi ℞ ij.

Coquantur secundum artem.

BILEM crassam & anulsu difficilem, ac pituitam incidit, terget obstrueta hepatis, lienis, renum, aperit.

Syrupus acetositatis Citri.

℞. Acetositatis mali Cuius per pannum destillatæ ℞ vj.

Sacchari albissimi ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

R A R O habent Pharmacopola Syrupū acetositatis Citri verum in nam plerumque venditur pro eo Syrupus Citreorum conditorum. Porro cum quis bene conficere voluerit, oportet ut per
filtrum

filtrum aut pannum destilletur acetositas Citreorum, sine ulla vi aut expressione, alioquin coagulatur, cum refrixerit, Syrupus.

P. C. SCHOL.

Rx. Acetos. mali Citrei ℥vj. &c.] ℞ vij. Fuch- A
sius, & Sacch. lib. 5. legi vult. Verum cum Cor-
dus in hac Syrupi descriptione Mesuem non se-
quatur, ut conferenti liquebit, sed suo Marte
eandem descripserit; frustra conqueritur Fuch-
sius. Mesues autem nomen inscriptioni additum
fuisse, ut & Syrupo de Agrestæ; scriptoris vitio
id factum fuisse hinc liquet; quare utrobique
id ipsum à me deletum est.

Æ s t v m ac feruorem bilis flauæ, febrium-
que ardentium & pestilentialium mitigat, Gu-
tim quoque vehementem restringit.

Syrupus acetositatis Limonum.

Rx. Acetositatis Limonum maturorum per fil-
trum destillatæ ℞ vj.

Sacchari albißimi ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

V E H E M E N T I V S infrigidat & penetrat,
quàm Syrupus acetositatis Citri, & valet con-
tra putrefactionem, contra vermes, vehemen-
tiam caloris febris, & alios crudos humores.

Syrupus

Syrupus Aranciorum acetosorum.

Rx. Succi Aranciorum acetosorū per pannum
aut filtrum destillati P vj.

Sacchari albissimi P iij.

Coquantur secundum artem.

*Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo
Aranciorum dulcium.*

Syrupus de Agrestæ.

Rx. Agrestæ P v.

* Sacchari clarificati P iij.

Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus uuarum immaturarum, qui Gracè vocatur Omphacium, & inspissatus seruatur: hoc autem loco recipienda est Agrestæ nondum ad spissitudinem decocta.

Agrestæ exprimi debet ex generosissimis uuis, apud nos paulò ante maturitatem.

IN magnis æstibus ad sitim restinguendam mirificè cōfert: Vomitū & alui profluuium biliosum sistit: Febribus biliosis succurrit: Gravidarum vomitum etiā reprimat, ac ventriculū earundem firmat: Venenisq. aduersatur.

Syrupus de Pomis D. Mesue.

Rx. Succi pomorum dulcium

Succi pomorum acetosorum ana P v.

Coquan-

Coquantur, despumantur & colentur: deinde adde

Sacchari P iij.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis siue nalis, qualia sunt quæ Vveynlingē siue vveynerulen vocantur. in acetosorum genere ex dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

C O R imbecillum roborat, ob id syncopen & cordis tremorem sanat.

Syrupus Granatorum dulcium

D. Mesua.

Rx. Succi Granatorum dulcium P v.

Sacchari albißimi P iij.

Coquantur secundum artem.

M A L E hodie faciunt Syrapū Granatorum, indifferenter cum dulcibus acetosa Granata miscentes. oportet enim utrumque Syrupum tam acetosorum quā dulcium granatorum seorsum conficere: nam diuersis morbis, morborumq; accidentibus medentur.

S I T I M, tussim, & pleuritidem iuuat.

Syrupus Granatorum acetosorum D. Mesua.

Rx. Succi Granatorum acetosorum P v.

Sacchari albißimi P iij.

Coquan-

Coquantur secundum artem.

FEBRES biliosas, & quæ ex pituitosis
Inflammam multam inuehant, iuuat.

*Syrupus Dinarj, siue Byzantinus
simplex D. Mesua.*

℞. Succī Endiuīæ Succī Apij ana ℞ ij.
Succī Lupuli

Succī Buglossę domesticę aut siluestris ana ℞ j.
Succī depurentur & despumentur dum ma-
neant ℞ iiij.

Sacchari optimi ℞ ij. ℞.

Coquātur cū facilitate, donec fiat Syrupus.

Q V I D A M differentiam faciunt inter Sy-
rupum Dinarj & Byzantinum seu de Byzan-
tiis, alterum simplicem, alterum compositum
vocantes. Sed nos simplicis & compositi nomine
distinguiamus, utrumque Dinarj siue Byzanti-
num appellantes.

H V M O R E S crassos & lentos incidit atque
extenuat, obstructions aufert, morboque re-
gio succurrit.

Syrupus Byzantinus compositus

D. Mesua.

℞. Succī Endiuīæ veræ

Succī Apij ana ℞ ij.

Succī

Succu Lupuli
 Succu Buglossę domesticę aut siluestris ana ꝑ j.
 In succis decoquantur
 florum rosarum ℥ ij.
 Glycyrrhizę ℥ iiij.
 Seminis Anisi Seminis Fœniculi
 Seminis Apij ana ℥ iiij.
 Spicę nardi Indicę ℥ ij.
 Colaturę adde Aceti ꝑ ij.
 Sacchari albissimi ꝑ ij. β.

Coquantur secundum artem diligenter.

SYRVPVS Byzantinus compositus, est ef-
 ficacior simplici.

Syrupus de Artemisia D. Ioan.

Matthęi de Gradi.

ꝙ. Artemisizę M. ij.
 Pulegij Calaminthę
 Origani Melissę
 Dictamni Cretici Persicarię
 Sabinę [id est, Sauina.]
 Amaraci [hic accipe Maioranam.]
 Chamędryos
 Perforatę [id est, Hyperici.]
 Chamępityos [id est, Iuę arthritica.]
 Comarum Matricarię Centaureę minoris
 Rutę

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rutæ | Betonicæ |
| Buglossæ | Radicum Fœniculi |
| Radicum Apij | Radicum Petroselinij |
| Radicum Asparagi | Radicum Brusci |
| Radicum Saxifragiæ | [<i>eius loco accipiantur radices Pimpinellæ.</i>] |
| Radicū Enulæ campanæ | Radicum Cyperi |
| Radicum Rubeæ tinctorum | Radicū Ireos |
| Radicum Pæoniæ | ana M. j. |
| Baccarum Iuniperi | Seminis Ligustici |
| Seminis Petroselinij | Seminis Apij |
| Seminis Anisi | Seminis Nigellæ |
| Carpobalsami | [<i>aut succedanei eius.</i>] |
| Costi | Radicum Alari |
| Radicum Pyrethri | Cassie lignæ aromaticæ |
| ★ Cordumeni | Calami aromatici |
| Phu [<i>id est, radicis eius.</i>] | ana ℥. β. |
| Aquæ quantum sufficit | Sacchari P. iij. |

Coquatur omnia magna diligētia secundum artē, ne plusquān necesse sit aromata bulliāt.

Pro vulgari & falso Dictamnō hic debet poni Dictamnus Creticus, qui singulariter facit ad ea ad quæ Syrupus hic est compositus.

SAXIFRAGIAM Itali vocant eam herbam quam nos Pimpinellam appellamus, & huius radix hic debet accipi.

M E D E.

M E D E T V R passionibus matricis, & reti-
net eam in proprio loco: resoluit frigiditates,
ventositates, & dolores: corroborat nervos,
aperit poros, sanguinem corrigit, menstruis
imperat & prouocat.

Syrupus de Absinthio maior D. Mesue.

R. Absinthij Romani ℞ β.

Rosarum rubearum ℥ ij.

Spicæ Indicæ ℥ iij.

Vini clari veteris & optimi ℥ lxx.

Succi Cydoniorum ana ℞ ij. β.

Macerentur in vase marmoreo aut fictili

denso per noctem vnam, deinde decoquantur.

Colaturæ adde Sacchari ℞ ij.

Confice secundum artem.

A B S I N T H I V M Romanum, id est, Absin-
thium Ponticū gustu adstringens, & aromati-
cum: vulgare autē dicitur rusticū Absinthium.

V E N T R I C V L V M roborat & iecur, alia-
que instrumenta nutritionis, appetentiamque
excitat, contra regium morbum prodest, fla-
tus discutit, humoresque per vrinam pellit.

Syrupus Infusionis rosarum.

R. Infusionis rosarum ℞ v.

Sacchari clarificati ℞ iij.

L Coquan.

Coquantur cum facilitate.

Est conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendū excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistens putredini, conueniens tempore pestilentia, & resistens venenositati.

Syrupus Infusionis Violarum.

Rx. Infusionis violarum p. v.

Sacchari clarificati r. iiii.

Coquantur cum facilitate.

FEBRIBVS acutis, iecinoris & cordis caloribus, asperitati gutturis, morbo laterali, tussiq; arida succurrit, sitim restinguit, aluumque emollit.

Infusio Rosarum Mesuae.

Rx. Foliorum rosarum p. j. ponantur in vrceo angustiori, & infunde illis aque calida lib. iij. aut quantum sufficit, vt madeant. Macerentur per horas viij. aut xij. obstructo fictilis orificio: deinde exprime leuiter, & excola infusionem, abiectis rosis, & iterum inde recentes rosas, & infusionem excolatam calefac, & infunde rosis, ac obstructo orificio vrcei in calido loco dimitte per horas viij. vel xij. postea rursum

sum excola, & colaturam infunde aliis recentibus rosis, & tertio dimitte: & si efficaciorē facere volueris, etiam quarto recentes rosas in eodem diluto recalefacto macera, ac postremo addito saccharo, Syrupum facito.

Porro quidā tundunt Rosas, quidam verò integras ponunt: & tusa quidē celerius vim suam & colorem in aquam deponūt, ac minorē locum occupant. At viola cū tunduntur, aliquā herbaceam & tēdiosam acrimoniam acquirūt, hoc est, sy crygen einen gruseaden geschmack im mund. quare consulantur hac de re Doctores medici.

Hac infusio dicitur alio nomine Mucharus, & Mucharum, siue ex Violis siue Rosis fiat.

Mesue tantū bis iubet rosas infundi: melius verò est ut saepius recentes abiectis substituātur.

Infusio Violarum.

Infusio Violarum eodem modo fit quo Rosarum infusio.

Syrupus de Succo Fumi terra maior

D. Mesue.

℞. Myrobalanorum Citrinorum
Myrobal. Chebulorum ana ʒ xx.
Florum Boraginis Florum Buglossæ
Florum Violarum Absinthij

L 2

Cuscutæ

Cuscutæ ana ℥ i.
 Glycyrrhizæ Rosarum ana ℥ iij.
 Epithymi Polypodij ana ℥ vij.
 * Prunorum enucleatorum
 Passularum enucleatarum ana ℞ β.
 Tamarindorum
 Pulpæ Casiæ fistulæ ana ℥ ij.
 Aquæ ℞ x.

Coquantur secundum artem ad tertias, de-
 inde cola, & colaturæ adde

Succi Fumi terræ depurati

Sacchari albißimi ana ℞ iij.

Coquantur lento igne ad iustam consisten-
 tiam, & reponc.

*Meum exemplar manu scriptum habet Pru-
 norum ℞ β. quemadmodum passula.*

Syrupus fumariz maior ventriculū & hepar
 roborat, obstructions aperit, cutis morbos,
 præcipuè ab humore falso vel vsto natos, vt
 pforam, leprā, imperiginē, serpiginem curat.

Syrupus de Mentha maior D. Mesuæ.

℞. Succi Cytoniorum muzorum

Succi Cytoniorum dulcium

Succi Granatorum acerosorum

Succi Granatorum dulcium

Succi

Succi Granatorum muzorum ana ℞ j. β.

In succis macerentur per horas xxiiij.

Menthæ siccae ℞ j. β.

Rosarum rubearum ℥ ij.

Coquantur deinde cum facilitate vsque ad medietatis consumptionem: colentur, & colaturæ adde

Mellis vel Sacchari ℞ ij.

Coquantur ad perfectionē: & cum reponis, aromatiza cū Gallia moschata vera trita, & in sindone ligata, atq. ex orificio vasis suspensa.

MUZORVM, id est, in vini sapore acescentium: nam muzus sapor de dulcedine & aceto- sitate aliquid habet.

Notandum est, si quis cum melle velit hunc Syrupum conficere, ut accipiat mel odoratum aromaticum, quale è Dantisco aduehitur: vel tale aliud, ut est quod vocant virgineum mel, & Saxones Kruthonich, quasi aromaticū mel, & non illud vulgare flatuosum.

Ventriculum frigidum roborat, ob id nau- seam, vomitum, singultū, fluorem alui sedat.

Syrupus de Mentha minor D. Mesua.

℞. Succi Menthæ depurati ℞ j.

Succi Granatorum dulcium ℥ iij.

L 3

Succi

Succi Granatorum acetosorum, ad medieta-
tem coctorum.

Sacchari vel Mellis ana ℞ j.

Coquantur sensim secundum artem.

*In hoc quoq. Syrupo notandū est, quòd in proxi-
mo Syrupo de Mētha maiore diximus de melle.*

Eandē ferè cum superiore facultatē habet.

Syrupus de Calamintha D. Mesuae.

℞. Calaminthæ domesticæ

Calaminthæ silvestris ana ℥ ij.

Ligustici [*seminis scilicet.*]

Dauci [*videlicet seminis eius.*]

Schoenanthi ana ℥ v.

Passularum enuclearum ℞ β.

Mellis ℞ ij.

Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

*MEL cū additur huic Syrupo, tunc oportet
esse optimum & aromaticū mel, ut antè etiam
dixi, idque in omnibus Syrupis & Oxymellibus
obseruandum est.*

*POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Sy-
rupus, quia pauci optimum & aromaticum
mel emere & expetere consueuerunt.*

*DOMESTICA Calamintha, est qua in
agris*

*agris & cultis locis nascitur. & vulgò vocatur
Korumintze.*

*SILVESTRIS autem Calamintha, est
qua in incultis locis & montibus prouenit, &
appellatur Calamintha montana.*

*LIENOSIS plurimum confert, quibus
durus est lien & pænè irresolubilis, & his qui
frigida viscera habent, & asthmate laborant,
præsertim in senibus, & in habentibus anti-
quas tussis: si quis enim vel pectus, vel ventri-
culū, vel intestina crassa tenaci & irresolubi-
li materia plena habeat, hoc Syrupo sanatur.*

Syrupus de succo Endiuia simplex.

R. Succi Endiuia depurati ℞ viij.

Sacchari Tabarzeth ℞ v. s.

Coquantur secundum artem.

*ENDIVIA vera, est herba satiuæ, cauli-
bus, folijs q̃ Cichorea similibus, maioribus ta-
men pinguioribus q̃; flores etiam similes sunt
Cichorea. allatum est semen eius ex Italia, &
iam multis in locis apud nos feritur.*

*Valet principaliter ad omnes supercale-
factiones hepatis, & aliorum membrorum
nutritiuorum, & in morbo laterali maxime
conuenit.*

Syrupus de Endiuia compositus.

R. Endiuia recentis Boraginis Scariolæ
 Hepaticæ Melissæ Buglossæ Lactucæ
 Eupatorii ana m j.

Seminum frigid. maiorum ana ℥ j.

Santali albi Santali rubri ana ℥ j.

Florum cordialium ana ℥ iij.

Coquatur secundū artē, in sufficienti quantitate aquæ: deinde cola, & colaturæ adde

Succi Endiuia depurati P j.

Vini Granatorum ℥ iij.

Sacchari albi P iij.

Fiat Syrupus secundum artem.

V A L E T præcipuè ad supercalefactiones hepatis cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & generaliter confert cuilibet complexioni calidæ, & est aperitiuus oppilationum, & confortatiuus membrorum debilitatorum à mala complexione calida: est etiā digestiuis materiaram cholericarum acutarum.

Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro

Nicolai Florentini.

R. Endiuia domesticæ

Endiuia silvestris Cichorij

Taraxaci ana m ij.

Cicerbitæ

Dicerbitæ Heparicæ Scariolæ Lactucæ

umi terræ Lupulorum ana m. j.

Hordei non excorticati ℥ ij.

Vesicariæ [id est, Alkekengi.]

Glycyrrhizæ Capillorum Veneris

Ceterach [id est, Asplenij.]

Polytrichi Adiantos ana ℥ vj.

Radicum Fœniculi Radicum Apij

Radicum Asparagi ana ℥ ij.

Coquatur in aqua sufficiente, & percoletur, *
deinde cū Sacchari albi ℥ iij. Fiat Syrupus.

Pro cuius vnaquaque libra inter coquen- A
dum adiiiciantur

Rhabarbari optimi ℥ iij.

Spicæ nardi ℥ ij.

Colligato in linteolo raro quod sæpe expri- B
matur, dū Syrupus consistentiā iustā nancisca-
tur.

P. C. SCHOL.

℥ iij.] Hanc Sacchari quantitatem huic Sy- A

rupō esse indendam, eamq; abundē satis esse dici-

mus & censemus: quamquam Commentatorum

nullus, quod sciam, huic multi vsus Syrupō pon-

dus vllum exprimat, Colonienſium Dispensato-

riolō excepto: quod cum ℥ v. & ℥ viij. ſumendas

putat, medicamentū nimis imbecille tanta copia

reddit, argente & malum, quod Manipulos vi-

L 5 ridium

*ridium herbarū (quales hic requirūtur) semun-
siales tantum, ut sunt puerorum, constituat.*

B *Caterum Spica ꝑ ij. hic quoq. sufficere debent.*

VALET contra omnem materiam veneno-
sam in alterando & mundificando eā, & pro-
priè in anthrace & similibus: valet & in febre
pestilentiali. Confortat cor & nutritiva, mun-
dificat materias per urinam & secessum, & fa-
cit appetere cibum, ac inducit somnum.

*Syrupi è Cichoreo Nicolai Florentini, emen-
data descriptio M. De Lobel.*

ET SI quorundam popularium medicantium, pharma-
cantium, ac medicastorum fatalis infestia fallere solita, nulla
monita in dignoscendis non contemnenda utilitatis, Seridis siue
Intubacei generis cunctis familiis, audierit, ut nō tantum Me-
dicos doctiss. & pharmacopæos probos eluserit, sed etiam mul-
tis ansam dederit in hunc usque diem magno agrotantium
dispendio, parandi Syrupum è Cichoreo D. N. Florentini cum
Rhabarbato è solo succo Cichorei sativi, vel aliquot hortorum
refrigerantibus temperatu herbis, quæ sanè instituto Nicolai
Florentini minimè respondebunt (præseribitur enim eius
Syrupus non modò ad refrigerandū hepar & visce-
ra; sed etiam tum ad hepatis, stomachi, splenis, alio-
rumque viscerum æstuationes ac inflammationes,
tum ad referandas obstructions in febribus biliosis
& ad somnum conciliandum) verumtamen amicis
quorundam petitionibus, (quia multi & quotidiani usus hic
utilissimus Syrupus) neglectis herbarum confusis, ambiguis, &
barbaris

herbarii nominibus, eius, secundum intentionem Nicolai, descriptionem sic castigamus, secuti ordinis seriem Rondelletij:

2. * Hordei integri ℥ iiij. A
 Radicum Asparagi
 Fœniculi
 Paludapij [.i. apij palustris.] ana ℥ ij. B
 Glycyrrhizæ ℥ j.
 Intybi domestici vel sativi [id est, Endivia C
 vulgarissima, latifolia, officinis vulgò Scar-
 riola vocata.]
 Intybi sylvestris [.i. Endivia sylvestris officina-
 rum, perperā recentioribus Lactuca sylvest.]
 Cichorei
 Taraxaci [.i. Dentis leonis.] ana M. ij.
 Cicerbitæ siue Sonchi lenis.
 Hepaticæ siue Lichenis. Lactucæ sativæ
 Lactucæ sylvestris soporiferæ Fumi terræ D
 Lupulorum ana m j.
 Adianthi [siue Capillorum Veneris.]
 Polytrichi
 Asplenis [siue Ceterach.]
 Cassithæ ana ℥ vi.
 Seminis Halicacabi [siue Alkekengi.] ℥ iiij.
 si recens fuerit; alioqui sufficiet media
 quantitas.
 Coquantur in aquæ & succi Cichorei æquis
 parti-

partibus in balneo aperto; deinde exprimantur, clarificentur, & syrupidantur in eodē balneo & vase lapideo aut vitreo, additis lib. iiij. paulo plus, minus, sacchari albi.

Sub finē ebullitionis adduntur Rhabarbari electi ℥ iiij. & Spicæ Nardi ℥ iiij. nodulo exceptorum & ligatorum.

* *Preponuntur quæ diutius coquenda.*

A ℥ iiij.] *ex veteri exemplari cū Rondel legimus.*

B Palud.] *magis aperit quàm Apium hortense.*

C Intubi dom.] *omnia exemplaria inserunt Scariolam; quæ tamen eadem est cum Endivia aut Intubo domestica.*

D Lactuc. sil.] *Lactucam agrestē officina Belgica Antuerpiæ facile sibi procurabunt; ubi semel sata maximo & importuno proventu luxuriat; potissimum in hortis nostris & optimorum pharmacopœorum Ioannis Coene, Oliuerij Driesch, & pia memoria P. Coudebergi.*

Oxysacchara simplex D. Nicolai.

℞. Sacchari albi P j.

Succi malorum Granatorū acerosorum ℥ viij.

Aceti ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate ad ignem in vase stanneo, dum Syrupi crassamentum adsciscat.

Digerit

Digerit materias cholericas phlegmati-
 mas, quæ grauant stomachum & præcordia, &
 ciunt tertianas duplas inordinatas, quas vo-
 cant erraticas, & similes quartanis duplis.

Oxysacchara composita D. Nicolai

Præpositi.

℞. Capillorum Veneris

linguæ ceruinæ [*id est, Phyllitidis.*]

colopendriæ [*id est, Asplenij.*]

Polytrichi Hepaticæ Violarum

Radicum Fœniculi Radicum Rusci

Radicum Asparagi

Radicum Graminis ana ℥ j.

Hoc modo confice: In succo malorum gra-
 matorum, herbas & radices triduum macerato,
 quarto die parū bullire finito, cū forti expres-
 sione percolato: postremo cum Sacchari P ij, *
 ex arte, ad iustam crassitiem concoquito.

Concalescēta corpora potum iuuat: longis
 febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & ca-
 lori iecinoris auxilio est, & lienis obstructio-
 nes tollit.

Syrupus de Iuinibis D. Mesua.

℞. Iuinbarum numero l x.

Violarum

Semi-

Seminis Maluæ ana ℥ v.
 Capilli Veneris Hordei mundati
 Glycyrrhizæ ana ℥ j.
 Seminis Cytoniorum
 Seminis Papaveris albi
 Seminis Melonum
 Seminis Lactucæ
 Tragacanthæ ana ℥ iiij.
 Aquæ fontis r iiij. aut q. s.
 Sacchari r ij.

Coquantur secundum artem.

S Y R V P V S iste confert raucitati, tussi & pleuritidi.

Syrupus Violarum D. Mesua.

Rx. Violarum ℥ ij.
 Seminis Cytoniorum
 * Seminis Maluæ ana ℥ vij.
 Iniubarum
 Sebesten ana numero xx.
 Aquæ Cucurbitæ quantum sufficit.
 Sacchari r j. β.

Coquantur secundum artem.

CUCURBITA debet destillari cum adhuc est tenera, antequam indurescere incipiat.

Prodest pleuritidi & tussi à causa calida.

Syrupus

Syrupus de Succo Violarum.

℞. Violarum recentium iamiam lectarum
quantitatem satis magnam, & decerpe ab iis
purpurea foliola, & abice virides eorum cau-
zoliculos, quoniam herbaceam habent acrimo-
niam, & floridum colorem hebetant. Contun-
de deinde decerpta violarum folia in morta-
rio marmoreo & exprime. mox

℞. Expressi succi ℥ ij.

Sacchari ℥ iiij.

SACCHARVM prius clarificetur, & ad
iustam consistentiam coquatur: amoto deinde
ab igne Saccharo, tepesieri finito, & succum
infundito, & rursus lento igne ad spissitudi-
nem coquito, & emicantem in coquendo spu-
mam continuo auferto.

Quidam spumam non auferunt, ne color pereat.
Sed citò corrumpitur cum spuma repositus.

Hic Violarum Syrupus in Misnia fit, praesertim
Lipsia, ubi eum vocant Succum Violarum.

BILIS acrimoniam obtundit, ac ob len-
torem thoracis vitiiis est aptum.

Syrupus de Prassio D. Mesua.

℞. Prassij ℥ ij.

Capilli Veneris

Hyssoi

- Hyssopi ℥ j.
 * Calaminthæ Anisi Radicum Apij
 Radicum Fœniculi ana ℥ v.
 Seminis Maluæ
 Seminis Fœnogræci
 Radicis Ireos ana ℥ iij.
 Seminis Lini
 Seminis Cytoniorum ana ℥ ij.
 Passularum enucleatarum ℥ ij.
 * Ficuum siccarum pinguium, numero xvj.
 * Penidiarum ℞ j.
 Mellis ℞ ij.

Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

M E L oportet esse aromaticum & optimum:
 potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis, & à
 frigido renaci que humore excitatis, atque era-
 dicatu difficilibus succurrit: hinc est quod seni-
 bus & asthmaticis plurimum conducatur.

Syrupus de Glycyrrhiza D. Mesuæ.

- ℞. Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.
 Capilli Veneris ℥ j.
 Hyssopi ℥ β.
 Aquæ ℞ iij.

Mace.

Macerentur horis xxiiij. Deinde coquantur
ad dimidias: colaturæ adde

Mellis optimi Penidiarum

Sacchari ana ℥ viij.

Aquæ rosarum ℥ vj.

Fiat Syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat, ideo-
que diurnæ tussi & pleuritidi auxiliatur.

Syrupus de Hyssopo D. Mesuæ.

℞. Hyssopi aridi Radicum Apij

Radicum Fœniculi Radicum Petroselinij

Glycyrrhizæ ana ℥ x.

Hordei mundati ℥ iiij.

Seminis Maluæ Seminis Cytroniorum

Tragacanthæ ana ℥ iiij.

Capilli Veneris ℥ vj.

Iuiubarum

Sebesten ana num. xxx.

Passularū magnarū enucleatarum ℥ j. ℥ iiij.

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium ana num. x.

Penidiarum albarum ℞ ij.

Confice secundum artem.

Ad vitia thoracis & pulmonis efficax est, hu-
moresq. exscreata difficiles extenuat & edu-
cit.

M

Syrupus

Syrupus de Eupatorio D. Mesue.

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apij
 Radicum Endiuix ana ℥ ij.
 Glycyrrhizæ Schœnanthi
 Cuscutæ Absinthij
 Rosarum ana ℥ vj.
 Capilli Veneris Bedeguaris Suchahæ
 Florum aut radicum Buglossæ
 Anisi Fœniculi
 Eupatorii ana ℥ v.
 Raues Seni [*id est, Rhabarbari Orientalis.*]
 Mastiches ana ℥ iiij.
 Spicæ nardi Indicæ Asari
 Folij [*pro Folio pone Spicā Romanā.*] ana ℥ ij.
 Aquæ quantum sufficit, aut ℥ viij.
 Succi Apij
 Succi Endiuix ana ℥ ij.
 Sacchari ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

Pro Bedeguare & Suchaha, quæ hodie nō cognoscuntur, licet accipere Carduū Benedictum, & Carolinam, id est, Cardopacia radicem.

Eupatorium, quod Mesue semper intelligit, est Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.

Frigidis iecinoris vitiis, ac eiusdem obstructioni.

Etionibus, aquæ intercutem maloque corporis
habitu succurrit: humores enim crassos exte-
nuat, roburque iecinori addicit. Vrinam mouet,
& hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus de Stœchade simplex.

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.

Thymi Calaminthæ

Origani ana ℥ x.

Anisi ℥ vi.

Passularum enucleatarum ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit: coquantur secundum
artem. Colaturæ adde

Mellis optimi ℥ iij. β.

Condiatur cum

Cinnamomi Calami aromatici

Zingiberis ana ℥ i. β.

Ligetur in sindone, & in Syrupo suspendatur.

Syrupus de Stœchade compositus D. Mesua.

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.

Thymi Calaminthæ

Origani ana ℥ x.

Anisi Pyrethri ana ℥ viij.

Piperis longi ℥ iij.

Zingiberis ℥ ij.

Passularum enucleatarum ℥ iiij.

M 2

Aquæ

Aquæ quantum sufficit

Mellis optimi ℞. v.

Coquantur secundum artem lento igne, co-
laturæ adde mellis prædictas ℞. v. & cum re-
ponis, tunc condies sequentibus speciebus in
sindone rara & munda suspensis.

℞. Cinnamomi Calami aromatici

Spicæ nardi Indicæ

Croci Zingiberis Piperis nigri

Piperis longi ana ℥. j. ℞.

Contundantur grosso modo.

*Ego in condiendo Syrupo de Stœchade utro-
que, pro Calamo aromatico mallem imponere
Schœnanthum aut Galangam, nam vero Ca-
lamo aromatico iam caremus.*

Intuat omnes affectus frigidos cerebri &
neruorū, ut paralyſim, epilepsiā, spasmū, spasmum
cynicū, tremorem, ac ventriculū firmat.

Syrupus de Epithymo D. Mesuæ.

℞. Epithymi ℥. xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalan. Indorum ana ℥. xv.

Cuscutæ

Fumiterræ ana ℥. i.

Thymi

Buglossæ

Calaminthæ

Embli-

Emblicorum Bellericorum Glycyrrhizæ
 Polypodij Agarici
 Stœchados ana ℥ vj.
 Rosarum Fœniculi
 Anisi ana ℥ ij. β.
 Prunorum num. xx.
 Passularum enucleatarum. ℥ iiij.
 Tamarindorum ℥ ij. β.
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari P. iiij.
 Sapæ P. ij.

Coquantur secundum artem.

SAPA est mustū optimū ad tertias decoctum.

ATRAM bilem, & alios humores vstos va-
 cuat, ob id morbos ex his nascentes, elephan-
 tiam, cancrum, vlcera maligna, fistulosa, pfo-
 ram, lepram præcanet, curatque.

Syrupus de Nymphaea D. Francisci

Pedemontani.

R. Florum Nymphaeæ ℥ ij.
 Florum vngulæ Caballinae aquaticæ
 Psyllij integri
 Acetosæ ana ℥ j.
 Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
 Seminis Cucumeris

M 3

Seminis

Seminis Melonis ana ℥ iiij.

Seminis Lactucæ Seminis Endiuia

Seminis Scariolæ

Seminis Portulacæ ana ℥ ij.

Radicum Foeniculi ℥ ij.

Aquæ Hordei quantum sufficit.

Sacchari ℥ j.

Aceti albi

Succi Granatorum acetosorum ana ℥ ij.

Coquantur secundum artem: deinde aro-

matizentur cum

Santali Citrini

* Spicæ nardi Indicæ ana ℥ j.

A. *Dua sunt Nymphaeæ species, altera cæcidum, altera luteum florem habet, & utriusque flores hunc Syrupum ingrediuntur. Nam Auctor huius Syrupi eam speciem qua albos habet flores, vocat Nenuphar, alteram verò qua luteos fert flores, appellat ungulam Caballinam aquaticam, à foliorum figura, & florum colore.*

SCARIOLA est species Endiuia, quam nos in Germania vocamus Endiuia, valgò Gensdistel, & habet spinulas in dorso foliorum.

P. C. SCHOL.

Ungula Caballina aquatica.] De Tussilagine hanc in propria sua significatione intelligi posse

posse Fuchsius dextrè monet: apud aquas enim
aut humectia loca plerumque nascitur.

Bilis flauæ feruorem extinguit, ideoque
mirificè in ardentibus aliisque acutis febribus
auxiliatur: somnum quoque conciliat.

Syrupus de Papauere simplex D. Mesua. *

℞. Capita Papaueris albi recentia
Capita Papaueris nigri recentia ana ℥ lx.
Aquæ pluuiialis ℞ iiij.

Coquantur vsquequò remaneat tantum
aquæ ℞ j. β. Colaturæ adde
Sacchari

Penidiarum ana ℥ vj.

Fiat Syrupus secundum artem. (niæ.

Valet ad catarrhū & tussim, causam inlom-

Syrupus de Papauere compositus D. Mesua.

℞. Papaueris albi
Papaueris nigri ana ℥ l.
Capillorum Veneris ℥ xv.
Glycyrrhizæ ℥ v.

Iuiubæ numero xxx.
Seminis Lactuæ ℥ xl.

Seminis Maluæ
Seminis Cytoniorum ana ℥ vj.

Coquatur in ℞ iiij. aquæ vsq. ad duas & cum

M 4

Sacchari

Sacchari & Penidiarum ana ℥ viij.

Fiat Syrupus secundum artem.

VALET ad tussim siccam, phthisin, catarrhum, insomnij causam.

Syrupus de succo Myrtillorum.

A ℞. Succi Myrtillorum depurati ℞ viij.

Sacchari clarificati ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

Curandum est ut adferatur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis volet hunc Syrupum conficere.

P. C. SCHOL.

A ℞ viij.] *Cum hic Syrupus à Mesues, cui erroneè à Cordo adscribebatur, diuersus sit: atque à Cordo ipso forsitan concinnatus; malè legi hic ℞ viij. Fuchsius temerè scribit.*

SYRUPVS Myrtillorum ventriculum & viscera roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit & tussim mitigat.

Syrupus Myrtinus compositus.

℞. Myrtillorum ℥ xx.

* Rosarum Santali albi

A Sumach Balaustiorum

* Berberis ana ℥ xv.

Mespy-

Mespylorum 3 L. *

Succi Granatorum acidorum vel muzorum *

Succi Pomorum agrestium ana p ij.

Omnia in dictis succis & aqua q. s. coquantur, & fiat Syrupus cum

Sacchari p iij. secundum artem. *

P. C. SCHOL. *

Rosarum.] Rosas Fuchsius rectè addit à

Cordo neglectas, simulq; ana 3 xv. legendum

3 L. atque Sacchari p iij. dextrè ait, ubi Cor-

dus 3 xxx. 3 c. ac Sach. p v. nimie scri-

berat. Interim in aqua p viij. coquit Fuch-

sius, & succi Granatorum ac Cytoniorum ana

p 3. tantum addit.

Hic Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & creatum sanguinis.

Syrupus de succo Acetosæ D. Mesuæ.

℞. Succi Acetosæ depurati p iij.

Sacchari clarificati p ij.

Coquantur secundum artem.

FEBRIBVS biliosis & pestilentialibus saluberrimus est, cordis & ventriculi flammæ colorē extinguit, ipsaque roborat.

Syrupus de Succo Boraginis.

℞. Succi Boraginis depurati p viij.

M s Florum

Metal.

Florum Boraginis recentium ℞ j.

Quàmmodicè efferueant, aut potius horis aliquot in succo clarificato ac calido macerentur: dein colentur, cumque Sacchari ℞ iiij. fiat Syrupus.

succus Boraginis prius est clarificandus cum albuminibus ouorum, alioquin plus satis mucilaginosus fieret Syrupus.

P. C. SCHOL.

Stolidos cum hic descripsisset Cordus huius & sequentis Syrupi conficiendi modos, ego eisdem suo nitori ex arte reddidi. Fecissem id quidem & aliis locis quamplurimis, nisi saltem in alterius messem indere penitus, minimè consultum visum fuisset.

COR ipsum roborat, eiusque tremorem & syncopen sanat, maniacos & melancholicos iuuat.

Syrupus de Succo Buglossæ.

℞. Succu Buglossæ depurati ℞ viij.

Florum Buglossæ recentium ℞ j.

Sacchari ℞ iiij.

Fiat eodem modo quo præcedens.

Intelligo hic eam Buglossam quæ vulgò in usu est, non illam Italicam maiorem.

Succus

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit mucilago, dum tunditur Buglossa, ideò tusa dimittenda est per noctem in frigido loco, & post die exprimens succus, atque cum albuminibus ovorum clarificandus.

C O R confortat, lætitiāque generat.

Syrupus de Lupulo.

Rx. Succī Lupuli depurati P ij. *

Succi fumi terræ depurati P j. *

Sacchari P ij. *

Coquantur secundum artem.

Potest etiā hic Syrupus fieri è solo Lupuli succo, ut Mesua placet in capite De speciebus Volubilis. Exprimens autē est Succus Lupuli cum adhuc tenera sunt eius viticula & asparagi.

Refrigerat, & collectionem impetus lenit. Bilem regio morbo laborantibus detrahit, pituitam in aqua inter cutem exigit per aluum.

Iuleb Rosatum.

Rx. Aquæ rosarum P iij. *

Sacchari clarificati P ij. *

Fiat cum diligentia secundum artem.

F E B R I V M, thoracis, & ventriculi incensium, caloremque flammeum extinguit, sitim nexpletam sedat.

Iuleb

Iuleb Violatum.

* R^x. Aquæ violarum ℞ iij.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Coque vt Iuleb Rosatum.

Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

Miua Cytoniorum simplex D. Mesue.

R^x. Succi Cytoniorum depurati ℞ xij.

Coquantur ad medietatem, & affunde

A Vini veteris optimi ℞ v.

* Sacchari ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

P. C. SCHOL.

A Vini ℞ v. Sacch. ℞ iij.] *Cordum hic Vini*
℞ viij. Sac. ℞ xij. perperam legentem, & Fuch-
sius quoque animaduertit. quare veram utro-
bique lectionem reposui.

VENTRICULUM roborat, & cibum in eo continet.

* *Miua Cytoniorum aromatica D. Mesue.*

R^x. Succi Cytoniorum acetosorum ℞ xx.

Vini veteris optimi ℞ x.

Mellis despumati optimi ℞ vj.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Coquantur ad perfectionem, & aromati-
 zentur

zetur in sindone ligatis, cum

Cinnamomi electi

Cardamomi minoris ana ʒ iij.

Garyophyllorum ʒ ij.

Zingiberis

Mastiches ana ʒ j. ʒ.

Croci ʒ ij.

Xyloaloës

Macis ana ʒ j. ʒ.

Moschi ʒ j.

Galliae moschatae verae ʒ ij.

Fiat secundum artem.

Mellis loco Saccharum sumi potest.

VENTRICULUM, hepar, & cetera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, vomitum & lyenteriam sedat.

Mel Rosarum D. Mesuae.

℞. Rosarum rubearum nondum penitus apertarum ʒ ij.

Mellis optimi ʒ vi.

Coquantur lento igne secundum artem.

STOMACHUM confortat & mundificat, & est digestivum materialium phlegmaticarum in stomacho & meseraicis contentarum.

Mel

Mel Rosatum aliud efficacius.

℞. Foliorum rosarum rubearum nondum ex-
plicitarum contusorum P ij.

Coquantur in aquæ cælestis P iij.

Colaturæ fortiter expressæ adde

Succi rosarum rubearum depurati

Mellis optimi despumati ana P iij.

Coquantur secundum artem.

Oxymel simplex D. Mesuæ.

℞. Mellis optimi despumati P iij.

Aceti vini acerrimi

Aquæ clarissimæ ana P ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligen-
ter, & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde
acerum, & coque secundum artem.

HUMORES crassos, lentos ac puitosos
incidit, extenuat, & abstergit, atque adeo ob-
structiones auferit, sputum educit, spiritumque
faciliorem reddit.

Oxymel compositum.

℞. Radicum Fœniculi

Radicum Apij ana ℥ iij.

Radicum Petroselini Radicum Ruscæ

Radicum Asparagi Seminis Apij

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquan-

Coquantur in aqua clara ꝑ vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti acerrimi ꝑ j.

Mellis optimi despumati ꝑ ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit: obstructions tollit iecurinis, lienis ac renum: urinam mouet, sudoremque euocat.

Oxymel Scylliticum simplex D. Mesua.

Mellis despumati ꝑ iij.

Aceti scyllitici ꝑ ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos, lentos, auulso contumaces separat: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: rictum acidum sanat, & vesicæ molliificationem, seu urinæ incontinentiam.

Oxymel Scylliticum compositum.

Rad. Apij

Rad. Fœniculi

Rad. Petroselini

Rad. Asparagi

Seminis Fœniculi

ana ꝑ iij.

Rad. Rusci

Seminis Apij

ana ꝑ j.

Coquantur in aqua ꝑ vj. aut quantum sufficit.

Cola-

Colaturæ adde
Aceti Scyllitici ℞ j.
Mellis optimi despumati ℞ ij.
Fiat secundum artem.

Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit in diuturnis quartanis & quotidianis, quàm Oxymel compositum de radicibus.

Mel Anacardinum Azarauj.

℞. Anacardos recentes, terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quādam in rubeo colore fuscā emittant, eam aquæ innatantem auferto, & reponito.

Mel Emblicorum.

Mel Emblicorum, est mel in quo Emblici Myrobalani sunt conditi.

Alij verò vocant Emblicorum decoctum ad mellis consistentiam inspissatum.

Mel Passularum.

℞. Vuarum passarum ℞ iiij. Infundantur eis aquæ ℞ xij. aut q. s. & macerentur horis xxiiij. deinde coquātur ad remauentiam tertiæ partis. Colentur, & colatura decoquatur ad crassitudinem mellis, & reponatur. hoc decoctum vocatur Mel passularum.

SYPVPI. 193
SYRVPORVM TRES SE-
QVENTES VALERII CORDI DE-
SCRIPT. HVIC EDITIONI NVNG
PRIMVM ACCESSERVNT.

Syrupus de Pyris Valerij Cordi.

Rx. Succi Pyrorum moschatellinorum
Succi Pyrorum Palatinorum
Sacchari clarificati ana p ij.
Coquantur secundum artem.

Et quoniam Pyra Moschatellina citius ma-
turefcunt, expressum eorum succum clarifica-
tum cum Saccharo decoctum repones, donec
etiam Palatina maturefcant. demum miscebis.

Syrupus de Cichorio Val. Cordi.

Rx. Rad. Fœniculi
Cichorij ana ℥ iiij.
Linguae cerninae Scolopendrij
Capillorum Veneris
Trichomanes ana m j.
Aquæ Cichorij
Succi eiusdem ana p iiij.

Coquantur omnia secundum artem.

Colaturæ adde Sacchari clarificati p iiij.

Et species sequentes petiæ illigatas suspen-
de in Syropo:

N

Rx. Rha-

R. Rhabarbari ℥ ij.
 Rad. Spicæ Romanæ ʒ j.
 Fiat Syrupus.

Syrupus Refectiuus Val. Cordi.

R. Dactylorum enucleatorum
 Ficum siccarum pinguium
 Xyloceratiorem enucleatorum
 Vuarum Cubebarum passarum
 Vuarum passarū vulgariū maiorū & minorum
 Tamarindorum enucleatorum ana ℥ iiij.
 Musti generosi recentis
 Succu Cydoniorum ana ℥ vj.

Incidentur fructus in partes, Passulæ minores & Xyloceratia modicè contendantur, vnumquodque per se. Deinde misceantur omnia, & in fictili denso affundatur eis succus & mustum, macerenturque horis xxiiij. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiæ partis aut amplius.

Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosea ℥ ij. ex vna libra Amygdalarum dulcium tritarum expressi.

Clarificetur deinde cum albuminibus ouorum xij.

Huic decocto clarificato adde Sacchari clarificati ℥ ij. Coquan-

Coquantur ad perfectionem: & cum re-
 positis, tum suspende in Syrupo sequentes species
 crassiusculè tritas, & in sindone ligatas.

℞. Cinnamomi interioris optimi

Macis Nucis moschatæ Cardamomi

Zingiberis Galangæ Zedoariæ

Garyophyllorum ana ʒ ij.

Ligni aloës ʒ iiij.

*Huiusmodi dilutū vel decoctū fructuū horum,
 vel alicuius eorū vocant Arabes Nabuch, quo
 utuntur pro vino & melle in calidis regionibus.*

H v n e Syrupum composui diuitibus qui-
 busdam in chronicis morbis, omnem cibum
 & potum auersantibus, & comperi mirum in
 modum vires reficere, alere, & iam desperatos,
 & focillatis viribus sanitati restituere.

R O B.

Rob de Ribes simplex.

℞. Succū ribes P viij.

Coquatur per se ad spissitudinem mellis, &
 reponatur.

Rob de Ribes compositum.

℞. Succū Ribes r iiij.

Sacchari optimi P ij.

N 2

Coquan-

Coquantur secundum artem.

VENTRICVLVM firmat, vomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliasque excretiones biliosas sistit.

Rob de Berberis simplex.

Rx. Succī Berberis P viij.

Coquatur per se vsq. ad mellis spissitudinē.

Rob de Berberis compositum.

Rx. Succī Berberis P iiij.

Sacchari optimi P ij.

Coquantur secundum artem.

R O B ex Oxyacantha seu de Berberis, easdem quas præcedens facultates obtinet.

Rob Nucum D. Mesue.

Rx. Succī Corticum viridiū iuglandium P iiij.

Mellis optimi P ij.

Coquantur secundum artem.

Destillationi rennium humorum à capite, & inflammationem excitantium confert.

Diamorum, descriptione Nicolai.

Rx. Succī Mororum Celsi P ℥.

Succī Mororum rubri P j.

Mellis optimi despumati P j.

Sapæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

Contra

Contra depascētia oris vlcera, ad dentium affectus & gingiuarum noxas, atq. ad omnia oris vitia gargarizatus proficit.

Diamoron aliud D. Val. Cordi.

℞. Succi Mororum rubi

Succi Mororum rubi Idæi

Succi Mororum Celsi siue de arbore

Succi Fragorum ana ℞ ij.

Mellis despumati optimi ℞ iiij.

Coquantur lento igne secundum artem.

MORORVM omnium succus exprimendus est antequam perueniant ad maturitatem Porro Mora rubi Idæi & Fraga citius maturescūt, quàm alia: ideò oportet ut horum Succus colligatur, & cum Saccharo decoctus reponatur, donec alij maturescant. Sint autem succi vniuscuiusque ℞ ij. Sacchari ℞ j. ad quamuis eorum, id est, Sacchari ℞ ij.

RVBVS Idæus est ille rubus, quem nos vocamus Himpen: eius mora siue fructus vocantur Himpeer.

Medulla siue pulpa seu Rob Cerasorum.

℞. Cerasorum acetosorum quantum volueris, coque per se, sine humore aliquo, & per cribrum setaceum manibus exprime, & ad spissitudi-

N 3

rudi-

tudinem iustam coque, ac sine Saccharo repone, vt medullam Prunorum. Poterit qui volet etiam cum Saccharo conficere.

Diamarenatum simplex.

℞. Amarena Cerasa quantum libuerit, & cum medico vino coque, coctas per cribrum manibus exprime, expressam deinde pulpā ad spissitudinem coque, & deinde

℞. Inspissatae pulpae ℥ xij.

Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.

Confice secundum artem.

AMARENAE sunt magna Cerasa gustu vinosa, quae Germanicè vocantur Amarellen, Ammerlinghe, & Amelber.

Diamarenatum compositum.

℞. Diamarenati simplicis iam confecti, & adhuc calidi ℥ iiij.

Cui insperge sequentes species in minutissimum pulverem tritas:

℞. Cinnamomi

Nucis moschatae ana ℥ i.

Zingiberis

Galangae ana ℥ iiij.

Cardamomi Caryophyllorum Macis

Ligni aloës ana ℥ ij.

Confice

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere confectio-
nes ex Cynosbatis & Cornis, hoc est,
Corni fructibus.

L O H O C H.

Lohoch sanum & expertum D. Mesua.

℞. Cinnamomi Hyssopi
Glycyrrhizæ ana ʒ iiij.
Iuiubarum
Sebesten ana numero xxx.
Passularum enucleatarum
Ficuum siccarum
Dactylorum pinguium ana ʒ ij.
Fœnogræci ʒ v.
Capilli Veneris m j.
Anisi Fœniculi Ireos Seminis Lini
Calaminthæ ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem in aquæ cla-
rissimæ ℞ iiij. ad consumptionem ℞ ij.

Colaturæ expressæ adde
Penidiarum ℞ ij.

Coquantur ad perfectionem, postea insper-
ge subsequentiâ minutissimè incisa & rufa.

℞. Picearum mundatarum ʒ v.
N 4 Amygda-

Amygdalorum dulcium mundatorum

- * Glycyrrhizæ Tragacanthæ Gūmi Arabici
- * Amyli ana ʒ iiij.
- Ireos ʒ ij.

Agitentur omnia simul celerrimè, donec albescat.

T v s s r vocisq̃ue asperitati à frigiditate natæ auxilio est, crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

Lohoch de Pino D. Mesua.

- * R. Pinearum ʒ xx.
- Amygdalorū dulcium Auellanaŕū assatarum
- Tragacāthæ Gummi Arabici Glycyrrhizæ
- * Succi Glycyrrhizæ
- Amyli Capilli Veneris
- * Ireos ana ʒ iiij.
- Carnium dactylorum ʒ xxxv.
- A Amygdalorum amarorum ʒ iiij.
- Mellis passularum Butyri recentis
- Sacchari Tabarzeth ana ʒ iiij.
- Mellis Tabarzeth p. iiij. ʒ i. ʒ iiij.

Conterenda cōrundantur, & incidenda inciduntur minutissimè, & cum melle excipiātur.

MEL Tabarzeth est optimū, sincerissimū atq̃ odoratissimum mel, quale ex Dantisco affertur.

P. C.

Amygd.am. ʒ iiij.] *Cum Cordus hic peruer-* A
sè ʒ iiij. posuisset, ʒ iiij. tantum legendas esse,
Fuchſio quoque aſtipulante, dico.

T v s s i diuturnæ, difficultati ſpiritus, &
 aſthmati ſuccurrit: humores in thorace craſſos
 incidit, & extenuat.

Loboch de Papauere D. Meſue.

℞. Papaueris albi ʒ xxv.

Amygdalorum dulcium Pinearum

Gummi Arabici Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.

Amyli ʒ iiij.

Seminis Portulacæ Seminis Lactuæ

Seminis Cytoniorum ana ʒ iiij.

Croci ʒ j.

Penidiarum albarum ʒ iiij.

Syrupi de Papauere ꝑ iiij.

Omnia contundantur & incidantur atque
 cum Syrupo excipiantur, ſecundū artem. Por-
 rō iſte Syrupus de Papauere ſic fieri debet.

℞. Capitum Papaueris albi recentium

Capitū Papaueris nigri recentium ana ʒ vj.

Seminis Lactuæ

Florum Violarum ana ʒ j.

N s

Aquæ

Aquæ quantum sufficit, aut ꝑ viij.

Coquantur, & colaturæ adde
Sacchari ꝑ iiij.

Coquantur ad spissitudinem.

*Hoc Lohoch de Papanere appellatur etiam
alio nomine Diapapauer.*

Iuuat tussim, & gutturis asperitatē à catar-
rho calido, tenui (quem sputū liquidum indi-
cat) cum enim coquit, & crassat. Cōfert etiam
febris ardentibus, dolēti thoraci, pleuritidi.

Lohoch de Scylla D. Mesue.

Rx. Succī Scyllæ

Mellis despumati ana ꝑ j.

Coquantur secundum artem.

SCYLLA propriè succum non habet, sed mu-
cilaginē, quæ sic est colligenda:

Rx. Scyllas crudas tres aut quatuor, eius lami-
nas puriores, plenas & nitidas, in partes incidi-
to cultello eburneo: deinde in pila siue mortario
fictili aut lapideo siue marmoreo atterito cum
agitaculo ex ligno Guaiaco siue sancto facto, &
deinde exprime & utere.

E C L E G M A de Scylla, materiam cras-
sam, lentam, coctū difficile in partibus re-
spiratoriis, expelli facilem strenuè reddit, &
natam

natam inde spirandi difficultatem, & thora-
cis dolorem leuat.

Lohoch de Pulmone vulpis D. Mesua.

℞. Pulmonis vulpini ficcati

Succi Glycyrrhizæ

Seminis Anisi

Seminis Fœniculi

Capilli Veneris ana ℥ j.

Sacchari clarificati ℥ xv.

Conterantur omnia tenuissimè, & cum Sac-
charo excipiantur.

ABSTERGIT & consolidat vlcera pecto-
ris & pulmonis, & præferendum est aliis re-
mediis in phthisi.

Lohoch ad Asthma D. Mesua.

℞. Scyllæ asiatæ ℥ iij.

Radicum Ireos ℥ ij.

Hyslopi

Prassij ana ℥ j.

Myrrhæ rubæ

Croci ana ℥ β.

Cū mellis quantitate sufficiēti fiat Lohoch.

Ad asthma & tussim antiquam valet: hu-
morem enim crassum tenuat.

LENI-

L E N I T I V A.

ET SOLVTIVA.

FLORES CASIAE FISTV-
LAE SOLVTIVAE.

℞. Cannas seu siliquas Casiaë ponderosas, & quæ non resonant cõcussæ, aperi eas & contentam in eis pulpam seu medullam cum laminis & seminibus suis diligēter euacua, exempta proiice super inuersum & angustum cribrum seris equinis contextum. Cribrum deinde pone supra bullientis aquæ vaporem, & auerso cochlearis conuexo Medullam Casiaë hinc & inde ducito, vt per cribrum paulatim excernatur, & si quid excretum est, aut penetrauerit, confestim subinde auferto, ne plus quàm necesse est de vapore imbibat: idque tamdiu facito, donec quantum voles, collegeris. Porro cùm necessitas requirit, semper recentes exprime Casiaë flores: repositæ enim acescunt.

Si quis Casiaë flores siue pulpam magis solutiuam reddere voler, in bullientem aquam proiciat folia Perfici, aut flores Perfici, & Prunellorum siluestriū, aut omnia hæc simul: horum

ū enim vapor & destillata aqua soluit aluum.
 Mundificat sanguinē, & compescit omnem
 vitiositatem, & sedat sitim, & propriè cum succo
 Endiuia aut Taraxici, depurato secundum ar-
 tem. Mundificat stomachum, & educit cho-
 leram & phlegma, sine nocumento & excessu;
 pararet enim mordicatione. Et lenit pectus &
 guttur, ac resoluit apostemata acuta in eis. Et
 confert calefactioni renum sumpta cum diu-
 reticis & infusione Glycyrrhizæ, & prohibet
 generationem lapidis in eis, & confert febri-
 bus calidis.

Diacasia cum Manna.

℞. Prunorum Damascenorum ℥ ij.

Florum Violarum m. j. β.

Aquæ fontanæ ℥ xvij.

Bulliant secundū artem vsq. ad medietatis
 consumptionem: Cola, & in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ vj.

Pulpæ Tamarindorum ℥ j.

Mannæ optimæ Calabrinæ ℥ ij.

Syrupi Violarum ℥ iiij.

Sacchari Candi

Sacchari Penidij ana ℥ j.

Sacchari Violati ℥ iiij.

Confice

Confice secundum artem.

*Pulpa Tamarindorum fit ut Pulpa Casia, si-
ne flores Casia.*

Est pro delicatis qui habent stipticū ven-
trem: non enim est ingrati saporis, nec mole-
sta, sed salubris: lenit viscera, subducit aluum,
purgat choleram, & mitigat febres.

Casia extracta sine foliis Sena.

℞. Prunorum numero xij.
Violarum m j.
Hordei mundi Anisi Polypodij
Seminis Cartami ana ℥ v.
Capillorum Veneris Thymi
Epithymi ana m ℥.
* Passularum exacinatarum ℥ ℥.
Fœniculi seminis ℥ ij.
Seminis Portulacæ
Seminis Maluæ ana ℥ iiij.
Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Fiat horum decoctio in sufficienti quanti-
te aquæ: colentur, in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ ij.
* Pulpæ Tamarindorum ℥ j.
* Cinnamomi ℥ iiij.
Sacchari optimi ℥ j.

Coquan.

Coquantur ad perfectionē secundū artem.

Casia extracta cum foliis Senæ.

℞. Confectionis Casiæ extractæ sine foliis
Senæ ℞ ij.

Pulueris foliorum Senæ ℥ ij.

Misce secundum artem.

FACILE soluit, lenit asperitatem intesti-
norum, remouet stipticitatem, & ventris
tumor subducit, & morbis choleris & melan-
cholicis auxilia præbet.

Casia extracta pro clysteribus.

℞. Violarum [id est, florum Violarum.]

Violariæ [id est, foliorum violarum.]

Maluæ Mercurialis Betæ

Parietaræ ana m j.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, cu-
jus beneficio Casia extrahatur, & cannæ eius
interius lauentur. Deinde

℞. Pulpæ Casiæ cum hac decoctione extractæ
& ad spissitudinem coctæ ℞ j.

Sacchari ℞ j. β.

Coque ad perfectionem secundum artem.

Quidam addūt Diacridiū siue Scammoneam.

Sed hoc nemo faciat insciis Doctoribus Me-
dicis.

P A R I E-

PARIETARIAE, videlicet vera, quæ circa macerias & muros nascitur. sub stillicidiis tectorum, & non silvestris istius herba luteis floribus, quæ dicitur Germanicè Tag und nacht.

Est lenitiua ventris & lenis, & est medicina pro delicatis, carens acuitate & mordicatione, & omni excessu lædente.

Electuarium Lenitiuum.

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| ℞. Passularum enucleatarum | ℥ ij. |
| Adianti nigri | Violarum |
| Hordei mundi | ana m. j. |
| Iuiubarum | Sebesten ana num. xx. |
| Glycyrrhizæ | ℥ β |
| Prunorum enucleatorum | |
| Tamarindorum | ana ℥ vj. |
| Senæ | Polypodij ana ℥ ij. |
| Mercurialis | m. j. β. |

Decoquantur secundum artem in sufficienti aqua: cola, & in colatura dissolue

| | |
|------------------|--------------------|
| Pulpæ Casiæ | Pulpæ Tamarindorum |
| Pulpæ Prunorum | Sacchari optimi |
| Sacchari violati | ana ℥ vj. |
| Pulueris Senæ | ℥ iij. ℥ iij. β. |

Confice secundum artem.

AD IANTVM nigrum, est Capillus Venenis verus qui à Lugduno affertur.

V s y s

Vsvs eius est in febribus humoralibus & pleuresi; lenit enim & mollit intestina, & detrahunt eorum stipticitatem: facile soluit sine molestia & læsione choleram phlegmaticam & melancholicam.

Electuarium Lenitium de Manna
Nicolai Alexandrini.

℞. Capillorum Veneris
 Scolopendriæ [*hoc est, Ceterach vocata.*]
 Hepaticæ [*hoc est, Lichenis.*] ana ℥ iij. *
 Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
 Seminis Melonis Seminis Cucumeris
 Violarum ana ℥ j.
 Prunorum Damascenorum num. xx.

Coquatur in aqua ad dimidias, deinde percolentur cū expressione, in colato dissoluantur
 Mannæ optimæ puræ
 Sacchari violacei
 Pulpæ Casiæ recens extractæ ana ℥ iij. *
 Tamarindorum
 Sacchari rosæci ana ℥ j.
 Sacchari albissimi ℥ iij.

Concoquantur ad mellis consistentiam: postremo species sequentes iniiciantur,
 Nucleorum seminis Melonis

O

Seminis

| | |
|---------------------|-------------------|
| Seminis Cucumeris | Seminis Cucurbitæ |
| Seminis Citrulli | Florum Violarum |
| Florum Nymphæ | Seminis Lactucæ |
| Seminis Scariolæ | |
| * Seminis Portulacæ | ana ℥ j. |
| Rhabarbari electi | |

| | | |
|-----------------|----------|------|
| * Foliorum Senæ | ana ℥ j. | ℥ j. |
|-----------------|----------|------|

His accuratè commistis & subactis, conficiatur electuarium.

Utile est ad purgandum sanguinem, ad choleram reprimendam & melancholiam: valet etiam ad hepar calefactum, & corpus vniuersum perpurgat.

Electuarium de Sebeste D. Bartholomæi Montagnana.

| | |
|--------------------------------|------------|
| ℞. Sebesten sine nucleis | |
| Prunorum siccorum enucleatorum | |
| Tamarindorum | ana ℥ v. |
| * Aquæ Violarum | ℥ j. |
| * Aquæ Ireos | |
| A Aquæ Anguriæ | ana ℥ iij. |
| Succi Mercurialis depurati | ℥ iij. |
| * Penidiarum | ℥ iij. |
| Diapruni simplicis | ℥ j. β. |
| Nucleorum seminis Cucurbitæ | |

Cucu-

Cucumeris Melonis

Citrulli ana ℥ j.

Diagridi ℥ iij. ℞.

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum & Tamarindorum minutissimè teratur, & cū aquis extrahatur. Semina verò minutissimè inciduntur, & reliquis misceantur, & fiat secundum artem Electuarium.

ANGURIA est Melon magnus, viridis, alio nomine vocatur Albatecca, siue Batega, & Melon Indus. Quidam per aquam Anguria intelligunt succum eius, & non male: nam hic magis aluum lenit.

P. C. SCHOL.

Aquæ Anguriæ.] Anguriam esse Melonem A seu fructum magnum, ex viridi & subpallido foris interstinctum, siue variegatum anguis modo, unde illi nomen; oblongum, insipidum cum laure, semine maiusculo, rubro, vnde cum Francisc. Alexandrini Apolline existimo, & falli Fuchsum dico.

CONFERT febribus cholericis interpositis, & continuis puris, & sedat acuitatem febrilem, sitim & vigilias, & etiam amaritudinem remouendo, & educit materias acutas à viis vrinalibus & vesica.

O 2

Medulla

Medulla siue Pulpa Prunorum.

℞. Prunorum magnorū acetosorum, & vinosorum quantitatem, quam volueris, & exemplis nucleis in fictili vitreato magno coquito, deinde per cribrum setaceum exprimito, expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, & sine Saccharo reponito.

Porro si medullam Prunorum laxatiuam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Hungaricis magnis exiccatis conficito.

Medulla Prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat, & melius est vt conseruetur sine Saccharo, Cerasorum modo inspissata.

Diaprunum compositum non laxatiuum

D. Nicolai.

℞. Prunorum Damascenorum electorū num. centum.

Coquantur in modica aqua, donec emolliantur: excola, deinde decoctum eorum priuatim reponens, ipsa verò pruna super inuersum & vasi impositum cribrum ponantur, & manibus hinc & inde ducantur, & premanantur, donec omnis eorum pulpa penetrauerit, &

& cutis cum nucleis tantum remaneat. Colle-
ctam deinde pulpam, & excolatum eorum de-
coctum in quo bullierint, violarum ℥ ℞. lento
igne ad spissitudinem coquito. Melius esset, si
Prunorum pulpa per se inspissaretur, & si eum
decocto prunorum & violarum pulpa Tama-
rindorum extraheretur.

Deinde cum inspissaueris,

℞. Pulpæ inspissatæ ℞ j.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Pulpæ Tamarindorum

Pulpæ Casiæ ana ℥ j.

Agita omnia simul supra ignem: deinde in-
sperge sub sequentium specierum puluerem.

℞. Santali albi Santali rubri

Spodij Rhabarbari

Cinnamomi ana ℥ iij.

Rosarum Violarum

Seminis Portulacæ Seminis Scariole

Seminis Berberis Succij Glycyrrhiæ

Tragacanthæ ana ℥ ij.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana ℥ j.

Confice secundum artem.

O 3

Dicitur

Dicitur etiam hæc confectio Diadamasce-
num, à prunis Damascenis, quæ capit.

Quidam ponunt prunorum non numero
centum, sed ꝑ. j. verum malè: nam ex Nicolao
Alexandrino omnes alij hanc compositionem
desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cinna-
momum: sed Nicolaus Alexandrinus id ipsum
ponit: & nisi ingrederetur Cinnamomi pon-
dus, confectio hæc esset manca: nam Nico-
laus Alexandrinus scribit totam confectio-
nem habere ꝑ. iiij. & β. & sic est. Impressi ta-
men codices mendosi sunt, habent enim ꝑ. ij.
& β. Ita pro ciphra 3. posuerunt 2. facili
errore, non tamen condonando.

*Nicolaus Alexandrinus nō ponit semen Cu-
cumeris: nam si posuisset, dixisset confectio-
nem habere ꝑ. iiij. & β. & ꝑ. j. Itaque ꝑ. j. seminis
Cucumeris, adiecta est à posterioribus, nihil
tamen refert, cum potius conducatur.*

*Per semina Cucurbitæ, Cucumeris, &c. debet
intelligi exempta eorum medulla. id quod semper in-
telligendum est, cum pulueres horum seminum
ingrediuntur in confectioes quasunque.*

P. C. SCHOL.

Cinnamomi.] Cinnamomum ex hoc medi-
camento

camento erroneè reiicit Fuchsius, cum vetera plurima exemplaria id contineant: quod rationibus etiam constare demonstrari posset.

DATVR acutas & peracutas patientibus, & maximè Caufoni & Synocho in principio, in augmento & statu ægritudinis. Et sine Diacridio potest exhiberi in omni hora diei. Cum Diacridio verò, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutivum forte.

Diaprunum compositum laxativum

D. Nicolai.

℞. Diapruni non laxativi adhuc recentis & calidi ℥ iiij.

Scammonæ præparatæ ℥ ij.

Misce & reponc.

Diacatholicon Nicolai.

℞. Pulpæ Casiæ fistulæ

Pulpæ Tamarindorum

Sesæ mundatæ ana ℥ ij.

Rhabarbari Violarum Polypodij

Anisi ana ℥ j.

Penidiarum

Sacchari Candi ana ℥ j.

Glycyrrhizæ Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli Seminis Cucumeris

℥ 4 Seminis

Seminis Melonis ana ʒ ij.

Conterenda cōterantur, & seminū quatuor
maiorum nuclei incidantur: postea omnia si-
mul conficiantur, cum subsequenti syrupo:

* R. Polypodij ʒ iiij.

Coquatur in aqua cælesti q. s. addendo
Sacchari optimi p ij.

*Nicolaus Alexandrinus hanc confectiōē vo-
cat Catholicū, è quo desumpta est: is paulo aliter
eā describit. sed quia impressum Nicolai exem-
plar in hac cōfectiōe valde mendosum est, ma-
lui ex concordia aliorū traditione hanc adscribere.*

CONFERT acutis & peracutis morbis:
emollit enim, alterat, roburq. addit iecinoro-
sis & lienosis.

Electuarium Indum maius D. Mesue.

R. Cinnamomi Garyophyllorum

Spicæ Indicæ Rosarum

Cassiae lignæ veræ [aut succedanei eius.]

Macis

Cyperij [videlicet rotundi.] ana ʒ iiij.

Santali Citrini ʒ ij. s.

Ligni aloës

Nucis moschatae ana ʒ ij.

* Turbith optimi ʒ l. [.i. quinquaginta.]

Sacchari

Sacchari

Penidiarum ana ℥ xx.

Galangæ

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Asari

Mastiches ana ℥ j. β.

Diagridij ℥ j. ℥ iiij.

Omnia terantur, & cum oleo Amygdalino
dulci fricentur, & cum subsequenti syrupo con-
ficiantur.

℞. Succi Cytroniorum

Succi Granatorum Succi Apij

Succi Fœniculi omniū depuratorum ana ℞ β.

Mellis despumati optimi ℞ iiij. ℥ iiij. A

Decoquantur succi cum melle ad spissitu-
dinem iustam secundum artem.

P. E. SCHOL.

℞ iiij. ℥ iiij.] Cum Mellis triplum ad reli- A
quorum pondera Cordus plerumque requirat,
hic Mellis ℞ iiij. β. posuerat, ingredientia Sac-
chara pulueribus ceteris cōnumerans, quod ali-
cubi tamen non effecit. Itaque num Sacchara
pulueribus sint annumerāda, ut ea ratione Mel
quoque triplicandum sit, nihil hic Euchsus, ni-
hil Dessenius, nihil Apollo fatu dignum; ut
nec in Amygdala, Pineas. Dactylos recipien-
tibus medicamentis; cū alioquin futilibus in-
cerdum

O s

terdum paginas repleant. Ceterum (*ut hic id obiter dicam*) huius iam narrati dubij, Diaphanicon admodum est controuersum.

EXCREMENTA humorū, maximè pituitosorum ac putridorum, ventriculo & aliis nutritoriis instrumentis educit, crassos in iis etiam flatus dissoluit, malaque hinc nata sanant: verbi gratia, inflationem ventriculi, colicos & renum dolores.

Electuarium Indum minus D. Mesue.

A R. Turbith optimi ʒ vj.
 Sacchari tantundem Macis
 Garyophyllorum Piperis Zingiberis
 Cinnamomi electi Cardamomi maioris
 Nucis moschatae ana ʒ vij.
 Scammoneae correctae ʒ xij.
 Mellis optimi despumati triplum, hoc est R ij.
 * ʒ j. ʒ j.

P. C. SCHOL.

A Turbith ʒ vj.] Mihi, Dessennio, aliisq; videtur Cordus hic mutilus, Turbith tantum sex drachmas huic medicamento indens, centum drachmas in Mesue scriptum fuisse dicentibus multis. Ego verò cū nulla ratione centū drachmas admittere queam, medicamento in scriptio-
 nis

is ratione habita, qua Indum minus appella-
ur, vix quinquaginta drachmas admittendas
esse cōcedere possum, ut in Indo maiori: ni in am-
abus idem Scammonij pondus citra controuer-
sam cerneretur. De decem tantum drachmis
aut duodecim, deq; viginti quinque drachmis le-
gentibus quibusdam exemplaribus nunc nihil
alio. Tanta est hoc in pondere hic varietas.

Interim si Turbith pondus prater Cordi men-
tem augetur, augenda quoque erit pro triplici-
tatis ratione mellis quantitas.

H A B E T intentionem maioris.

Confectio Hamech maior D. Mesua.

| | | |
|---------------------|---------------|---------|
| Myrobal. Citrinorum | ℥ | iiij. |
| Chebulorum | Indorum | |
| Rhabarbari | ana | ℥ ij. |
| Agarici | Colocynthidis | |
| Polypodij quercini | ana | ℥ xvij. |
| Ablinthij | Thymi | |
| Senæ | ana | ℥ vj. |
| Violarum | ℥ | xij. |
| Epithymi | ℥ | ij. |
| Anisi | Fœniculi | |
| Rosarum | ana | ℥ vj. |
| Succi fumi terræ | ℥ | j. |

Pruno.

Prunorum numero LX.

Passularum maiorum enucleatarum ℥ vi.

Infundantur omnia in feri quantitate sufficienti, & ponantur in vitreato vase angustiorificij bene obturato, & dimittantur per dies quinque. Postea ad ignem ferueant vna atque altera ebullitione: deinde colentur: in parte colaturæ dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ iiij.

* Pulpæ Tamarindorum ℥ v.

Mannæ ℥ ij.

Agitentur simul, & adiciatur

* Sacchari in altera colaturæ parte clarificati

℥ j. β.

Coquantur simul ad mellis spissitudinē: deinde aspergatur subscriptarū specierū puluis:

* Scammoneæ bonæ ℥ j. β.

Myrobal. Citrinorum

Chebulatorum

Indorum ana ℥ β.

Bellericorum

Emblicorum

Rhabarbari

Seminis fumi terræ ana ℥ iiij.

Spicæ nardi Indicæ

Anisi ana ℥ ij.

Confice

Confice secundum artem.

MORBIS omnibus ex flaua bile & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia & cancro succurrit. In summa, omni fœditati cutis à biliosis, & adustis humoribus procreata conuenit.

Confectio Hamech minor D. Mesue.

℞. Myrob. nigrorum [*id est, Indorum.*]
Chebulorum

Epithymi ana ℥ l.

Fumi terræ

Abſinthij ana ℥ xx.

Thymi Calaminthæ Polypodij quercini

Agarici Glycyrrhizæ

Buglossæ ana ℥ x.

Stœchados Arabicæ

Chamædryos [*videlicet vera.*]

Chamæpityos [*id est, Ina moschata.*]

Bedeguaris [*eius loco sume Carduū benedictū.*]

Anisi ana ℥ v.

Prunorum Iuinbarum

Sebesten ana num. lxx.

Passularum enucleatarum ℞ j.

Decoquātur in aqua sufficienti vsq. ad tertias: Colētur, & colaturæ addantur Sapæ ℞ ij.

Mellis

Mellis despumati ℞ j.

* Scammoneæ correctæ ℥ ij.

Coquantur lento igne vsque ad mellis spissitudinem.

PURGAT Melancholiam, & vltos humores alios: ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni, & vitiis cutis, qualia sunt pfora, id est, scabies, morphæa, cancer, elephantia, imperigo.

Diaphœnicon D. Mesuæ.

℞. Dactylorum Hieron enucleatorū, ac tribus diebus in aceto maceratorum ℥ ij. ℥ ij.

Penidiarum ℥ j. ℥ j.

Amygdalorum ℥ v.

* Turbith ℥ v. ℥ ij. β.

* Scāmoneæ [.i. Diagridij.] ℥ ij. aliis ℥ iij. ℥ ij.

Zingiberis Piperis longi Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Ligni aloës.

Anisi Fœniculi Dauci

Galangæ ana ℥ j. ḡ v.

Mellis despumati triplum, hoc est, ℞ j.

℥ iij. ℥ vj.

Fiat secundum artem electuarium.

P. C. SCHOL.

A Mirum est in hoc tam frequentis vsus, tamq̃ dubiosa

subiosa atq. difficilis compositionis medicamen-
to, adeo ut etiā à duobus Pharmacopœis vix eo-
lem concinnetur modo; mirum inquā hic silere,
nihilq. serij dicere (vt Eucksiū fileam) Francisc.
Apollinem, eundemq. tam insipidū esse, vt quid
per Amygdala absolutē hic posita, intelligen-
tum quantum Scammonij (nam admodum di-
versa est lectio) quantum Mellis, in quo hoc loca
grandior, quā in quouis alio medicamēto, car-
lo versari deberet. sumendum sit, nihil Apolline
lignum proferat, aut ridicula indicet atq. scri-
bat: cum tamen plurimis locis, verborum ac vo-
caminum multas myriades temerē ac futili-
ter effundat Quoniam verò (quantum ad Mel-
lis quantitatem attinet) se neque hic uniuersali
regula abuti velle dicat Franciscus (per quam s.
Mellis triplum intelligat) nōne libræ nouem
Mellis hic sumendæ erunt admodū à tribus pro-
cul? Num igitur ad auctoris mentē compositio-
nem hanc se restituisse, vt inquit, gloriari debet?
Hunc itaque, hunc Apollinem consulat Phar-
macopœus oportet, vt radius eiusdem illumina-
tus (nam undique ferē est sibi similis) unde qua-
que etiam cecutiat atque exorbitet.

Febribuscōpositis & diuturnis auxiliatur,
Bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis
cruc-

cruciatibus mirificè cōfert: itē doloribus ven-
tricoli, & aliis malis ex crudo humore ortis.

Diaphœnicon in forma solida.

℞. Dactylorum infusorum in aceto tribus die-
bus ac noctibus numero vj.

Seminis Ligustici ℥ ij.

Pineorum nucleorum

Amygdalorum dulcium ana ℥ xv.

Turbith ℥ xij.

Diagridij ℥ xj.

Sacchari Candi ℥ ij.

Piperis longi Zingiberis Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Fœniculi

Anisi Dauci Galangæ

Ligni aloës ana ℥ j.

A Sacchari ℥ j.

℞. Fiat confectio in rotulis, secundum artem.

*Ista confectio solida Diaphœnicum plerisque
medicis est vsui.*

P. C. SCHOL.

A ℥ j.] *Mutilus in hac Sacchari quantitate
esse Cordū, si ad precedentis Diaphœnici, aliás-
ne cum Saccharo paratorum medicamentorum
rationes contuleris, necesse est; Typographi for-
san vitio. In eandem nihilominus nassam satis
impru-*

imprudenter, immò pueriliter cecidere Fuchs.
 & nonnulli alij: ita cæcus cæco duce labitur.

Diasena D. Nicolai.

| | | |
|-------------------------|------|-------|
| ℞. Senæ | ℥ | iiij. |
| Auellanarum tostatum | num. | x. |
| etici tosti | ℥ | ij. |
| Lapidis Armeni loti | ℥ | j. |
| Lapidis Lazuli loti | ℥ | iiij. |
| Sacchari | ℥ | vj. |
| Cinnamomi | ℥ | j. |
| Garyophyllorum | ℥ | j. |
| Galangæ | ℥ | j. |
| Piperis | ℥ | j. |
| Spicæ nardi Indicæ | ℥ | j. |
| Ocymij | ℥ | j. |
| Foliorum Garyophyllorum | ℥ | j. |
| Cardamomi | ℥ | j. |
| Crocij | ℥ | j. |
| Zingiberis | ℥ | j. |
| Zedoariæ | ℥ | j. |
| Florum Rosæmarini | ℥ | j. |
| Macropiperis | ana | ℥ |
| Mellis despumati | ℥ | iiij. |

LAPIS Armenus est similis lapidi Lazuli,
 sed nō est tantopere caruleus, sed magis viridis.

FOLIA Garyophyllorum sunt similia foliis
 Lauri, & odorem atq. saporem habent Garyo-
 phyllorum: eorum loco sume Garyophyllos ipsos.

Succurrit melancholicis, mania vexatis, &
 quartana tristitiaq. affectis, lienosis, & omni-
 bus malis ex atra bile procreatis.

P.

Bene.

*Benedicta laxativa D. Nicolai.*R². Turbitha electi

Sacchari ana ʒ x

A Diagridij Esulæ Hermodactylorum

Rosarum ana ʒ v

Garyophyllorum Spicæ nardi Indicæ

Zingiberis Croci Saxifragiæ Macropiperis

Amomi [sumatur Acorus verus eius loco, vel

Calamus aromaticus,]

Cardamomi minoris Seminis Apij

Salis Gemmei Galangæ Macis

Carui Fœniculi Seminis Asparagi

Seminis Rusci [id est, Brusci.]

Granorum folis [id est, Mili folis.] ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum, hoc est ʒ j.

* ʒ v. ʒ v.

Confice secundum artem.

Per semina Asparagi & Rusci intellige carnem & pulpam eius: reiectis nucleis ossibus.

P. C. SCHOL.

A Esulæ.] Nullo pacto placent Fuchsi aliorumq; sententia, hic Esula ʒ x. esse sumendas arbitrantes: etenim cum Cordo ʒ v. sufficere bona ratione dico Brevis undique esse cogor.

H Y M O R E S pituitosos, potissimum ad

articu-

articulos decumbentes, elicit. A renibus quoque & vesica purgat.

Electuarium Eleschhof siue Episcopi

D. Mesue.

2. Scammoneæ Antiochenæ
 Turbith optimi ana ʒ vj.
 Caryophyllorum Cinnamomi Zingiberis
 Myrobal. Emblicorum Nucis moschatae
 Polypodij ana ʒ ij. ʒ.
 Sacchari ʒ vj.
 Mellis despumati triplum, id est ʒ x. ʒ j.
 P. C. SCHOL.

Sacchari ʒ vj.] Prater exempla ex Mesue,
 praterq; rationes, Fuchsius & Fraciscus Alex-
 and. hic ʒ vj. legunt.

BILEM flauam & pituitā elicit, flatus quoque
 expellit, doloribus articulorum, laterisque
 prodest, itemque colicis cruciatibus, ad renes
 & vesicā decumbētes humores expurgat.

Electuarium de Psyllio D. Mesue.

2. Succī Buglossæ domesticæ
 Succī Buglossæ agrestis Succī Endiuīæ
 Succī Apij, omnium coctorum & despumato-
 rum ana P. ij.
 Succī fumi terræ ʒ iij.
 P 2 In qui-

In quibus macerentur per xxiiij. horas sub
 frequentia:

R. Cuscute Anisi Senæ ana ℥ j.
 Capilli Veneris m. j.

A Afari ℥ iiij.

Spicæ nardi Indicæ ℥ ij.

Bulliant aliquantulum, adiiciendo

Violarum ℥ iiij.

Epithymi ℥ ij.

Hæc postquam modicè bullierint, colen-
 tur, & colaturæ iniiciantur

Psyllij seminis integri ℥ iiij.

Macerentur per xxiiij. horas, singulis horis
 agitando: deinde sume expressæ à Psyllio mu-
 cilaginis ℞ iiij.

Sacchari albissimi ℞ ij. β.

Coquantur lento igne ad perfectionem
 addendo pulueris

Trochiscorum Diarhodon

* de Spodio

de Rhabarbaro ana ℥ j.

de Berberis ℥ β.

* Scammonij in Cytonio malo cocti ℥ ii

Confice secundum artem.

Per Buglossam domesticā potes intelligere Bo-
 uaginem, vel magnā illam Italicam Buglossam

P. C

Asari ℥ iiij.] Sic legendum esse, ritè quoque
Fuchsius monet. Cordus enim Asari, Spica ana
℥ ij. perperam hic legebat.

FLAVAM bilem euocat, febribus ardenti-
bus & curatu difficilibus auxiliatur, dolori ca-
pitis & vertigini à biliosorum humorum eua-
porationibus procreatis, morbo regio, & ieco-
ri supra modum calefacto.

Electuarium Rosarum D. Mesue.

Rz. Succi rosarum rubearū perfectarum ℞ iiij.
Sacchari Tabarzeth [*id est, albi.*] ℞ j. β.
Mannæ puræ & recentis ℥ vj.

Scammoneæ Antiochenæ ℥ j. β.

Coquatur sensim ad ignem molliusculum,
dum ad mellis consistentiam vsq. densescant:
deinde insperge

Trochiscorum de Spodio ℥ j.

Trochiscorum de Berberis ℥ iiij.

Galliæ moschatæ veræ

Croci ana ℥ ij.

Reponatur in vase vitreo.

Est cholagogum clemens, ob id salubre
biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalal-
giæ calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

P 3

Ele-

Electuarium de Succo Rosarum D. Nicolai

℞. Succu Rosarum rubrarum

Sacchari albissimi ana ℞ j. ℥ iiij.

Diagridij ℥ j. ℥ iiij.

Santali rubri Santali albi

Santali Citrini ana ℥ vj.

Spodij de Ebore ℥ iiij.

Caphuræ ℥ j.

Succus Rosarum cum Saccharo ad instam
consistentiam coquatur, deinde tritæ species
adiiciantur.

Hæc cõpositio potest fieri in forma solida.

Expellit flauam bilem citra molestiam: ad
morbos articularum ex biliosis & calidis hu-
moribus natos, ad febresque tertianas confert.

*Diaturbith cum Rharbarbaro**D. Montagnana.*

℞. Turbith optimi

Hermodactylorum ana ℥ j.

Rhabarbari ℥ x.

Diagridij ℥ iiij.

Santali albi Santali rubri Violarum

Zingiberis ana ℥ j. ℞.

Mastiches Anisi Cinnamomi

Croci ana ℥ ℞.

Sacchari

Sacchari albißimi triplum, hoc est ʒ i. ʒ ij. A

ʒ ij.

Potest fieri in liquida & solida substantia.

Est Cholagogum, Phlegmagogum, & Melanogogum.

Diaturbith manus D. Petri de

Tusignano.

℞. Turbith optimi ʒ i.

Diagridij

Zingiberis ana ʒ iiij.

Cinnamomi

Garyophyllorum ana ʒ ij.

Galangæ

Piperis longi

Macis ana ʒ i.

Sacchari albißimi ʒ viij. ʒ v.

Ducit phlegmaticos humores, & purgat, & calefacit.

Diaturbith minus Zexavis, ex Mesue

cap. de Turbith.

℞. Turbith albi & gummosi ʒ x.

Zingiberis ʒ v.

Maffiches ʒ iiij.

Sacchari albißimi ʒ vi. ʒ vj.

LEVITER purgat phlegma a stomacho.

A *Diacarthamum* D. Arnoldi de Villanova.

- ℞. Specierum Diatragacanthi frigidi ʒ β.
 Pulpæ Cytoniorum ʒ i.
 Medullæ seminis Carthami ʒ iiij.
 Zingiberis albi ʒ ij.
 * Diagridij ʒ iiij.
 Turbith ʒ vj.
 B Mannæ granatæ ʒ ij.
 * Mellis rosati colati ʒ i.
 * Hermodactylorum ʒ iiij.
 Sacchari albissimi ʒ x. ʒ iiij.

Fiat in liquida substantia.

Cum autem species reseruare volueris, mel rosatum non conuenit addere.

PULPA siue caro Cytoniorum hic requiritur exsiccata.

P. C. SCHOL.

A *Diacarthamum*.] Cum apud diuersos auctores diuersimodè legatur *Diacarthami* descriptio, atq. hanc quoq. ab Arnoldi variare dicat Franc. Alexander, Arnoldo tamē hāc acceptam feremus, tantisper dum eiusdē genuinam descriptionem Franc. Apollo in Arnoldi nobis libris cōmonstrauerit. Interea quoniā hanc utilem repererint multi, eam conficere Officina possunt.

Mannæ

Mannæ ʒ ii.] ʒ ij. hic legi debere. vel B
 pueri animaduertent. ita ut à tot tantisq; vi-
 ris (qui alioquin se satis emuncta naris esse pu-
 tant) id non esse olfactum, stupeſcam. Sed innu-
 mera huiusmodi hocce in libello reſtituta con-
 ſpicias, ab aliis ne cogitata quidem, quorum ra-
 tiones in aliud tempus ſeruamus.

P R O D E S T in euacuatione cholerae &
 phlegmatis.

Hiera Picra ſimplex D. Galeni.

R. Cinnamomi
 Xylobalsami [aut ſuccedanei eius.]
 Aſari Spicae nardi Indicae Croci
 Maſtiches Chia ana ʒ vi.
 Aloës non lota ʒ c.
 Mellis deſpumati ꝑ iiij. ʒ iiij.

Cum hæc confectio magis confortatiua
 quàm ſolutiua eſſe debeat, cum aloë lota con-
 ficienda eſt.

P. C. SCHOL.

Vt ex ipſiſſima Galeni mente cōfectio hæc pa- A
 retur, qualiq; modo à peritis medicis hodie confi-
 ci iubetur: Croci ʒ v. & Aloës ʒ xc. tantum
 imponenda ſunt.

C O N T R A ilioſos, putres, marcidosq; hu-
 mores,

mores, qui ori ventriculi insederunt, remedio est; item iis quorum faciem pallor decolorauit: iis quoque quorum oculis obiecta culicum aut pilorum imagines obuersantur, alui recrementa mediocriter mouet, ad iecur vsq. progrediens: lædit quibus iecur calidius exhibet negotium, & stomachum iuuat.

Hiera Picra cum Agarico.

℞. Specierum Hieræ simplicis sine aloë

Agarici Trochiscati ana ℥ iiij.

Aloës non lotæ ℥ j.

Mellis despumati ℥ vi.

Hiera Picra composita D. Nicolai.

℞. Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ

Croci Schoenanthi Asari

Xylocassia

Xylobalсами } quorum loco sumantur suc-

Carpobalsami } cedanea, vt supra.

Violarum Absinthij Epithymij Agarici

Rosarum Turbith Colocynthidis

℞ Mastiches ana ℥ ij.

Aloës non lotæ ℥ x. ℥ ij.

Mellis despumati ℥ viij.

P. C.

Ana 3 ij.] *Fuchsius ana 3 β. legi vult, Cordum reprehendens cum in idem recidat: concluduntur enim simplicia omnia unico ana: & Aloës ad pondus omnium legunt Nicolai exemplaria. Inanis itaque est Fuchsi reprehensio.*

FACIT ad diuersas capitis, & aurium, & oculorum distemperantias, stomachum quoque optimè purgat, affectiones hepatis emendat, splenis duritiem & densitatem emollit & extenuat. Renibus & vesicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat.

Hieralogodium, seu potius Hiera Logadij

D. Nicolai.

R. Pulpæ Colocyntidis

Polypodij ana 3 ij.

Euphorbij Polij montani minoris

Cocci Gnidij ana 3 j. β. 6 vj.

Abfinthij

Myrrhæ Troglodyticæ ana 3 j. 6 xij.

Centaureæ minoris Agarici Hammoniæ

Folij [aut succedanei eius.]

Spicæ nardi Indicæ Scyllæ assatæ

Diacridij ana 3 j.

Aloës

Comarum Thymi

Cassæ

Casia lignea Chamædryos Bdellij
 A Prassii ana \mathfrak{z} ij. \mathfrak{G} xiiij.
 Cinnamomi Opopanacis Castorei
 Aristolochia longæ Leucopiperis
 Macropiperis Melanopiperis Croci
 Petroselini Macedonici
 Sagapeni ana \mathfrak{z} β .
 Hellebori nigri
 Hellebori albi ana \mathfrak{G} vj.
 * Mellis despumati triplum, hoc est \mathfrak{z} x. \mathfrak{z} iij.
 \mathfrak{z} j. \mathfrak{G} iij.

*Quadam exemplaria habent Colocynthidis
 \mathfrak{z} ij. sed maximo errore: nos itaque veram com-
 positionem Nicolai Alexandrini sequimur, qui
 habet hanc proportionem.*

COCCI Gnidij debent esse \mathfrak{z} j. β . \mathfrak{G} xij. si
 Alexandrinum Nicolaum sequi volumus im-
 pressum, qui habet \mathfrak{z} xvij. & hac cõpositio habet
 decimam partem Nicolai: itaque si \mathfrak{z} j. β . &
 \mathfrak{G} xij. multiplicantur per decem, erunt \mathfrak{z} xvij.

Nota \mathfrak{z} ij. & \mathfrak{G} xiiij. sunt decima pars drach-
 marum nouem: in Nicolao autem Alexandrino
 impresso non nouem, sed undecim legitur: sed hoc
 factum est vitio librariorum, xj. pro ix. ponen-
 tium, quamuis impressus codex pro xj. habeat
 II. id est undecim per ciphras scriptum. Quod
 autem

dissoluendos hos liquores accipies, de supra-
scripta quantitate sumito, nihil addendo.

*MALVM terra, id est, radix Aristolochia
rotunda vera.*

*Scribonius Largus mirum in modum effert hu-
ius Hieræ virtutes, quemadmodum etiam Mar-
cellus. Itaque non ab re fuerit tunc ea uti, cum
& nos eius efficaciam aliquoties experti sumus.*

*✱ hac nota significat Romanis scriptoribus
denarium. Est autem denarius pondus Roma-
num drachma paulo grauius. Nam drachma
octo faciunt unciam, cum denarij septem consti-
tuant unciam: non rarè tamen indifferenter pro
drachma accipitur, sed malè.*

Compositio hæc sanat morbo comitiali
correptos, furiosos, scotomaticos, cephalalgic-
os, facit ad deprauatam in vtramlibet par-
tem. Ad Tetanum, & Cynicum spasmus, præ-
cipuè verò ad pectoris & lateris dolores pro-
dest, ex qualibet causa factos siue latente &
occulta, siue manifesta. Præterea neruorum
tensionibus mirificè conuenit: Prodest ad arti-
cularium morbum, ad spinæ totius & lumbo-
rum dolorem. Duritias in manibus mulie-
rum cum dolore cōsistentes, ex toto interdum
sanat. Ad stomachicos euidenter conuenit.

Reine-

Remediat enim eos quibus frequenter accesci-
cibus, aut assidue nauseant, aut saliva abundat
præcipue vero Melancholicis benefacit, &c.

Catharticum Imperiale D. Nicolai

Alexandrini.

Rx. Diagridij

Sacchari ana ℥ viij.

Cinnamomi Nardi Saxifraga

Polypodij ana ℥ iiij.

Garyophyllorum Zingiberis

Celticae [id est, Spica Celticae]

Macropiperis Melanopiperis Cardamomi

Amomi [eius vice sume nostrum Calamum
aromaticum.] ana ℥ iiij.

Mellis despumati ℞ j. ℥ iiij. ℥ vij.

*SAXIFRAGA, quam Græci describunt,
mediam habet figuram, & magnitudinem in-
ter Pulegium & Thymum. Germanicè vocatur
Stinplei.*

C A P I T optimè purgat, os bene olens red-
dit, ex stomacho & toto corpore utramque bi-
lem deducit.

Purificans medicaminis Turbith D. Anicenna.

Rx. Zingiberis albi

Mastiches ana ℥ x.

Turbith

Turbith subtiliff. pulverizati ʒ x.
 Sacchari Tabarzeth quantum eorum est.

Commisceantur.

PURGAT humores phlegmaticos, datur
 pueris, mulieribus, senibus, & humidis, deli-
 catis & otiosis.

Pulus Senæ preparata D. Montagnana.

℞. Senæ ʒ xij.

Zingiberis

Macis ana ʒ iij.

Cinnamomi

Tartari ana ʒ j. β.

Hæc in puluerem redacta commisceantur.

Dosis ʒ j. ante cœnam.

PURGAT caput mirabiliter.

Pulus aut Tragea laxatiua.

℞. Turbith ʒ j.

Zingiberis Cinnamomi

Mastiches Galangæ

Cardamomi minoris Garyophyllorum

Anisi Hermodactylorum

Diagridij ana ʒ β.

foliorum Senæ ʒ ij.

acchari ʒ iiij.

Misceantur in puluerem contrita.

Q

PUR-

Purgat cholera, phlegma & melancholiam.

Pulvis Sternutatorius.

℞. Radicum Pyrethri ʒ j.

Castorei ʒ β.

Hellebori albi

Hellebori nigri ana ʒ j.

Maioranæ m j.

Misceantur, fiat pulvis lege artis.

Nasalia.

℞. Calaminthæ

Maioranæ

Seminis Nigellæ

Seminis Staphysagriæ

Hellebori albi

Nucis moschatæ

Euphorbij

ana ʒ ij.

Radicis Ireos

Castorei

ana ʒ j.

Pyrethri

Myrrhæ rubeæ

In pulvères singula conterantur, deinde cum
Ladani ʒ vj. & melle modico formentur nasalia.

SUPPOSITORIA.

Suppositoria simplicia cōficiuntur ex melle
& sale simul coctis ad debitam crassitiem.

*Species ad Glandes, aut Suppositoria
acuta conficienda.*

℞. Hellebori albi

Granorum Colocynthis

ana ʒ j. β.

Esulæ

Esulæ præparatæ

Hermodytylorum ana ʒ j.

Specierum Hieræ picræ simplicis Galen. ʒ ii.

Misceantur puluerizata.

P I L V L A E.

Pilula Alephangina D. Mesua.

℞. Cinnamomi Cubebarum Ligni aloës

Calamiaromatici Macis Nucis moschatæ

Cardamomi Garyophyllorum Asari

Mastiches Schœnanthi Spicæ Indicæ

Carpobalsami [aut succedanei eius.] ana ʒ j.

Abinthij ficci

Rosarum ana ʒ v.

Conterantur grosso modo, & infundantur

in aquæ ꝑ duodecim, & coquantur lento igne

in duplici vase vsque ad consumptionem dua-

rum partium, id est, ad remanentiam tertiæ

partis: deinde exprimantur fortiter & co-

lentur. In colaturæ ꝑ duabus dissolue Aloës

Succotrinæ multoties in vitreo vase lotę, cum

aqua pluuiali, & iterum siccata ꝑ j. agrentur

simul continuè in Sole: deinde addantur pul-

ueres Myrrhæ, Mastiches ana ʒ v. Croci ʒ iij.

Deinde quod reliquum est colati decocti ex

Q 2

aroma-

aromatibus, etiam affundito, & exiccentur ad Solem vel in stufa, admiscendo subinde quod densatum est, liquido, & linteo puro vas obtegatur aduersus incidentium muscarum & sordium iniurias. Postremo reponatur massa, & fiant Pilulæ parvæ eam necessitas requirit.

P I L V L A E Alephangina composita sunt à Mesue, ut confortent potius stomachum & cerebrū, quam ut aluū ducant. Propterea Aloë toties lotam requirit, & nullum solutiū medicamentū eis admiscet, sed confortantia omnia, nisi quis solum Asarum excipiendum esse cōtendat.

Ista Pilula ubique sunt in frequenti usu, sed rarissimè, ut decebat, conficiuntur. nam detrahunt ponderi & numero aromatum, & augent pondus Aloës: quidā etiam impurissimam aloë admiscet, atque ipsius Aloës sordes. Porro miror cur Mesue iubeat ut decoquantur aromata, cum tamen omnia aromata tenuissimis constent virtutibus, quæ faciliè inter decoquendum resolvuntur. Adeo etiam, ut deinde ipsum decoctum aut colatura, prorsus non sapiat aromata quæ incocta fuerant. Sed quia ita preparari hanc massam voluit Mesue, in nulla re immutabimus eius placitum.

Quidam confectioni huius massæ Pilularum Alephan-

Alephanginarum consulescentes, dimidiam aromatatum partem cum aqua decoquunt, & Aloem in colatura dissoluunt; alteram autem partem aromatatum in minutissimum puluerem redactam, inter exiccandum massa admiscunt, non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

VENTRICULUM, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, pituitosis, purgât, & inde natum dolorem dissipant, ventriculorum roborant & concoctionem eius iuuant.

Pilule Assaieret D. Avicenna.

℞. Specierum Hieræ picræ, descriptione Galeni ℥ i.

Masticis

Myrobal. Citrinorum ana ℥ β.

Aloës optimæ ℥ iij.

Syrupi de Storchade q. s.

Fiat Massa.

BILEM flauam & pituitam sine molestia è ventriculo potissimum vacuant. Quapropter iis qui caput è ventriculo dolent, conueniunt.

Pilule Arabica D. Nicolai.

℞. Aloës optimæ ℥ iij.

Radici Bryonia

℥ 3

Myro-

Myrobalanorum Citrinorum
 Myrobal. Chebulorum Myrobal. Indorum
 Myrobal. Bellericorum Myrobal. Emblicorum
 Mastiches Diacridij Asari
 Rosarum ana ℥ j.
 Castorei ℥ iij.
 Croci ℥ j.
 Succī Fœniculi q. s.
 Fiat Massa.

VALENT ad capitis dolorem, vertiginem, hemicraniamque. Lætitiā generant, mentisque vigorem cōservant: Visum acuunt, auditumq. amissum reparant: Ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

Pilula Arthritica siue Arthetica

D. Nicolai.

℞. Hermodactylorum Turbith
 Agarici ana ℥ iij.
 * Colocynthidis Cassiæ lignæ veræ
 * Spicæ nardi Indicæ Garyophyllorum
 Xylobalsami [aut succedanei eius.]
 Carpobalsami [aut succedanei eius.]
 * Macis Galangæ
 * Zingiberis Mastiches
 * Assæ foetidas Fœniculi
 Anisi

Anisi Saxifragæ Seminis Asparagi
 Seminis Rusci [*id est, Brusci*]
 Rosarum
 Granorum solis [*id est, Milij solis.*]
 Salis gemmei ana ʒ ʒ.
 Scammonij ʒ ij.
 Aloës optimæ ad pondus omnium
 Succij Fœniculi q. l.
 Fiat Massa.

*Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum
 pulpa illa carnosæ accipi debet, abiectis corneis
 seminibus, idq; sæpè est observandum.*

VALENT ad podagram, aliosq; articu-
 lorum dolores.

Pilule de Agarico D. Mesuæ.

℞. Agarici ʒ iiij.
 Ireos
 Prassij ana ʒ i.
 Turbith ʒ v.
 Hieræ picræ ʒ iiij.
 Colocynthidis
 Sarcocollæ ana ʒ ij.
 Myrrhæ ʒ i.
 Sapæ quantum sufficit.
 Fiat Massa.

Q 4

Ego

Ego consulerem, ut Hierapicra nondū melle commista acciperetur, hoc est species eius aromatica cum Aloë tantū mista: intelligenda autem est Hierapicra simplex Galeni.

S A P A est mustū optimū ad tertias decoctum.

Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

Pilula Aurea D. Nicolai.

℞. Aloës

Diacridij ana 3 v.

Rosarum

Seminis Apij ana 3 ij. ℞.

Anisi Fœniculi

Mastiches ana 3 j. ℞.

Croci

Pulpæ Colocynthis ana 3 j.

Mucilaginis Tragacanthæ q. s.

Fiat Massa.

C A P V T expurgant, aciem oculorum exaccuant, flatus ventriculi & intestinorum dissolunt, ac citra molestiam aluum deliciunt.

Pilula Aggregativa D. Mesua.

℞. Myrobal. Citrinorum

Raved Seni ana 3 iiij.

Succi Eupatorii

Stucci

Succi Absinthij ana ʒ iij.

Diacridij ʒ vj.

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum Agarici

Colocynthidis

Polypodij ana ʒ ij.

Turbith optimi

Aloës ana ʒ vij.

Mastiches Rosarum

Salis gemmei Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ʒ j.

Electuarij de succo Rosarum Mesuæ q. s.

Fiat Massa.

R A V E D Seni, id est, Rhabarbarum Orientale optimum.

S V C C I Eupatorij & Absinthij debent esse inspissati, ut Aloë.

Per Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est cum Gratiola. Germanicè vocatur Vveysaurin: copiosè nascitur ad Albin. igitur hic erit faciendus eius succus.

V A L E N T ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

Q s

Pilula

Pilula Benedictæ D. Nicolai.

℞. Specierum Benedictæ laxatiuæ ʒ vj.
 Mellis Rosati quantum sufficit
 Fiat Massa.

HUMORES pituitosos, potissimum ad
 articulos decumbentes eliciunt, à renibus quo-
 que & vesica purgant.

Pilula Cochia D. Rhasis 9. ad Almanforem.

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis ʒ x.
 Colocynthidis ʒ iij. ʒ i.
 Scammonæ ʒ ij. ʒ.
 Turbith

Stœchadis ana ʒ v.

Syrupi de Stœchade quantum sufficit.

Fiat Massa.

STOECHAS cum simpliciter & indefinitè
 ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.

Cephalica rectius appellantur, quòd sci-
 licet caput magna efficacia expurgent, ex
 eoque ac nervis humores crassos euacuent.

*Hiera picra Rhasis 9. ad Almanf. ad fa-
 ciendum Pilulas Cochias.*

℞. Rosarum rubearum
 Spicæ nardi Indicæ Mastiches
 Xylobalsami [aut succedanei eius.]

Car

Carpobalsami [aut succedanei eius.]

Cinnamomi

Xylocasie veræ [id est, Casia lignea.]

Afari [videlicet radicis eius.] ana ʒ j. ʒvj.

Aloës ʒ vj. ʒ ij.

Fiat pulvis.

Pilula de Colocynthide D. Mesua.

℞. Pulpæ Colocynthidis ʒ vj.

Myrobal. nigrorum [id est, Indorum.]

Myrobal. Citrinorum

Sagapeni Bdellij mollis

Sarcocollæ ana ʒ v.

Aloës ʒ vij.

Nigellæ Cymini Carmeni Origanij Persici

Nassurtij albi Salis gemmei

Absinthij ana ʒ j.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

CYMINVM Carmenum, id est, Orientale,
ex Carmania regione.

ORIGANY Persicū, idem est quod Cre-
ticum Origanum, & est Maiorana simile.

NASTURTIVM albū. i. Thlaspi, Germa-
nicè Vvegekressen: significat etiam Merretich.

VALENT ad affectus pituitosos & melan-
cholicos,

cholicos, vt alphas curatu difficiles, & iunctur-
rarum dolores.

Pilula de Eupatorio maiores D. Mesue.

℞. Myrobalan. Citrinorum

Succi Eupatorii Mesuæ

Succi Absinthij ana ℥ iij.

Raued Seni [id est, Rhabarbari.] ℥ iij. ꝑ.

Mastiches, ℥ i.

Croci ℥ ꝑ.

Aloës bonæ ℥ v.

Succi Endiuizæ quantum sufficit.

Fiat Massa.

MIRIFICE profunt in febribus inter-
mittentibus biliosis, morbo regio, iecinorisque
obstructionibus.

Pilula de Euphorbio D. Mesue.

℞. Euphorbij

Colocynthidis Agarici Bdellij mollis

Sagapeni ana ℥ ij.

Aloës ℥ v.

Succi portii quantum sufficit.

Fiat Massa.

Ad emittendā hydropicorū flauam aquam,
& materiam tumoris discutiendam valent:
Opem quoque afferunt lumborum dolori-
bus,

bus, & podagræ humida causa concitatæ.

Pilula Fœtida maiores D. Mesua.

Rz. Sagapeni Hammoniæ Opopanacis
Bdellij mollis Colocynthidis Seminis Rutæ
Aloës Epithymi ana ʒ v.

Hermodaetylorum

Esulæ minoris ana ʒ ij.

Scammoneæ ʒ iiij.

Cinnamomi Spicæ nardi Indicæ Croci

Castorei ana ʒ j.

Turbith ʒ iiij.

Zingiberis ʒ j. β.

Euphorbij ʒ ij.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

VACVANT pituitam crassam, crudam: ob
id conferunt affectibus inde natis, arthritidi
podagræ, gonagræ, dolori spinæ & aliarum
iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, ele
phantia, & albaras.

Pilula Fœtida D. Rhasis.

Rz. Specierum Hieræ picæ Rhasis ʒ x.

Colocynthidis interioris ʒ v.

Euphorbij ʒ ij. β.

Castorei Piperis Assæ fœtidæ

Sagapeni

Sagapeni Opopanacis Seitaragi
Sinapi ana 3 j.

Centaureæ minoris Elaterij ana 3 v.

Gummi, siue lachrymæ & liquores omnes
densati, in succo Rutæ q. s. dissoluantur: de-
inde admistis reliquis fiat Massa.

SEITARAGI, siue Seytari Indi, est herba
similis Thlaspi maiori. i. Merretich: Latine vo-
catur Lepidium maius; Germanicè, Roskressen,
Pfefferwurtz, Romischkressen & Maurkressen:
accipienda autem sunt radices eius aut semina.

ELATERIVM, id est, succus fructuum Cu-
cumeris asinini exiccatus.

Pilula de Fumo terræ D. Auicennæ.

℞. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. nigrorū [id est, Indorum.] ana 3 v.

Aloës 3 vii.

Scammoneæ 3 v.

Succi fumi terræ clarificati quantū sufficit, ut
formetur ter hæc massa: nā cum primò fue-
rit siccata massa, plus succi est addendū, &
rursum exiccetur, idq. tertio est faciendū.

Educūt è corpore humores biliosos, acres &
sallos: ideoq. aduersus omnia cutis vitia valēt.

Pilula

Pilula de Hermodactylis maiores D. Mesua.

℞. Hermodactylorū Myrobal. Citrinorum

Aloës Turbith Colocynthidis

Bdellij mollis Sagapeni ana 3 vj.

Castorei Sarcocollæ Euphorbij

Opopanacis Seminis Rutæ

Seminis Apij ana 3 iij.

Croci 3 j. ℞.

Succi caulium quantum sufficit.

Fiat Massa.

Aduersus podagram & arthritin profunt.

Pilula Indæ Haly D. Mesua.

℞. Myrobal. nigrorum [id est, Indorum.]

Hellebori nigri

Polypodij ana 3 v.

Epithymi

Stœchados ana 3 vj.

Agarici Lapidis Lazuli loti

Colocynthidis

Salis Indi [aut Salis gemmei.] ana 3 iij.

Succi Eupatorii inspissati

Spicæ Indicæ ana 3 ij.

Garyophyllorum 3 j.

Hieræ picræ simplicis Galeni 3 xij.

Succi Apij quantum sufficit.

Fiat

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos, can-
crum, elephantiam, albos nigros curatu diffi-
ciles, melancholicum morbum, & inde ortum
tumorem. & mærorem, quartanam, icterum,
spleneticum & splenis dolorem.

Pilula Hiera simplicis Galeni.

lib. 6. tuenda val.

A. Aloës 3 L.

Cinnamomi

Xylobalsami [aut succedanei eius.]

Asari Spicæ nardi Indicæ Croci

Mastiches Chia ana 3 iij.

Mellis rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

P. C. SCHOL.

A. *Pilulis his, ut ex Galeni ipsissima sententia
conficiantur, & veluti apud peritiores hodie
usus obtinuit, Aloës 3 xlv. & Croci 3 ij. tan-
tum hic indenda sunt.*

ADVERSUS vitia ventriculi ex humori-
bus biliosis & pituitosis nata, profunt.

Pilula de Hiera composita D. Nicolai.

R. Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ Croci

Schœ-

Schoenanthi Afari Xylocasie
 Xylobalsami [aut succedanei eius.]
 Carpobalsami [aut succedanei eius.]
 Violarum Absinthij Epithymi Agarici
 Rosarum Turbith Colocynthis
 Mastiches ana ℥ j.
 Aloës ad pondus omnium, hoc est ℥ ij. *
 Fiat Massa cum aqua Endiuie.

O P E M ferunt vitiis capitis, neruorumque
 ab humoribus pituitosis procreatis.

Pilula Hieræ cum Agarico.

℞. Specierum Hieræ simplicis Galeni
 Agarici Trochiscati ana ℥ iiij.
 Aloës bonæ ℥ j.
 Mellis rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

A V X I L I A N T V R stomachicis, asthma-
 ticis, & aliis stomachi ac thoracis vitiis à cras-
 sis & pituitosis humoribus natis.

Pilula de lapide Lazuli, siue Cyaneo.

D. Mesua.

℞. Lapidis Lazuli abluti ℥ vj.
 Epithymi
 Polypodij ana ℥ viij.
 Scammonæ Hellebori nigri
 R Sapis

258

P I L U L A E.

Salis Indi, aut gemmei ana ʒ ij. β.

Agarici ʒ viij.

Garyophyllorum

* Anisi ana ʒ iiij.

Specierum Hieræ simplicis Galen. ʒ xv.

Succi Endiuæ quantum sufficit.

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos, &
bile vsta natos.*Pilula de lapide Armenio D. Mesua.*

℞. Lapidis Armenij loti & præparati

Hieræ picræ ana ʒ v.

* Epithymi Agarici

Polypodij ana ʒ viij.

Scammonæ costæ in Cytonio ʒ iiij.

Garyophyllorum ʒ i.

Salis Indi [aut gemmei.] ʒ i. β.

Cum succo Endiuæ conficiatur massa.

MELANCHOLIAM, & bilem vstam
multiplicem vtramque clementer vacuant, ob
id morbis inde natis conferunt.*Pilula de Mezereo D. Mesua.*

℞. Foliorum Mezerei præparatorum ʒ v.

Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.

Myrobal. Chebulatorum ʒ iiij.

Confice

Confice cum Thereniabin vel Tamarindis
in aqua Endiuia dissolutis q. s.

THERENIABIN siue Tereniabin, est
Manna Orientalis, qua Græcis vocatur Droso-
meli & Aeromeli.

SEROSVM excrementum valenter pur-
gant, seu aquas, ob id hydropem iuuant.

Pilula Lucis maiores D. Mesuæ.

℞. Rosarum Violarum Absinthij
Colocynthidis Turbith Cubebæ
Calami aromatici Nucis moschatæ
Spicæ nardi Indicæ Epithymi
Carpobalsami [aut succedanei eius.]
Xylobalsami [aut succedanei eius.]
Seselios Seminis Rutæ Schœnanthi Asari
Mastiches Garyophyllorum Cinnamomi
Anisi Fœniculi Apij
Casia lignæ [videlicet vera.]
Crocij Macis ana ʒ ij.
Myrobal. Citrinorum
Myrobal. Chebulorum Myrobal. Indorum
Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum
Raued Seni [hoc est, Rhabarbari.] ana ʒ iiij.
Agarici Senæ ana ʒ v.
Euphrasiæ ʒ vij.

R 2

Aloës

Aloës Succotrinæ ad pondus omnium, id est

* ℥ viij. & ℥ ij.

Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

EXCREMENTA capitis pituitosa educunt, visumque roborant.

Pilula Lucis minores D. Mesua.

℞. Xylobalsami [aut succedanei eius.]

Carpobalsami [aut succedanei eius.] ana ℥ j.

Chelidoniæ [videlicet maioris radicis.] ℥ v.

Rosarum Violarum Absinthij

Euphrasiæ ana ℥ iij.

Senæ Epithymi Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum Myrobal. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum

Agarici Colocynthis Scheenanthi Lyci

Lapis Lazuliloti ana ℥ ij. ℞.

Aloës optimæ ad pondus omnium

Succi Fœniculi aut Chelidoniæ quantum suffi-

Fiat Massa. (cit.)

Idem quod priora possunt, atram tamen bilem magis vacuant.

*Pilula Mastichina Petri de Ebano,
sive Consiliatoris.*

℞. Mastiches ℥ iij.

Agarici

Agarici optimi ℥ iij.

Aloës electæ ℥ x.

Infundatur Agaricus in Aceto & Oxymelle simplici liquidiusculo per diē & noctē, & rursum exiccetur: deinde formetur Massā cū succo Artemisiæ, aut cum Syrupo de Stœchade.

P. C. SCHOL.

Eo quòd Cordus bis eandem pilularū harum A descriptionem posuerat, ponderibus tantum in altera quadruplicatis, nos unam earum tamquam frustraneam expunximus.

Præservant stomachū ab omni ægritudine, leniter purgant, & maximè confortant, & non permittunt humores corrūpi, & qui eis vtuntur, præservantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis, & vitia matricis corrigunt.

Pilula de Aloë & Mastiche D. Nicolai.

℞. Aloës ℥ j. Mastiches ℥ β.

Garyophyllorum

Rosarum rubearum ana ℥ j.

Croci Diacridij ana ℥ ij.

Conformetur Massā cum succo Fœniculi aut Absinthij.

Respiciunt virtutē naturalē: purgant inco-

R ;

lumi-

lumiter stomachum à phlegmate & à cholera.

Pilula de Aloë lota.

℞. Aloës lotæ cum succo rosarum rubearum

℥ i.

Agarici Trochiscati ℥ iij.

Mastiches ℥ ij.

Specierum Diamoschi dulcis ℥ β.

Cum vino maluatico cogantur in massam.

VENTRICULUM, cerebrum, viscera reliqua, oculos, uterum putribus humoribus purgant, & roborant.

Pilula de Rhabarbaro D. Mesue.

℞. Raved Seni [*id est, Rhabarbari.*] ℥ iij

Succi Glycyrrhizæ

Succi Absinthij

Mastiches ana ℥ i.

• Myrobal. Citrinorum ℥ ij. β.

Seminis Apij

• Seminis Fœniculi ana ℥ β.

Trochiscorum diarhodon ℥ iij. β.

Hieræ picræ simplicis ℥ x.

Aquæ Fœniculi quantum sufficit.

• Fiat Massa.

IN febris diuturnis, iecinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt.

Pilula

*Pilula Pestilenciales Rufi, quæ aliter**De tribus vocantur.*

℞. Aloës electæ ʒ ij.

Myrrhæ optimæ ʒ j.

Croci sinceri ʒ β.

Confice cum vino aromatico.

MIRIFICE aduersus pestiferę Luis contagia populatim grassantia pollent. Humores etiam ventriculo immersos educunt.

Pilula de Sarcocolla Haly D. Mesue.

℞. Sarcocollæ ʒ iiij. Turbith ʒ iiij.

Colocynthidos Zingiberis ana ʒ j. β.

Salis gemmei ʒ j.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Fiat Massa.

PITUITAM vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant.

Pilula Sine quibus esse nolo, D. Nicolai.

℞. Aloës optimæ lotæ ʒ xiiij.

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum.*]

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum

Rhabarbari Mastiches Absinthij

R 4

Rosa-

Rosarum Violarum Senæ Agarici
Cuscutæ ana ℥ j.

Scammoneæ præparatæ ℥ vi. β.

Dissoluatur Scammonea in succo Fœniculi sufficienti, & cum hac dissoluta Scammonea formetur massa.

Mirabiliter purgant choleram, phlegma & melancholiam; valent propriè ad cataractas, & obscuritates oculorum, visum custodientes: & aurium dolorem sanant, & iliosis conferunt.

* *Pilula Stomachica Alkindi D. Mesua.*

R. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. nigrorum

Myrobal. Chebulorum ana ℥ iij.

Rosarum Mastiches ana ℥ ij.

Cardamomi Ligni aloës Santali Citrini

Cubebæ Garyophyllorum Schœnanthi

* Nucis moschatæ ana ℥ j.

Raued Seni [id est, Rhabarbari.] ℥ β.

Turbith ℥ vij.

Aloës ad pondus omnium.

Fiat Massa.

Cerebrum, & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, concoctionem iuvant, appetentiam excitant.

Pilula

Pilule Stomachicæ D. Mesuæ.

Rz. Myrobal. Citrinorum Aloës

Turbethi ana ʒ x.

Rosarum Spicæ Indicæ

Mastiches ana ʒ ij. ʒ.

Anisi ʒ j. ʒ.

Salis Indi [aut Salis gemmei.]

Croci ana ʒ j.

Formetur massa cum succo Absinthij.

Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos
potissimum qui caput & ventriculū obsident.*Pilule Imperiales Magistrales.*

Rz. Cinnamomi

Amomi [eius loco sumatur Acorus verus.]

Anisi Mastiches Cardamomi minoris

Zingiberis Zedoariæ Maceris

Nucis moschatæ Garyophyllorū Croci

Cubebæ Ligni Aloës Turbethi

Tereniabin [id est, Manna.]

Agarici Foliorum Senæ

Myrobal. Citrinorum Myrob. Chebulorum

Myrobal. Indorum Myrob. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j. *

Rhapontici veri [id est, Rhabarbari.] ad pon-
dus omnium

R ʒ

Aloës

Aloës quantum totum æquat.

Conficiantur cū Syrupo rosato aut violato.

M O D I C V M soluent, & plurimum cōfortant stomachum, & omnia intestina frigida: muniunt virtutes naturales, remouent frigiditatem, clarificant sanguinem & spiritum.

Pilula de Opopanace D. Mesuæ.

℞. Opopanacis Hermodactylorum
Sagapeni Bdellij mollis Ammoniaci
Colocynthidos ana ʒ v.
Crocī Castorei Myrrhæ rubræ Zingiberis
Piperis Macropiperis [id est, nigri.]
* Cassiæ lignæ Myrobal. Citrinorum
Myrobal. Bellericorum
Myrobal. Emblicorum ana ʒ i.
Scammoneæ ʒ ij.
Turbethi ʒ iiij. Aloës ʒ xij.

Cogantur in massam cum infusione gummi in aqua caulium.

VALENT ad paralyfim, spasmū cynicū, gonagram, podagram, & aliorum articulorū dolores, morbosq. partium neruosaꝝ frigidos.

Pilula de Quinque generibus Myrobal.

D. Nicolai.

℞. Quinque genera Myrobalanorum
Agarici

Agarici Diacridij Colocynthidos

Senæ ana ℥ β.

Epithymi Turbethi Amifi

Marathri Mastiches

Lapidis Lazuli præparati ana ℥ ij.

Aloës ℥ j.

Formetur massa cum succo Absinthij.

P. C. SCHOL.

Ana ℥ β.] *Cum Cordus hic ana ℥ β. depra- A
natè posuisset, Fuchsius aquè malè ℥ ij. β. legen-
dum putat.*

EDVCUNT humorē choleriçū, phlegma-
ticū & melancholicū, & clarificāt sanguinem.

Pilula de Octo rebus, siue Optomere,

D. Nicolai.

R. Aloës Diacridij ana ℥ ij.

Interioris Colocynthidos Epithymi

Agarici Mastiches Dauci Cretici

Myrob. Chebulorum Absinthij ana ℥ j.

Cum succo Solani conformetur massa.

Purgant humores crassos à capite, visum
clarificant, & cataractas oculorum prohibēt.

Pilula de Serapino D. Mesue.

R. Sagapeni Ammoniacci Opopanacis

Bdellij ana ℥ ij. Seminis Apij Ammios

Har.

Harmelæ [*id est, seminis Ruta siluestris.*]

Anisi ana ʒ j.

Acori [*id est, Calami aromatici.*]

A Casia lignæ veræ Calaminthæ

Centaurij [*minoris scilicet.*]

• Polij Costi Salis gemmei ana ʒ β.

Aloës ʒ vj. Colocynthidos ʒ v.

Cogantur in massam cum aqua aut succo
Matricariæ.

NOTATO: Ingreditur secundum Mesue
Seitaragum Indum. sed Clementius Clementi-
nus loco eius posuit Casiam ligneam.

P. C. SCHOL.

A Casia.] Seitaragi Indi (quod Lepidium hoc
loco interpretandum) apud Mesuem legi : rectè
olfecit Fuchsius, falliꝫ Cordum & Clementi-
num dextrè censet.

POLLENT ad Ischiadem, podagram, &
reliquarum iuncturarum dolorem, ac etiam
vteri, mensesque promouent.

Pilula de Bdellio maiores D. Mesue.

• Bdellij ʒ xij. Ammios ʒ iij.

Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum

• Conchularum venerearum adustarum

Succini

Succini aut Karabæ ana ℥ ij. β.

Maceretur Bdellium in succo foliorū Porri,
& conficiatur massa.

V A L E N T ad fluxum hæmorrhoidum &
ulcerum in eis, & ad menses immodicos.

Pilula de Cynoglossa D. Nicolai.

℞. Cynoglossæ rad. Opij

Seminis Hyoscyami ana ℥ iiij.

Myrrhæ Troglodyticæ ℥ vj.

Thuris masculi ℥ v.

Garyophyllorum ℥ ij.

Cinnamomi Styracis rubei ana ℥ ij.

Cum aqua rosarum conficiatur massa.

Magnam vim obtinet in tenuibus sisten-
dis destillationibus, ac doloribus mitigandis.

Pilula Bechica.

℞. Pincorum nucleorum

Amygdalarum ana ℥ j. β.

Glycyrrhizæ ℥ vj.

Succi glycyrrhizæ ℥ iiij.

Cum aqua rosarum conformetur massa.

A D V E R S V S tussim veterem pollent, &
gutturis ac faucium asperitatem.

Pilula Alephangina D. Valerij Cordi.

℞. Myrobalan. Chebulorum

Myrobal.

Myrob. Citrinorum Myrobal. Indorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.

Acori veri Galangæ Zedoariæ

Doronici Romani Radicularum Afari

Dictamni nostratis radicum Absinthij

Rosarum ana ʒ iiij.

Contundantur omnia crassiusculè, & Myrobalani per se macerentur prius in aquæ clarissimæ fontanæ ꝑ iiij. per horas xxiiij. deinde coquantur, donec ferè tertia pars aquæ sit in vaporem resoluta: postea coque etiam radices, & aromata lento igne in duplici vase, cum aquæ clarissimæ ꝑ vj. & affunde his antea coctas Myrobalanos cum suo iusculo: ultimo rosas adiiciendo, coquantur vsque ad tertias: coletur postea validè exprimendo: hinc in colatura dissolue,

Aloës optimæ & lotæ, ac rursus exiccatae ꝑ iiij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad solem aut in stufam, & agitentur sæpissimè, vt concrescens in margine Aloë liquidò commisceatur: cum verò mellis spissitudinem fuerint consecuta, tunc adde sequentium specierum puluerem minutissimè tritum.

℞. Galangæ Cyperi Zedoariæ Doronici
Ligni

Ligni aloës Cinnamomi Schœnanthi
 Nardi Celticæ radicaliū Nucis moschatæ
 Macis Cubebæ Cardamomi
 Garyophyllorum ana ʒ iiij.
 Mastiches
 Succini [*id est, Carabæ.*] ana ʒ vj.
 Myrrhæ
 Croci ana ʒ iiij.

Agitentur optimè cum aloë species, & fiat
 massa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus de-
 bent habere, exemptis nucleis siue lignis.

P I L V L A E ista Alephangina sunt efficaces,
 imò efficaciores prioribus: relinquimus tamen
 unicuique liberum arbitrium, alterutram vel
 utramque componendi.

Hoc loco non debet poni Dictamnus Creti-
 cus, sed radices Diptamni, quæ vulgò in usu
 sunt, & propriè cortex radicum eius. Germani-
 cè vocatur Aschvvurtz, propterea quòd folia
 eius sunt similia Fraxino arbori: & hæc est vera
 Fraxinella, vulgò ab Italis dicta.

Aloën lauandi modus in postrema huius li-
 bri parte, qua est De præparatione simplicium
 medic. docebitur.

T R O.

T R O C H I S C I.

Trochisci de Vipera D. Andromachi.

℞. Carnis viperinæ cum anetho, sale & aqua
coctæ ℥ viij.

Panis tritici purissimi triti & cribrati ℥ ij.

Formentur trochisci cum iusculo, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, & inungantur cum Opobalsamo, aut oleo Macis aut Garyophyllorū, aut Nucis moschatæ: sed oleum Garyophyllorum propius accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco vmbroso, libero, ventoque perflabili.

VIPERA est serpens, quem recentiores vocant Tirum, Itali verò Marassum & Scurzionem, ut scribit Nicolaus Leonicens. ingrediuntur autem hi Trochisci in Theriacam: apud nos verò nondum licuit videre hoc serpentum genus. Igitur ex Italia peti debent veri Trochisci de Vipera.

Trochisci Scyllitici Andromachi.

℞. Scyllæ assatæ ℞ j.

Farinæ Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum artem.

Tro-

Trochisci Hedychroi D. Aëtj.

℞. Mari [sive Maiorana, aut loco eius Dictamni Cretici.]

Asari

Sampsuchi

Aspalathi [eius loco sumatur semē Agnicasti.]

Opobalsami [eius loco accipiat oleum Garyophyllorum.]

Schœnanthi

Calami aromatici [eius loco sumatur Galāga.]

Phu pontici ana ℥ j. ʒ xv.

Xylobalsami Cinnamomi

Costi ana ℥ j. β.

Myrrhæ Troglodyticæ

Folij [aut succedanei eius.]

Spicæ nardi Indicæ Croci

Cassia ana ℥ iij. β. ʒ xv.

Amomi [aut succedanei eius.] ʒ ij. ʒ xij.

Mastiches ana ℥ β. ʒ vij. β.

Vini veteris odorati dulcis quantum sufficit, formentur Trochisci.

MARVM herba est non dissimilis Maiorana, eius loco accipitur Dictamnus Creticus.

SAMPSUCHVS, id est, Maiorana, quidam habent Amaracum, quod idem est. Non enim debet hoc loco accipi Matricaria, aut Co-

S

tula

tula foetida, quæ etiam vocatur Amaracus.

ASPALATHVS est cortex quidã odoratus, eius loco accipe lignũ Aloës aut Santalum Citrinum odoratissimum, aut semen Agni casti.

FOLIUM.] pro Folio sume Spica Romana. radicem, Macis, ana partes æquales.

HI Trochisci appellãtur ab Arabibus Alindaracaron, à recetioribus verò, vt Nicolao, sunt parum immutati, & vocantur Diacoralli.

Trochisci Hedychroi D. Galeni.

℞. Corticem radicem Aspalathi [ipsius loco sumatur semen Agni casti.]

Calami aromatici [sume eius loco Galangam.]

Costi Asari Xylobalsami Phu

Amaraci [hic significat Maioranam.]

Mastiches ana 3 vj.

Schœnanthi Cinnamomi ana 3 xij.

* Amomi Cassiæ

Rheu pontici [eius loco sume Rhabarbarum.]

ana 3 xv.

Nardi Indicæ

* Folij ana 3 xvj.

* Myrrhæ Croci ana 3 xij.

Omnia subtilissimè trita cum vino Falerano, in Trochiscos formentur, qui in vmbra exiccantur,

iccentur, & Opobalsamo aut oleo Garyophyllorum inuncti reponantur.

GALENVS in libello De Theriaca ad Pamphilianum scripto, ad hunc modum precipit conficiendos esse Hedychroos Trochiscos. Sunt enim proximis non ignauiores.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere semen Agni casti, aut Lignum aloës, aut Santalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter aduertere, ne pro Aspalatho Asfaltum legatur aut accipiatur.

Pro Amomo vero, quo caremus, pone Carpesium, aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro vino Falerno, accipe aliud quoduis vinum generosissimum.

P. C. SCHOL.

Troch. horum descriptionem in Cordo vitiatè positam, hic ex Andernaci versione restitui.

Trochisci Hedychroi alij, Galeni.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Rx. Mari | Amaraci [id est, Maiorana.] |
| Asari | Aspalathi ana 3 ij. |
| Schoeni [id est, Squinanthi.] | |
| Calami odorati | Phi pontici |
| Xylobalsami [aut succedanei eius.] | |
| Opobalsami [aut succedanei eius.] | |

S 2

Cin.

Cinnamomi Costi ana ʒ iiij.
 Myrrhæ
 Folij Malobathri [*aut succedanei eius.*]
 Nardi Indicæ Croci
 Casiæ ana ʒ vj.
 Amomi [*aut succedanei eius.*] ʒ xij.
 Mastiches Chiæ ʒ j.
 Vini Falerni quantum sufficit.

Formētur Trochisci, & in vmbra exiccētur,
 Opobalsamo aut oleo Garyophyllorū vncti.

Pro Maro, sume Dictamnnum Creticum.

*ASPALATHI loco sume lignum Aloës,
 aut Santalum Citrinum, aut semen Agni casti,
 ut Galenus de Succedaneis dicit.*

Pro Calamo, sume Galangam.

Pro Opobalsamo, sume oleū Garyophyllorum.

*Pro Malobathro, sume Spica Romana ra-
 dices, aut Spica Romana Radicum, & Macis
 ana partes æquales.*

*A CASIA, id est, Casia lignea aromatica simi-
 lis Cinnamomo.*

*AMOMI loco sume vocatum Calamū aro-
 maticum.*

*MASTICHE Chia, id est, Mastix è Chio
 insula, qua est optima.*

*HÆC est genuina Hedychroi compositio, ut
 Gale-*

Galenus dicit, & hæc debet ingredi Theriacam
Andromachi seniaris.

GALENVS primo libro de Antidotis ad
hunc modum carmine describit compositionem
Hedychroi magmatis, ubi Theriaca compo-
sitionem docet. Non tamen diligenter distinguit
pondera rerum. Nam omnia coniungit con-
iunctionibus copulatiuis, $\tau\iota$ & $\kappa\alpha\iota$, hoc est,
QVE & ET.

Trochisci Cyphi D. Damocratis.

A

R. Carnium Væ passæ albæ & pinguiissimæ
Terebinthinæ coctæ ana 3 xxiiij.

Myrrhæ

Schœni [id est, Schœnanthi.] ana 3 xij.

Calami vnguentarij 3 ix.

Cinnamomi 3 iiij.

Bdellij Onychis Nardi spicæ B

Cassæ optimæ [quæ est similis Cinnamomo.]

Cyperii purgati

Arceuthidum maximarū & pinguiissimarum
ana 3 iiij.

Aspalathi 3 ij. β. Croci 3 j.

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formandum &
incorporandum.

S 3

M L L-

MELLIS & vini parum debet addi, ut tantum cum his conficiantur Trochisci.

CARNES Vuae passae atque Iuniperi baccas recentes & pingues minutissimè cōscindito tundoq; deinde Bdellium Myrrhamq; affuso vino diluito, postea reliqua omnia in tenuissimum puluerem redigito, ac demum adhibito modico mellis despumati optimi, Trochiscos formato.

Arabes hos Trochiscos vocant Cochion.

Per Vuas passas hic intellige eas quas vocant Vuas Cybibas, vulgò Cibebe.

TEREBINTHINAE cocta: quomodo coquatur Resina Terebinthina, ostendam inferius in tractatu De preparatione medicamentorum.

CALAMVS unguentarius, id est, aromaticus verus, pro quo sume Galangam, quia hodie caremus vero Calamo aromatico.

ONYCHIS, id est, Blatta Byzantia electa.

CYPERVM purgatum praecipit accipiendum, quoniam plerumque fibris sordidis sunt obsita radices eius.

ARCEUTHIDES, sunt bacca Iuniperi. hic autem debent accipi Iuniperi magna grandes bacca: quoniam autem caremus ipsis, vulgaris & minoris Iuniperi baccas accipere licet.

Pro Aspalatho sumatur semen Agni casti.

ex

ex mente Galeni de Succedaneis.

P. C. SCHOL.

Troch. hi apud Galenū leguntur lib. 2. Antid. A Onychis, Bdellij.] Fuchsius unā cum Cordo B duas hic distinctas res legit, intelligit ac defendit mordicus. Matthiolus verò atque Franciscus contrā, unā cum Andernaco & Martiano Rota Galeni interpretibus pro unica eademq; re, ambas eas voces intelligendas esse strenuè contendunt, & unguim Bdellij tamquam Bdellium ungui simile, legendum esse sentiunt atque volunt.

Trochisci Ramich D. Mesua.

℞. Succī Acetosæ [aut loco eius succi Citoniorum austerorum.] ℥ xvj.

Rosarum ℥ j. Granorum Myrti ℥ ij.

Bulliant parū & colentur, colaturæ addatur Gallarum iamiam tenuissimè tritarum ℥ iiij.

Coquantur denuò aliquantulum, deinde inspergatur sequentium specierum minutissimus & optimè commistus pulvis.

℞. Rosarum ℥ j.

Santali Machoziri ℥ j. ℥ ij.

Gummi Arabici ℥ j. ℥ iiij.

Carnium Sumach

S 4

Spodij

Spodij ana ℥ j.

- Succi Agræstæ ℥ vij.
- Succi granorū Myrti multū tritorum ℥ iiij.
- Ligni Aloës Garyophyllorum Mastichis
Nucis moschatæ ana ℥ iiij.

Misceantur omnia optimè, deinde exiccantur, exiccata rursus in tenuissimum pulverem terantur, & formentur Trochisci subtiles cum Camphoræ aureo vno, & aqua rosarum quantum sufficit. Exiccantur in vmbra libera, exiccati reponantur.

VENTRICEVLVM, cor, hepar, imbecilla firman: & lubrica viscera ac intestina, choleram morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent, ob quam naribus sanguine fluentibus flando impellitur, aliis medicamentis miscetur.

A *Trochisci de Cappare D. Mesue.*

Rx. Corticum radicum Capparis

Seminis Agni casti ana ℥ vj.

Seminis Nigellæ veræ

Calaminthæ

Succi Eupatorii [*id est, Gratiola.*]

- Acori

Amygda-

Amygdalorum amarorum

Sem. Nasturtij Ammoniaci

Foliorum Rutæ

Radiciſ Aristolochiæ rotundæ verę ana ʒ ij.

Cyperī

Scolopendriæ ana ʒ j.

Formētur Trochiſci cū Hammoniaco prædicto in aceto diſſoluto, & exiecati reponantur.

SCOLOPENDRION eſt Ceterach, & non Lingua cervina.

P. C. SCHOL.

Troch. de Capp.] Compositionem hanc apud A
Cordum mancam eſſe cū Fuchſius meritò
conqueratur, nos eam hic ex vetuſtis partim ex-
emplaribus, partim ex Minoritarū in Meſuem
(ex quibus pleraque alia) reſtitutionibus, ſua
integritati repoſuimus. Qui inquam, Fratercu-
li hoc nomine hercle plurimum laudis ac præ-
rij merentur, quòd extra profeſſionem etiam ea
in re plura præſtiterint ſoli, quàm innumeri alij,
quamquam eos caſpitare quandoque, & iudicio
carere interdum ſatis ſit in confeſſo: laborem in-
terim indefeſſum, quem in reſtituendo impen-
derunt, negotiūque ipſum tam ingens, tantiq;
commodi nobis præſtitum haud exoſculari, ma-
gnisq; efferre præconiis non debemus. Immeritò

S s

itaque

itaque nimisq̃, quàm decent, à quibusdã exagitantur boni fratres.

Ad splenis duritiem & flatus eius dissipandos valent.

Trochisci de Eupatorio D. Mesua.

R. Tereniabin [*id est, Manna.*]

Succi Eupatorii ana ℥ i.

* Rosarum ℥ β. Spodij ℥ iiij. β.

Spicæ nardi Indicæ ℥ iiij.

Rhabbarbari Asari

Anisi ana ℥ ij. β.

Formentur Trochisci cum aqua Cuscutæ, & in vmbra libera ventoq̃ue perflata exiccati reponantur.

Pro Spodio sumatur Ebur combustum.

EUPATORIVM Mesua, intelligendum est Gratiola.

OBSTRUCTIONEM & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac innatas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

A Trochisci Diani, seu potius, Dianõ D. Nicolai.

R. Florum Violarum viridium ℥ v.

Amyli ℥ iiij.

Seminis papaveris albi ℥ ij. ③ j.

Rha-

TROCHISCI.

283

Rhabbari 3 j. 3 ij.
Seminis plantaginis 3 j.
Balsami [loco eius oleum Garyophyllorū.] 3 j.
Rhodostagmatis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

DIANI, vel DIAVI, aliàs vocantur
hi Trochisci, sed corrupto nomine.

PER VIOLAS, hoc loco oportet intelligere B
Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyri Citri-
ni, vulgò Gelbe Violen.

Per Balsamum intelligitur Opobalsamum.

RHODOSTAGMA, id est, aqua Rosarum.

P. C. SCHOL.

Troch. Diaui.] horū Troch. duas descriptio- A
nes in idem recidentēs, alterius pondere tantum
triplicato, mēdoq; in Rhabarb. pondere sublato;
temerè Cordus posuerat. Mancè enim ibidē 3 j.
quod & Fuchsf. ritè animaduerterat, positus
erat, cūm 3 j. 3 ij. ut restitui, legendum sit.

Per Violas.] Malè id sentit Cordus, ut & B
Fuchsf. docet: nō enim Dialeucoion, hoc est, ex Vio-
lis albis, quas Cheyri vocamus, sed Diaion, hoc
est, ex Violis nigris seu Martiis dictis, appellan-
tur hi Trochisci. Viola itaque Martia virentes
hic intelligenda veniunt.

Excalfactiones mitigāt, aluumq; emolliūt.

Tro-

Trochisci de Lacca D. Mesue.

℞. Laccae mundatæ

Succi Glycyrrhizæ

Absinthij

Berberis

Succi Eupatorij [*id est, Gratiola.*]

Rhabarbari Aristolochiæ longæ Costi Afari

Amygdalorum amarorum

Rubeæ Tinctorum

Anisi Apij Schœnanthi ana ʒ j.

Formentur Trochisci drachmæ pondere cum aqua Eupatorij.

Mesue intelligit suum Eupatorium, id est, Gratiolam.

- * Trochisci de Lacca valent ad obstructiones hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per vrinas mouent.

Trochisci Diarhedon D. Nicolai.

℞. Rosarum viridium ʒ iiij.

Spodij [*id est, Eboris combusti.*] ʒ ij.

Santali rubri ʒ j. β. ʒ vij.

Santali albi ʒ j. ʒ xij.

* Croci ʒ ij. ʒ viij.

* Camphoræ ʒ xij.

Aquæ Rosarum quantum sufficit, formantur Trochisci.

Ista

TROCHISCI.

285

*Ista compositio debet administrari in magnis
confectionibus ipsius Nicolai.*

Trochisci de Rhabarbaro D. Mesue.

R. Raved boni [id est, Rhabarbari.] 3 x.

Succi Eupatorii [id est, Gratiola.] 3 iiij.

Rosarum 3 iiij.

Spicæ nardi Indicæ Anisi

Rubeæ tinctorum Seminis Apij

Absinthij Asari ana 3 j.

Amygdalarum amararum 3 iiij.

Formentur Trochisci aurei vnus pondere
cum aqua Cuscutæ.

VALENT ad hepatis obstructionem, do-
lorem, tumores præter naturam, affectus inue-
teratos eiusdem, & hydropem, & icterum, &
formæ corruptionem.

Trochisci de Berberis D. Mesue.

R. Berberis 3 ij.

Spodij Xyloaloës

Seminis Accrosæ Mastiches

Galliæ moschatæ veræ

Spicæ nardi Indicæ ana 3 j.

Rosarum 3 v.

Gummi Arabici 3 iiij.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

For-

Formentur Trochisci.

TROCHISCI de Berberis seu Oxyacanthæ valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

Trochisci Gallie moschata D. Mesue.

℞. Xyloaloës crudi ʒ v.
Ambra ʒ iij. Moschi ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosarum factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui.

CEREBRVM, corque roborant, vomitum & alui profluuium sistunt, oris atque adeo corporis totius odorem commendant.

Trochisci Alyptæ Moschata D. Nicolai.

* ℞. Ladani purissimi ʒ iij.
Styracis Calamitæ ʒ j. β.
Styracis rubrae ʒ j.
Ligni aloës ʒ ij. Ambra ʒ j.
Camphoræ ʒ j. β. Moschi ʒ β.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

STYRAX rubra, hic non significat Thymiam, aridum illum & nigrum corticem: sed resinam Styracis qua subrufa aut flaua est, id est, optima Styrax.

V A-

VALENT pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere. Fit inde optimū fumigium & odoriferum, & assumuntur etiam ad preciosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico D. Mesuæ cap. de
Agarico ex Haly.*

R. Agarici electi ℥ iij. Salis gemmei ℥ j.
Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & reponantur in calido siccoque loco.

Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cū cholera mistū. Et præcipue educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

*Agaricus Trochiscatus D. Mesuæ, cap.
de Agarico ex Galeno.*

R. Agarici electi ℥ iij.
Vini infusionis Zingiberis quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

Trochisci de Charabe D. Mesuæ.

R. Charabis aureos vj.
Cornu cerui vsti Gummi Arabici assati
Corallij rubri vsti Tragacanthæ
Acatix Hypocystidis
Balau-

Balaustiorum florum Mastiches Laccæ
 Papaueris nigri assati ana aureos ij.
 Thuris Croci
 Opij ana aureum j. β.

Mucilaginis Psyllij quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

TROCHISCI de Charabe siue ex Succino, inuenti sunt ad restringendum sanguinem vndecumque fluentē, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

Trochisci de Myrrha D. Rhasis.

℞. Myrrhæ ʒ iij. Lupinorum ʒ v.
 Foliorum Rutæ Mentastri
 Pulegij ceruini Cymini
 Rubeæ tinctorum Assæ foetidæ
 Sagapeni Opopanacis ana ʒ ij.
 Succu Arthemisiæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

MENTASTRYM est siluestris Mentapilosis & hirsutis foliis.

PVLEGIUM Cernuum, id est, Dictamnus Creticus.

Prouocant menstrua, & sedant passionēs quæ

quæ ex retentione menstruorum proneniunt.

Trochisci de Alkekengi D. Mesue.

℞. Fructuum Alkekengi ʒ iij.
 Seminis Citrulli Seminis Albatechæ
 Seminis Cucurbitæ ana ʒ iij. β.
 Boli Armeniaci Gummi Arabici Thuris *
 Sanguinis Draconis Papaueris albi
 Amygdalorum amarorum
 Succi Glycyrrhizæ Tragacanthæ Amyli
 Pinearum ana ʒ vj.
 Seminis Apij Charabis
 Boli [*aut eius loco Terra sigillata.*]
 Hyoscyami Opij ana ʒ ij.
 Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad for-
 mandum Trochiscos.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

ALBATECHA siue Batega, est Melon
 magnus Indus, viridis & subniger.

TROCHISCI Alkekengi seu Halica-
 cabi valent ad renū & vesicæ vlcera, & natam
 inde dysuriam.

Trochisci de Rosis D. Rhasis.

℞. Rosarum ʒ iij. *
 Ligni aloës *
 Spicæ nardi Indicæ Mastiches *
 T Casiæ

Cassæ lignæ [aut succedanei eius.]

Florum Squinanthi Cinnamomi

Absinthij ana ℥ j.

Vini veteris quantum ad formandum Trochiscos satisfuerit.

Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorē, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maximè quibus forma corrumpitur.

Trochisci de Camphora Mesua.

℞. Rosarum ℥ iiij.

Spodij Glycyrrhizæ ana ℥ ij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris Seminis Melonis

Tragacanthæ Croci Gummi Arabici

Spicæ nardi Indicæ ana ℥ j.

Santali citrini ℥ ij. ℞.

Ligni aloes Cardamomi Amyli

Camphoræ ana ℥ ij.

Sacchari Tabarzeth

Teretiabin [id est, Manna] ana ℥ iiij.

Mucilaginis Psyllij cum aqua rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI Camphoræ cōferunt ad febres

febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem,
ventriculi & hepatis intemperiem calidam, &
ab his sitim inexpletam: icterum quoque ac
phthisim & hecticam curant.

Trochisci de Terra sigillata D. Mesue.

℞. Sanguinis Draconis

Gummi Arabici assati Trochiscorū Ramich

Rosarum rubrarum Seminis Rosarum

Amyli assati Spodij Acatix

Lapis Hæmatitidis Hypocystidis

Florum Balaustiorum Boli Armeniaci

Terræ sigillatæ [vel Boli Armeni.]

Corallij rubri Charabis ana ʒ ij.

Margaritarum Tragacanthæ

Papaueris nigri ana ʒ i. β.

Seminis Portulacæ assati

Cornu ceruini vsti Thuris

Gallarum Cypressi

Croci ana ʒ ij.

Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Et quandoque adduntur Opij ʒ ij.

S P O D I I.] pro Spodio sume Ebur combu-
stum preparatum.

SEMEN Rosarū hic significat Anthemon,

T 2

id est,

id est, luteos apices, qui sunt in Rosis: hi exiccati rubescunt.

GALLAE Cypressi, etiam vocantur nuces Cypressi.

P. C. SCHOL.

Mesues exemplaria Gallas absolute scriptas habent.

SUNT admodum efficaces ad sputum sanguinis, cum aqua Plantaginis poti: ad fluxum verum sanguinis e naribus, fronti illiti: ad menses immodicos, utero injecti vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in vesicam injecti, & ad alias hemorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

Trochisci de Spodio Mesuae.

- ℞. Rosarum rubearum ℥ xij.
 Spodij ℥ x. Seminis acetosae ℥ vj.
 * Seminis Portulacae
 Coriandri preparati & tosti
 Pulpae Sumach ana ℥ ij. β.
 * Amyli assi Florum balauustiorum
 Baccarum Berberis ana ℥ ij.
 Gummi Arabici assati ℥ l. β.
 Agrestae quantum sufficit.
 Formentur Trochisci.

VALENT ad febres biliosas cum alui fluxu:
 re: in-

re: inflammationem ventriculi & hepatis, & sitim continuam sedant.

Trochisci de Absinthio D. Mesua.

℞. Rosarum Absinthij Anisi ana ℥ ij.

Raued [*id est, Rhabarbari.*]

Succi Eupatorii [*id est, Gratiola.*]

Afari Seminis Apij

Amygdalorum amarorum

Spicæ nardi Indicæ Mastiches

Folij ana ℥ j.

Succi Endiuix quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

Pro Folio accipe radices Spica Romana, aut radicem Spica Romana, & Macis ana partes aequales.

OBSTRUCTIONES vētriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt, dictas partes reliquasque nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

Trochisci Albandal D. Mesua.

℞. Pulpæ Colocynthidis ℥ x.

A

Incidantur minutissimè, & fricentur cū olei

Rosacci ℥ j.

Deinde fume

Gummi Arabici

Tragacanthæ

Bdellij ana ℥ vj.

T ;

Macc-

Macerentur hæc in aqua rosacea, donec liquefiant & dissoluantur: deinde cum parte resolutarum lachrymarum formentur ex prædicta Colocynthide Trochisci qui siccantur, & cum fuerint siccati, cōtundantur minutissimè, & rursus formentur Trochisci cum reliquo diluto lachrymarum, atque reponantur.

Trochisci Colocynthidos in Hierā Hermetis, & Cōpositiones alias iniiciendi loco Colocynthidos, suntq̃ salubriores quàm ipsa Colocynthis.

P. C. SCHOL.

ζ x.] Cordum hic falli Bernardus Dessennius in suis illis verbosis Cōmentariis, miserè exclamat, eò quòd ζ x. pro ζ x. ut ipse inquit, hic posuerit: cum ipsemet hac in re (ut & plerisque aliis locis) iudicio vacuus, toto erret calo. Verum in alio Dispensariolo Senatus sui iussu emisso, dextrè respicit, à suis collegis forsā monitus. Proinde quid Fuchsius artis nostræ (ut & plurimis aliis locis liquet) nescius, in Pharmaceuticas rationes, hoc loco suis annotationibus imaginando deliret, nescio. Mihi brevitati studendum est.

Trochisci Bechij albi.

℞. Sacchari albißimi

℥ j.

Sacchari

Sacchari Candi optimi

Sacchari Penidij ana ℥ iiij.

Ireos ℥ j. ℥ vij.

Amyli ℥ ij. ℞.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ eū aqua
Rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui, & signentur.

AUXILIANTUR tussiculosis, & diffi-
culter spirantibus.

Trochisci Bechj nigri.

℞. Succī Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Styracis calamitæ ℥ j. ℞.

Sacchari candi ℥ ij. ℞.

Specierum Diaireos Salomonis

Specierum Lohoch sani ana ℥ ℞.

Sacchari penidij ℞.

Sacchari albissimi ℞ ij. ℥ iiij.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Hyssopi
factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci & signentur.

ABSCISSAE vocis iacturam refarciunt,
& profunt his qui patiuntur tussim calidam &
siccam, leniunt pectus, & faciunt sputum.

TROCHISCORVM DVAE

SEQUENTES VALERII CORDI

*descriptions huic editioni nunc
primum accesserunt.*

Trochisci de Lacca Val. Cordi.

℞. Laccae electae ℥ iiij.

Ligni Guaiaci scobina in minimam scobem
seu rasuram detriti ℥ j.

Coquatur lignum Guaiacum in ℥ iiij. aquae
caelestis ad consumptionē ferē dimidię partis:
In colatura deinde coquito rad. Rubeę tinctorum
℥ iiij. donec remaneat ℥ j. ℞. Dein iterum
colato, & colaturę iniice predictas ℥ iiij. Lacce,
& ad ignē coquito, donec Lacca dissoluatur.
Postea colato & exprimito. & abiice superflui-
tates Lacce. Colaturam dein ad spissitudinem
aliquā coquito, & insperge sequentes pulveres:

℞. Aristolochiæ longæ Radicis concavæ

Rhabarbari Costi veri ana ℥ ij.

Zedoariæ Galangæ Afari radicum

Curcumæ Cinnamomi Ligni aloës

Nucis moschatæ Schoenanthi ana ℥ j.

Camphoræ ℥ j.

Misceantur omnia optimè, & formentur
Trochisci drachmæ vnius pondere.

RADIX

*RADIX concava, Holvvurtz, quæ falsò
appellatur Aristolochia rotunda.*

Hos Trochiscos composui aliquibus ob-
structione splenis hepatisque laborantibus, &
præsenti auxilio id malum curauerunt.

Trochisci de Succino Valerij Cordi.

R. Ambrae excellentissimæ
Succini albissimi ana ℥ j.
Succini Phalerni
Succini cerei ana ℥ iiij.
Succini nigri Camphoræ
Margaritarum non perforatarum
Margaritarum perforatarum ana ℥ ij.
Onychis Dentaliorum
Entaliorum Umbilici marini
Lapidum cancrorum
Synodontum Ligni aloës Cinnamomi
Schœnanthi Nucismoschatæ Cubebarum
Cardamomi Croci Cyperi rotundi
Zedoariæ Doronici ana ℥ j.

Conterantur omnia minutissimè, & confi-
ciantur Trochisci cum mucilagine Tragacan-
thæ albissimæ in aqua Maioranæ dissolutæ.

AMBRA est succinum Orientale.

SUCCINVM est quod Arabibus vocatur

T 5

Carabe,

Carabe, Germanis *Agstein* siue *Bernstein*: *Sa-*
daniis, *Gentar*: *Gallis*, *Ambre*. Est enim *Succi-*
num nihil aliud quàm *Ambra Germanica*.

Phalernum, id est, *flauum* & *clarissimum*, &
omnino pellucidum.

Cereum, id est, quod *cera* *colorem* *habet*, non
adeò pellucidum est.

Nigrum Succinum alio nomine vocatur *Ga-*
gates lapis, Germanicè *Suwartzer Agstein*, oder
Suwartzer Bernstein.

Inter emendū *album Succinum*, vitare oportet
scobem & *ramenta*: nam hac solent pro albo
Carabe vendi. Cū enim *Cereum* aut *Phaler-*
num Succinum tornatur, candida *ramenta* re-
mittit. Ideoq; *integras glebas candidi Succini*
emere oportet. Est enim *valde pretiosum*.

Onychis, id est, *Blatta Byzantia*.

Vmbilici marini, Germanicè *Meerbonen*.

Lapis Cancrorum, id est, quos vocant *Ocu-*
los cancrorum.

Synodonites lapides, sunt in capite *Synodon-*
tis piscis inuenti: qui si haberi non possunt, quo-
nam piscis marinus est, pro iis accipiantur la-
pilli qui bini inueniuntur in capitibus pisciū flu-
uiatiliū, quos *Raulperszken* Germanicè vocant.

Hī Trochisci faciunt ad calculū, ad tumen-
tem

em ventriculum, vertiginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem & imbecillitatē cordis, ad paralyfim si dantur in aquis appropriatis, cum Betonicę floribus, aut Lauēdulæ, aut Tiliæ: & ad suffocationes & strangulationes vteri valēt.

O L E A.

Oleum ex ligno Iuniperi.

Fictile vas in foueā ponatur, supra id aliud fictile angusti orificij inuersum ponatur, recentibus Iuniperi lignis minutimque incisis plenum, cui subducatur lamina ferrea foraminibus peruia, vt destillet liquor, & ne ligni segmenta delabantur; bene autem aptentur, & luto sapientiæ circumlinantur fictiliū orificia, ne quidquam expiret. Postea inferius fictile vsq. ad collū superioris obruito terra, & facto pauimento ignem circa & supra fictile superius accendito atq. ardere finito aliquot horas. Postremo liquorem qui destillauit, auferro. Cuius vsus est purgandis sordidis vlceribus.

E M E N D A T cutis infectiones, serpiginem, cancrum, vlcera maligna, qualia quæ in tibiis & cruribus quorundam, malum mortuum recentiores vocant.

Oleum

Oleum ex Iuniperi baccis.

Oleum è Iuniperi baccis elicitur per artē distillandi, ut Vinū sublimatū. Quia verò minoris emitur quàm ut ab aliquo Pharmacopola preparari queat, confectionem eius nō indicabimus.

Oleum Nardinum simplex D. Mesue.

℞. Spicæ nardi aromaticæ ℥ iiij.
 Vini Aquæ ana ℥ ij. ℞.
 Olei sesamini ℞ j. ℞.

Coquātur in duplici vase, donec vinū & aqua in vaporē resoluantur: coletur deinde oleum, & colatum reponatur abiecta Nardi spica.

VAS duplex, Gracè vocatur DIPLOMA; constat duobus crateribus, altero alteri imposto, ita ut in unum aromata & oleum coniiciantur, in alterum verò aqua fundatur, quæ subiectis prunis calefacta suo tempore unguenta & olea decoquit: est autem hoc notandū in omnibus aromaticis oleis quæ decoquuntur.

CALEFACIT, tenuat, digerit, modicè adstringit, proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, uteri magnoperè iuuat: naribus iniectum caput purgat, corporis colorem & odorem commendat.

Oleum

Oleum Nardinum compositum D. Mesuae.

℞. Spicæ Indicæ ℥ iij.

Sampsuchi [id est, Maiorana.] ℥ ij.

Xyloaloës Enulæ Folij Indi

Calamiaromatici [eius loco sumatur Galāga.]

Foliorum Lauri

Cyperī Schœnanthi

Cordumēni ana ℥ j. β. *

Contundantur omnia grosso modo, deinde
affunde illis

Aquæ fontanæ

Vini, ana quantum sufficit, i. circiter ℥ xiiij.

Olei Sefamini ꝑ vj. *

Macerentur per noctē, deinde coquantur in
Diplomate, id est, duplici vase, secundū artem.ꝑ ꝛo Folio Indo, recipe Spica Romana radi-
cum, macis ana ℥ v.*Oleum Costinum D. Mesuae.*

℞. Costi amari [optimi & veri.] ℥ ij. *

Casia [aut succedanei eius.] ℥ j.

Summitatum Sampsuchi ℥ ij. *

Vini quantum sufficit

Olei Sefamini ꝑ ij. *

Macerentur duabus noctibus, deinde co-
quantur in duplici vase secundum artem.

CASIA, *Aromatica vera*, & *Cinnamomum* similis accipi debet.

CALFACIT, obstricta aperit, neruosum genus roborat, vt neruos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum. Præter hæc, hepar & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

Oleum de Piperibus D. Mesua.

℞. Macropiperis [*id est, longi.*]

Melanopiperis [*id est, nigri.*]

A Leucopiperis [*id est, albi.*] ana ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum

Myrob. Indorum ana ʒ v.

Radicum Apij

Radicum Fœniculi ana ʒ iiij. β.

Sagapeni Opopanacis

B Ammoniaci ana ʒ ij. β.

C Turbith albi ʒ ij. Zingiberis ʒ iiij.

Caulis foliorum recentium

Thymi viridis Rutæ viridis ana m. j.

Coquantur secundum artem in aquæ quantitate sufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de Chervæ ℥ ij. & iterum coque ad consumptionem aquæ.

F. C.

Ana ʒ iiij.] Cordus malè ʒ iiij. hic habebat. A
Ammoniacy.] Hyoscyami fœdè in Cordole- B
gebatur.

ʒ ij.] ʒ xij. vitiosè Cordus scripserat, ut C
hac omnia ritè à Euchsio quoq. dicuntur; quam-
quam à Monachis hausta esse non dubitem.

I V V A T morbos neruorū frigidos, ut para-
lysin, spasmus, spasmū cynicum, tremorem,
epilepsiam: adhuc ischiadem, & ceteras arthri-
tidis differentias, & vteri, coli, renū, vesicæ af-
fectus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget: ob-
id obstructions aperit, calculum frangit.

Oleum Mandragoræ D. Nicolai.

℞. Olei P. v.

Succi malorum Mandragoræ ʒ viij.

Succi capiti Papaueris hortenſis ʒ vj.

Succi Hyoscyami albi ʒ iiij.

Succi Violarum

Succi Cicutæ tenerimæ ana ʒ ij.

Opii Styrcis ana ʒ j.

Confice sic: misce simul omnes succos oleo,
atq. in vitreo vase obſtructo orificio; Soli ex-
ponito per decem dies: vndecimo die coquan-
tur in duplici vase vsque ad consumptionem
succo-

succorum: deinde ubi refrigerari cœperit, cola
& colato oleo adde Styracem & Opium, &
confice secundum artem.

STYRAX quidem sincerus & purus facil
in oleo dissolvitur.

OPIUM verò sincerum in oleo dissolui non
potest, igitur tenuissime tritū inspergatur oleo
& sapè misceantur: nam nisi in aqua aut vino
dissolvatur, non commiscebitur oleo.

Non habentur apud nos Mandragora pomorum
ergo loco succi Mandragora pomorum accipe
infra scriptam decoctionem.

R. radicū Mandragora, id est Corticū radi
cum eius ꝑ j. Contundantur, & coquantur in
aqua sufficienti, & colatum decoctū succis adde

A D nimios dolores capitis valet, & phre
neticis malè dormientibus fronti illitum, &
naribus iniectum vehemēter opitulatur, pul
sibus brachiorum & plantis pedum illitum
quocumque modo vigiliis fatigatum celerri
mè obdormiscere facit.

Oleum Mastichinum D. Mesue.

| | | |
|------------------|---|-------|
| R. Olei Rosacei | ℥ | xij. |
| Vini odoriferi | ℥ | iiij. |
| Mastiches electæ | ℥ | iiij. |

Coquan-

Coquantur secundum artem vsque ad consumptionem vini.

CEREBRUM, nervos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores sedat.

Oleum de Euphorbio D. Mesue.

℞. Euphorbij ℥ β. Olei Cheyrini ℥ v.
Vini odoriferi tantundem, coque secundum artem vsque ad consumptionem vini.

I V V A T maximè frigidus cerebri & nervorū affectus, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum, naribus immissum: articulorum quoque & hepatis, & splenis dolores, illitum iuuat.

Oleum Castorei D. Iacobi de Manliis.

℞. Castorei Styrcis calamitæ Galbani
Euphorbij Casia lignæ veræ Croci
Opopanax

Carpobalsami [aut succedanei eius.]

Spicæ nardi Indicæ

Costi ana ℥ iij.

Cyperī Schœnanthi Macropiperis

Melanopiperis Sabinæ

Pyrethri ana ℥ ij. β. Olei ℞ iij.

Vini odoriferi ℞ ij.

Confice sic Galbanū & Opopanaxem: in vi-

V

no

no seorsim dissolue, deinde reliqua omnia con-
tusa cum oleo & vino coquito ad cōsumptio-
nem vini in duplici vase: postea cola, & dissol-
lutū & expressum Galbanum cum Opopanace
oleo adfunde, & iterum coque ad cōsumptio-
nem vini, & repone sæpius miscens in poste-
rum, vt Galbanum & Opopanax in vasis fun-
do subsidentes, oleo commisceantur.

Est optimum contra omnes ægri-
tudines frigidas, præsertim nervorum & iuncturarum,
medetur paralyfi, spasmo, tetano, & sedat
acerrimos rigores, & frigora februm, si spina
dorsi linatur.

Oleum Scorpionum simplex D. Mesuæ.

- R. Scorpiones numero xx. vel xxx. secun-
dum eorum magnitudines.

Olei Amygdalorum amarorum f. ij.

- Maccurentur in vase vitreo stricti orificij per
dies xxx. caniculares ad solem, vel pluribus
diebus: postea colatum ad vsus repone.

LAPIDEM renum & vesicæ frangit & ex-
pellit, lumbis, pubi, peritonæo illitum, aut per
meatum vrinarium iniectum.

Oleum Scorpionum compositum D. Mesuæ.

R. Aristolochiæ rotundæ Gentianæ Cypri
Col.

Corticum radicum Capparis ana ℥ j.

Olei Amygdalorum amarorum ℞ j. ℞.

Macerentur in oleo contusæ radices ad Solem feruidum diebus viginti: deinde coquantur aliquantulum in duplici vase, iniectis ad ultimum scorpionibus numero xv. postea iterum serenis diebus xxx. ad Solem macerentur: postremo excolatum oleum reponatur.

ARISTOLOCHIA rotunda non est Hol-
vurtz, sed radix lactei coloris, odore & sapore
Aristolechia longa: affertur ex Italia.

VALET contra venena, & pestilentiam.

Oleum Formicarum.

℞. Formicarum alatarum quantum vis
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus xl. post-
ea excolatum oleum reponere.

VALET ad confortandum coitum.

Oleum Lumbricorum terrestrium.

℞. Vermium terræ ℞ ℞.

Oleum oliuarum ℞ ij Vini ℥ ij.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum: deinde
percoletur & reseruetur.

NERVOS in frigidatos confortat, & vile
est doloribus iuncturatum.

V 2

Oleum

Oleum Vulpinum D. Mesue.

℞. Vulpem detracta pelle, & abiectis intera-
neis, incidatur in partes, & coquantur in
aquæ fontanæ

* Aquæ marinæ ana ℥ iij. ℥ iiij.
Olei veteris clari ℥ iij. ℥ ix.
Salis ℥ iij. Inter coquendum adde
Anethi Thymi ana ℥ j.

Coquantur autem quousq. ab ossibus reco-
dat caro, & aqua consumatur: deinde coletur
oleum, & excolatum ad vsus suos reseruetur.

Qui prope mare non habitât, sumant aquam
salsam, id est, Muriam, siue aquam fontium sal-
sorum, ubi salina fuerint. Porro ad coquendam
vulpem non sufficit aquarum præscriptarum
quantitas; ideo accipe quantum abundè sati-
fuerit, & fortiter ultimò oleum exprime.

Ad podagras, reliquasq. arthritidis species
ac dorsi, renumq. dolorem est efficacissimum.

Oleum de Cappare.

℞. Corticis radicum Capparis ℥ j.
Corticum Tamarisci Foliorum Tamarisci
Seminis Agnicasti
Scolopendriæ [id est, Asplenij.]
Cyperii ana ℥ ij. Rutæ ℥ j. Aceti
Vini

Vini optimi ana ℥ ij. Olei maturi ℥ j. *

Coquantur in duplici vase vsque ad consumptionem vini & aceti.

VALET duritiei, oppilationi, & dolori splenis, ac omni eius ægritudini.

Oleum de Lateribus D. Mesue.

℞. Laterem aut regulā rufam antiquissimam ex rufo luto ductam, eam confringe in frusta medioeria, & in prunis vrito, donec tota excanduerint: deinde è prunis exempta fragmenta restinguito in oleo claro veteri, & dimittito quousque se oleo implenerint: postea oleo exempta in tenuissimū pulverem contundito, atque in Retortam aut Cucurbitam vitream indiro, & secundum artem luto chymistico iuncturas vitrorum claudito, & subtus accensis prunis oleum elcito, & elicitedum reponito.

Conuenit omnibus morbis frigidis. Est enim calidum, penetratiuum, resolutiuū, molit dura, & discutit tumida. Opitulatur his qui patiuntur epilepsiam, vertiginē, obliuionem, paralyfin, spasmus, dolorem dorsi & genuum, podagram, vel alios iuncturarum & neruorum morbos: medetur spleni, vesicæ & renibus.

Oleum Terebinthine.

℞. Resinæ Terebinthine aut Lariceæ, quam in Germania Terebinthinam vocamus ℞ iiij. eam pone in capacem Retortam, siue Cucurbitam vitream, & per artē destillatoriam elice eius oleum, ita vt Cucurbita aut Retorta arenæ imponatur. Primò autem cum aqua exhibit oleum tenue & clarum, secundò aurei coloris, vltimò fuscum & crassum, horū vnumquodque per se auferto & reponito.

CONFERT omnibus ægritudinibus frigidis, & maximè neruorum.

Oleum Tartari.

℞. Tartari puri ℞ iiij.

Pone in ollam, & vre in fornace cum lateribus aut tegulis aut fictilibus, vel per se, donec omninò excandescat Tartarū. Postea impone in sacculum lanceo panno factum, & suspende in cellario, tum destillabit ex eo clarus quidam liquor, quē repone. Porro re vera hic humor non est oleum, sed acerrima aqua.

VALET ad faciē tergendā, & erugandam.

Oleum Cytoniorum D. Mesue.

℞. Cytoniorum non excorticatorum
Succi Cytoniorum ana quantum sufficit.

Incidito

Incidito Cytonia, & impone in vas vitreum, & affunde succum. Affunde etiam oleum omphacinum, hoc est immaturū, vt excedat eius quantitas succi mēsuram. Postea stringe vasis orificium, & ad Solem omnia macera, aut in æstuario diebus quindecim: deinde coque in duplici vase, & abice posthac Cytonia, & adde recētia, & rursus macera & coque, inde etiam tertio recentia Cytonia impone, & prædicto modo omnia perage, tum repone diligenter obstruētum, ne expiret.

Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum: igitur rogo vt maiorem diligentiam impendant.

Est optimum contra debilitatem stomachi, vomitum & fluxum, sistit sudorem, restaurat resolutionem, lapsas vires, corroborat nervos & vires, confortat digestiuam.

Oleum Sampsuchinum.

℞. Foliorum Sampsuchi m. iiii.
 Serpylli m. ij. Foliorum Myrti m. j.
 Abrotoni Sissimbrij ana m. β.
 Cassiæ lignæ veræ ℥ ij.
 Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia, & vitreo vasi impone ac infunde oleū vt supra species emineat:

emineat: tum obstrueto vasis orificio macera
ad solem vel in æstuario diebus octo. Postea
exprime, & expressum oleum infunde recenti-
bus speciebus, & hoc etiam tertio facito.

*Folia vera Myrti accipi debent, qua ex Italia
& Narbonensi Gallia afferuntur.*

*SISIMBRIVM, id est, Mentha aquatica.
est & aliud Sisimbrium in montibus nascens,
multo odoratius, quod melius esset si ubique
haberi posset.*

*OMPHACINVM, id est, ex immaturis
olivis expressum.*

LASSITVDINI utile est, & morbis ce-
rebri & nervorum prodest, ob id in balneo in-
unctum paralytim iuvat & spasmum cynicum,
vulgo torturam oris, naribus iniectum: & au-
ribus immissum à flatu tinnitum dissipat, nae-
ses ciet, ac morsui scorpionis prodest.

Oleum Vitellorum ouorum.

℞. Quæ recetia numero centum; coquito donec
penitus indurentur. postea vitellos eorum
exime, & comminutos assa in sartagine mo-
uendo donec rufescant, & pinguedinem quan-
dam remittant: deinde offam feruentem in-
iice in sacculum pilis contextam, & exprime,
quodque

quodque expressum fuerit oleum repone.

EXPERIENTIA plurima probatū est, cutim expurgare, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia persanare, capillos regignere, & vlcera maligna & fistulosa curare.

Oleum Hyperici Iacobi de Manlius. *

Rx. Summitatum Hyperici iamiam maturefcentis ℥ iij.

Maceretur in vino odorifero diebus iij. bulliant deinde in vase duplici obturato orificio vasis: postea exprime, & recentis Hyperici par pondus iniice, & iterum macera & coque, & exprime, tum etiam tertio recens Hypericum adde: & si vinū minuitur, adde aliquid. Postea

Rx. Terebinthinæ claræ ℥ iij. *

Olei veteris clari ℥ vi. Croci ʒ j.

Coquantur in duplici vase vsq. ad consumptionem vini: postea exprime, & à sedimento purgatum oleum repone.

CALIDVM est & siccum, stipticum, ob id consolidat vulnera incisorum neruorum & combustionem ignis, sedat dolores femoris & vesicæ, & prouocat vrinam.

Oleum Irinum.

Rx. Olei r vj. Vini r j. Laue-
V s

Lauetur oleum ter in aqua calida, deinde effusa aqua adde vinum, & insperge

Macis ℥ iiij.

Cardamomi Zedoaria ana ℥ ij.

Macerentur in loco aliquo calido, obstructo vasis orificio per dies octo: postea in duplici vase coquito, usque ad consumptionem vini dimidij. Postea exprime oleum, & insperge ei puluerem subtilem

Iridis Illyricæ ℥ ij.

Macera vt prius diebus octo, deinde exprime oleū, & recentis Iridis contusæ par pondus iniicito, tunc rursus ad solē aut loco calido diebus viij. macerato, & rursus exprime. Postremo etiā tertio exprime, & aliam Iridē adde, & similiter omnia perage: deinde in duplici vase oleum vnā cū vltimo inspersa Iride aliquamdiu coquito; ad vltimum deinde exprime & repone oleum; cumque videris subsidere ad fundum vasis Iridis puluerem, leuiter cola.

Cū ita permutatur crebrò Iris, oleo singulis vicibus aliquid decedit: ideo boni ponderis ℥ vj. olei accipiantur.

ATTENUAT, resoluit, maturat, & digerit malos humores phlegmaticos pectoris & pulmonis, faciliat sputum & anhelitum, sedat tussim

tussim & frigidos dolores hepatis, splenis & maximè matricis, resoluit dura apostemata, & mollit durities, & confert spasmo, doloribus iuncturarum, aurium, & foetori narium.

Oleum Irinum D. Nicolai Alexandrini. A

℞. Olei sextarios x.
 Aquæ sextarios iiij.
 Radicum Iridis r iiij. ℥ iiij.
 Crini domestici radicis ℥ xv.
 Cyperi viridis radicem ℥ vj.
 Helenij ℥ iiij. Anchusæ ℥ ij.
 Cinnamī Assæ Spicæ ana ℥ j.

Contundantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solem vel loco calido, obstructo vasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici vase coquito, donec aqua cōsumpta fuerit; deinde refrigerare finito; ultimò exprimito, & cum aliquid subsederit, sensim excolato oleum.

Nicolai Alexandrini Latinum & impressum exemplar ita tradit huius olei confectionem.

SEXTARIUS Romanus, mensura est quæ habet olei uncias ponderales xvj. ℥ v. 3 j.

CRINON domesticum, id est, Liliū odoratum album quod in hertis plantatur.

Non

Non ubique habentur radices Cyperi virides, ideo aridas sume, & vino asperge tritas.

HELENII, id est, Enula Campana, videlicet radicum eius.

ANCHUSA, est Buglossa silvestris, rubra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcantham vocant: tinguntur ea radice unguenta, & cera.

B CINNAMVM, idē est quod Cinnamomū.

C ASSAE] ego hic non dulcem Assam, sed foetidam ponere, licet tamen utriusque ꝑ. accipere.

P. C. SCHOL.

A Oleum Irinum Nicol. Alex.] Cū Myrsi descriptio ab hac Nicolai diuersa sit, temerè Fuchsius hanc erroneam dicit.

B Cinnamum.] Cinnamomū inò legendum, aliquantulū nempe differunt, ut alibi diximus.

C Assæ.] Num huius loco Cassia cum Fuchsio legendum sit, videndum. Interea fallitur Cordus, Azam hic foetidam intelligendam putans.

VSRPATVR ad diuturnum catarrhum naribus illitum. Ozenas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta & amygdalis amaris commistum, & auribus iniectum tollit, asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur, hæmorrhoidas veteres inunctum siue colo iniectum educit.

Oleum

Oleum Moschelinum D. Nicolai.

℞. Olei puri ℞ viij.

Aquæ ℞ iij.

Folij [*aut succedanei eius.*]

Spicæ nardi Indicæ

Costi [*odorati & veri.*]

Mastiches ana ℥ iij.

Styracis calamitæ Croci

Myrrhæ Troglodyticæ

Xylocinnamomi [*in eius absentia corticis B*
Cinnamomi.]

Cassæ lignæ veræ ana ℥ j. ℞.

Carpobalsami [*aut succedanei eius.*]

Garyophyllorum Bdellij ana ℥ j.

Moschi ℥ vj.

Nuces Indicas num. iiij.

Confice sic: Folium aut eius succedaneum,
Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum, & Bdel-
lium tere, & per biduum in aqua & oleo ma-
cera: postea coque supra lentum ignem in du-
plici vase usque ad consumptionem aquæ: de-
inde reliqua omnia in tenuissimum pulue-
rem redacta insperge, excolato & expresso
oleo, & iterum macera & coque parumper:
ultimò deinde Moschum admisce, & repone,
&

& patere ut aromata subfidant; ea interdum oleo commisce; agitato vase.

Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleum, apud quem non puri, sed Pynici olei legitur, id est, in Aphrica nati, quod omnium optimum & dulcissimum existit.

Pro Felio sume radicularum Spica Romana,
macis ana ℥ i. β.

Pro Xylocinnamomo sume Cinnamomum electum.

D N V X Indica hic nō significat grandem illam nucē qua ubiq. Indica nux vocatur, sed nucem moschatam. Nam ueteres Græci eam appellant Caryon siue Carydion Indicon, id est, Nucē siue nuculam Indicam: vocatur etiam Caryon Myrsiton, id est, Nux unguentaria siue odorata: & Moschocaryon, hoc est, Moschata nux. quod diligenter in hoc oleo notandum est.

P. C. SCHOL.

A Aquæ] Fuchsius. vinum aquæ loco sumendum satis aptè dicit.

B Xylocinnamomi.] Nicolai Alex. exemplar Xylocinnami legit.

C Moschi ℥ vi.] Nimia certè quantitate: quare forsā ℥ iij. legenda erunt, ut pro duobus ij inferius in unum contractis, u scriptores olim

olim cecutientes legerint.

Nux Indica.] Nuces Indicas hodie passim **D**
 vocatas Fuch. hoc loco intelligendas, non Nuces
 moschatas vulgò appellatas, contendit: eo quòd
 hæc veteribus Græcis cognitas non fuisse cõstet.
 Verùm id ipsum & de Garyophyllis ac Mosche
 banc cõpositionem quoq. ingredientibus dici pos-
 set, quod non perpendit Fuchsius. Posterioris et-
 enim sæculi cõpositionẽ hanc esse, quod omnia
 hic commemorata cognovit, est indubitatum.

Est optimum ad omnem frigiditatẽ cor-
 poris, potissimũ ventriculi, & ad dolorem late-
 ris foris inunctũ. Stranguriosis & colicis, & ad
 omne nervorum vitium illitum optimẽ facit,
 miscetur epithematibus & emplastris quæ ad
 stomachi & renum affectiones asciscuntur.

Oleum Rutæ.

Rutæ recentis incisæ & contusæ quantum
 libuerit, pone in vase vitreo, & affunde olei
 veteris clarissimi sufficientem mensuram, &
 macera ad solem, aut in loco calido aliquo
 diebus quindecim: deinde in duplici vase
 coquito, & abiecta Rutæ recentem iniici-
 to, & iterum quindecim diebus macera-
 to, postea simili modo coquito & exprimi-
 to.

to, & tertio recentem Rutam iniice, mace-
cera quoque & cola.

*Ita debet prapari oleum hoc & aliquo
sequentia.*

E S T calidum, apertium, resolutium,
mitigatium dolorū, calefacit renes, vesicam
matricem, & sedat dolores eorum, & maximè
colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo sol-
clyster: prætereà opitulatur nervis, confert
spasmo, & expellit frigidos humores.

Oleum Anethinum.

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis
Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo quod
Rutaceum oleum.

S E D A T dolores, aperit poros, & resolu-
it vapores & apostemata, tumores & durities
mitigat dolores & rigores febrium, prouocat
somnum & sudorem.

Oleum Chamæmelinum.

Oleum Chamæmelinum siue Chamomillæ
læ, vt vocant, fit ex floribus Chamæmeli, id est
est, Chamomillæ, & oleo veteri claro, vt Ru-
taceum oleum.

V A L E T ad plura; aperit poros, resolu-
it vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas
quali-

qualitates, confert nervis & membris nervosis, & apprimè mitigat dolores.

Oleum Lilinum.

Oleum Lilinum, siue Liliorum, fit ex Liliis albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

SEDA T frigidos dolores pectoris, renum, vesicæ, matricis, & colicam: est enim calidum, resolutivum, mitigat tussim, & efficaciter resoluit, & citius maturat apostemata.

Oleum Narcissinum.

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus albi Narcissi, qui vocatur Germanicè Mertzenblum, vveyshornungsbium, vveyssaprillenblum, vveyss Iosepssstebe: fit vt Rutaceum.

VALET ad emolliendas vulvæ duritias, præclusionesque.

Oleum Ligustrinum Mesuæ.

Oleum Ligustrinum, quod Græci vocant Cyprinum, Arabes autem olenm de Alcanna, fit ex floribus recentibus Ligustri florenti vite, aut paulo post, & oleo veteri clarissimo ad modum Rutacei olei.

Ligustrū est arbuscula salicis fere folio, floribus

X

bus

bus parvis candidis, veluti spumosis & mucosi.
Germanicè vocatur Reynvveyder & Munt
holtz. Nascitur copiosè ad Rhenu, & in Misnia
Hessia, Sueuia, Vvirthēbergenfi agro, Thuringia
& circa Nurembergam, non longè à Kalckreut

PARTES neruofas roborat, & capillos
canitie vindicat.

Oleum Sambucinum.

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sam-
buci, & oleo veteri clarissimo, quèadmodum
etiam oleum Rutaceum.

LENIT, abstergit, & mūdificat cutim, mede-
tur icteritiæ, & maximè hepatis infirmo, oppi-
lato, & plurimū cōfert doloribus iuncturarū

Oleum Iasminum.

Oleum Iasminum, quod Arabes vocant Ia-
feminum & oleum de Zambach, fit ex flori-
bus Iasminis, siue Iaseminis, siue Zambachi, &
oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

Est Iasma flos similis Violis aut Cheyri, ad-
modum odoratus: nascitur in frutice, qui multis
viticulis ascendit pergulas & concamerationes,
vt vitis. Colitur in Italia & Gallia.

OPITVLATUR corporibus quæ calca-
tionem laxationemque desiderant.

Oleum

Oleum Cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex *Leucoiis luteis*, hoc est, ex *Cheyris citrinis* & oleo veteri claro, ut *Rutaceum oleum*.

Cheyri Germanicè dicuntur Gelbe-Viole.

D O L O R E S neruorum aliarumque partium corporis mitigat, eaque quæ in thorace, renibus & vesica sunt, discutit.

Oleum Myrtillorum.

Oleū Myrtillorū fit ex *Myrtillis*, hoc est, baccis veræ *Myrti*, & oleo *omphacino*, hoc est, immaturo, eodem modo quo *Rutaceum*.

Myrtus vera apud nos nō nascitur: neq. habemus semper virides Myrtillos, sed aridos: ut plurimum enim ex Hispania & Italia afferuntur: ideo necesse est ut vino odorato aspergantur.

R E F R I G E R A T & adstringit, ideoq. coeliacis affectibus subuenit, sanat igne ambusta, pustulas erumpentes illitu emendat, attritus hyeme cōcitatos, & intertrigines illitum corrigit. Sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores coërcet.

Oleum Myrtinum.

Oleum Myrtinum fit ex foliis veræ *Myrti* & oleo *Omphacino*, id est, immaturo:

X 2

quem.

quemadmodum oleum Myrtillorum.

Quoniam verò Myrti vera recentia folia apud nos haberi nequeunt, ideò sume folia Myrti vera quæ ex Italia & Narbonensi Gallia & Candia afferuntur dennò, & asperge ea confusa vino veteri odorato, ut dictum est proximè in oleo Myrtillorum.

CEREBRUM, nervos, cor & ventriculolum roborat.

Oleum Mentha.

Oleum Menthae fit ex Mētha crispa sativa & oleo omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Myrtinum aut Rutaceum oleum.

Ventriculum refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauscam, vomitumque reprimi, appetentiam excitat, coctionemq. iuvat.

Oleum Absinthij.

Oleum Absinthij fit ex Absinthio Pontico & oleo omphacino claro, quemadmodum oleum Rutaceum.

Absinthium Ponticū nos non habemus, quod videlicet non adeò calidum est, sed suavioris odoris & valde adstringens. Nostrum verò Absinthium siue rusticum Absinthium calidius est. & nihil ferè adstringit, ut etiam Galenus scri-

scribit: ideo corrigendum est cum Rosis, quæ dimidium eius pondus æquent.

CALEFACIT, ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculum, excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat.

Oleum Rosaceum.

Oleum Rosaceum siue Rosarum fit ex Rosarum rubearum nondum penitus apertarum decerptis foliis & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum oleum.

Refrigerat & adstringit, inflammationibus præsidio est, æstuantem ventriculum restinguit, erosiones intestinorum clysteribus inditum & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

Oleum Violaceum.

Oleum violaceum siue Violarum, fit ex floribus Violarum & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum Rutaceum & Rosaceum.

REFRIGERAT, incandescentibus inflammationum feruoribus vtile est.

Oleum Nenupharis albi.

Hoc oleum fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ albos flores producit; & oleo

X ;

Om-

Omphacino, quemadmodum Violaceum.

N Y M P H A E A T V M oleum vires habet
Violati: refrigerat tamen magis quàm Viola-
tum, & minus quàm Papauerinum: hypnoti-
cis, & intemperaturam partium, vt renum, ca-
lidam sanantibus vtiliter miscetur, & Veneris
tentiginem prohibet genitali inunctum, som-
num etiam conciliat.

Oleum Nenupharis Citrini.

Hoc oleum fit ex luteis, siue Citrinis Nym-
phææ, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo
Omphacino, vt Violaceum oleum.

Oleum Populinum.

Populinum oleum fit primo Vere ex oculis
Populi arboris cōtusis & oleo veteri claro, loto
in aqua calida aliquoties, eodem modo quo
Rutaceum aut Anethinum oleum.

Oleum Populinum D. Nicolai Alexandrini.

℞. Olei ℥ lxxxvj. faciunt

℞ vij. ℥ ij.

Vini ℞ iij.

Gemmarum Populi arboris recentium Veris
initio collectarum ℞ iij.

Gemmæ Populi diutissime terantur, & ma-
cerentur in vino & oleo diebus septē, & quo-
tidie

tidie sæpè agitentur. Octaua deinde die supra lentas prunas in duplici vase coquito, vsque ad consumptionem vini: deinde exprimatur oleum & reponatur.

Porro hoc oleum efficacius erit, si secundo & tertio recentes Populi gemmæ addantur.

G E M M A E Populi, id est, oculi Populi.

Expedit ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis & podagricis, & ubicumque dolor fit.

Oleum Amygdalorum dulcium.

Rx. Amygdala dulcia sicca, non tamen rancida, contundantur minutissimè: postea in sarragine aliquantulum torrefacies affuso aquæ Rosacæ modico, postea prælo exprime.

LENIT asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiem & ficcitatē iuncturarum: est suauis in cibis, & confert hecticis & phthificis; impinguat, auget sperma, sedat tussim & ardorem vrinæ, vesicæ & vuluæ excoriatæ, cum fistula iniectum.

Oleum Amygdalorum amarorum.

Fit hoc Oleum eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.

A P E R I T oppilationes, & discutit ventositates & vapores, sed potissimū medetur surditati,

tati, sibili & dolori aurium, lenit duritiem
neruorum, & delet maculas faciei.

Oleum Balaninum.

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrepfica, id est, Glande vnguentaria, quam Arabes vocant Granum Ben: Fit autem ex tulo affatoque, affusa Rosacea aqua, fructu isto.

Fructus hic ipse Auellanae magnitudinem habet, colorem candicantem, & figuram ut plurimum triangularem. Cortice tenui claudit pinguem quendam nucleum fungosa & alba tunica inuolutum. affertur ex Syria & Arabia.

OLEVM Balaninum repurgat maculas, varos, lentigines, cicatricum nigras, fucos, alium soluit, sed ventriculo aduersatur, dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel
* strepitum, aut sibilum cedunt, cum adipe infusum auxiliatur.

Oleum de Cherua.

Oleum hoc fit ex pingui quodam semine, quod Arabes Cherua, Græci Crotona, Latini Ricinum vocant. Fit autem eodem modo quo oleum Amygdalorum.

Planta quæ semen hoc producit, vocatur à recentioribus Cataputia maior, ab Italis Palma Christi,

*Christi, & Mira solis; à Germanis VVander-
baum, Zekensame, & Heydnisch Sprinckorner.*

PRODEST psoris, vlceribus capitis erum-
pentibus, sedis inflammationibus, vuluis quæ
occlusæ conuersæque strangulant, cicatricibus
fœdis, aurium doloribus, potu aluum ciet, si
quis aquis grauetur, lumbricos eiicit.

Oleum Papaueris.

E semine vtriusq. Papaueris tã albi quàm
nigri exprimitur oleum, eodem modo quo ex
Amygdalis, Balano Myrepfica, & Cherna.

IMPINGVAT, asperam arteriam lenit,
febrium ardorem mitigat, & insomnium.

Oleum Hyoscyami.

Hoc oleum exprimiturex Hyoscyami se-
mine eodem modo quo ex Papauere.

Oleum Spicæ.

Oleum Spicæ fit per destillationem ex ma-
iori Lauendula, quæ Spica vocatur.

Hoc oleum apud nos maioribus sumptibus fit
quàm in Gallia Narbonensi, ideò potius emendũ
est à mercatoribus, qui illud è Gallia afferunt.

Oleum Laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facilè fie-
ri potest: quoniam verò in magna copia affer-

X 5

tur

tur ex Italia & aliunde, ideo facile emitur à Materialistis.

CALIDUM est & apertiuū, mitigat colicam & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, nervorum, iuncturarum, denique omnibus agitudinibus frigidis confert.

Oleum Sesaminum.

* Oleum Sesaminum exprimitur è Sesami semine, eodem modo quo de sem. Papaveris.

Sesamum verum affertur ex Alexandria Egypti Venetias: nunc ex Italia & Hispania, unde ematur sincerum; nam aulteratur oleo Nucum & Papaveris, sed odore & sapore facile apprehenditur à peritis dolus.

OLEUM Sesaminum impinguat, auget sperma, lenit guttur, & omnem asperitatem & duritiem, & clarificat vocem.

Petroleum Flauum.

Petroleum clarum, quoddam est album, quoddam verò aurei coloris: Defluit autem ex petris in Italia & plerisque aliis locis, unde ad nos affertur.

CALFACIT, siccatur, essentia tenuitate in altum penetrat, digerit: proinde materiam omnem

omnem excrementosam consumit, ob id epilepsia, paralyfi, vertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicae, vteri, neruorum, articulorum omnium, & reliquarum partiũ neruosarũ doloribus frigidis maiorem in modum confert.

Petroleum nigrum.

Petroleum nigrũ, siue Naphtha nigra, crassius est quàm flammum: Gignitur autem in agro Brochdorpio & Brunsvicensi in Saxonia.

PETROLEVM, id est, Naphtha.

OPOBALSAMVM SVCCEDANEVM PRETIOSVM EVRICII

Cordi, qui Valerij pater fuit, huic editioni ex Val. Cordi scriptis nunc primum accedens.

R. Iridis Illyricæ

Zarnabi longi [*id est, Zedoaria.*]

Zarnabi rotundi [*id est, Zurumbet.*]

Cubebarum Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Agallochi

Olei Benzoi ana 3 iiii.

Garyophyllorum Nucis moschatæ Macis

Arceutidum [*id est, gran. Iuniperi.*]

Cassiae Cinnamomi Santali citrini

Benzoi

Benzoi ana ℥ ij.

Crocī Afari Maioranæ Schoenanthi

Nardi Celticæ rad. Rosarum rubearum

Cyperī longi &

rotundi ana ℥ j.

Camphoræ ℥ ij.

Moschi ℥ j.

Hæc omnia trita macerentur in vino Rhe-
nано ter sublimato, diebus octo. Postea dili-
gentissimè distillantur in balneo. Distillatæ
deinde aquæ quæ primo exiuerit, cape ℥ vj. in
quibus dissolue optime, candidissimæ, electæ
que Myrrhæ ℥ ij. sic tenuissima & præstantis-
sima pars Myrrhæ, aquæ vitæ miscetur: crassior
verò instar fecis subsidet, quæ nequaquam est
separanda aut excolanda: quoniam in fundo
dimissa ipsum Opobalsamum aliquot annis
conseruabit incorruptum.

V N G V E N T A.

Vnguentum Agrippæ Regis D. Nicolai.

℞. Radicum Bryoniæ ℥ ij.

Radicum Cucumeris asinini ℥ j.

Scyllæ ℥ j. Ireos ℥ iiij.

Radicum Filicis Radicum Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana ℥ ij.

Cera

Ceræ albiſſimæ ℥ xv. Olei albiſſimi ꝑ iij.

Radices omnes iſtæ recentes inciſæ & con-
uſæ macerentur in oleo per dies octo: deinde
coquantur, poſtea exprimantur: & in colato
oleo & expreſſo reſoluatur cera, & fiat vnguen-
tum ſecundum artem.

Apud Nicolaum Alexandrinum inuenitur
idem vnguentum: ſed impreſſi codices nō habent
radices Filicis & Ebuli, & Tribulos.

Oportet omnes iſtas radices & tribulos eſſe
recentes. quōd ſi neceſſitas urgeat, & non ſint
ad manus recentes; tunc ſume ſiccatas, & af-
funde vini optimi ꝑ iij.

TRIBULI aquatici ſive marini, ſunt A
vvaſſernuſſe, & ipſi fructus accipi debent.

P. C. SCHOL.

Tribuli aquatici.] Deſſennius verò contrà, A
nō fructus, ſed radices hic intelligēdas eſſe putat.

HYDROPICIS omnibuſque corporis
œdematis ſuccurrit. Nervorum mala ſanat,
urinam mouet, extrinſecus illitum ventrem
ſubducit, dolorique renum vtile.

Vnguentum Apoſtolorum D. Auicenna.

℞. Terebinthinæ Ceræ albæ Reſinæ
Hammoniæ ana ℥ xiiij.

Ariſto-

Aristolochiæ longæ Thuris masculi
 Bdellij ana ℥ vj.
 Myrrhæ Galbani ana ℥ iij.
 Opopanacis Floris æris ana ℥ i.
 Lithargyrij ℥ ix.
 Olei, si fuerit æstas ℞ ij.
 In hieme autem ℞ iij.

Aceti quantum satis est ad Hammoniacum
 Galbanum, & Opopanacum dissoluenda.
 Confice secundum artem.

*FLOS Æris propriè significat grana qua-
 dam parua, quæ à partibus æris prosiliunt cùm
 refrigerantur affusa aqua partes æris: hoc ta-
 men loco solet poni viride æris.*

Est efficax cōtra vulnera & vlcera difficilia
 & fistulas: cōsumit carnē mortuā, & cōsum-
 ptam restaurat, duram mollit, & plagas sanat.

Vnguentum Aregon D. Nicolai.

℞. Rosmarini Maioranæ
 Radicis Iari Serpylli Rutæ
 Rad. Cucumeris asinini ana ℥ iij. ℞.
 Foliorum Lauri Saluiæ
 Sabinæ ana ℥ iij.
 Pulicariæ maioris
 Pulicariæ minoris ana ℥ iij.

Radi.

VNGVENTA.

335

Radicum Bryoniae ℥ iiij.

Laureolæ ℥ iiij. β.

Nepetæ ℥ iiij.

Mastiches

Olibani ana ℥ j. β.

Pyrethri

Euphorbij ana ℥ j.

Zingiberis

Piperis ana ℥ iiij. β.

Adipis vrsini

Olei Laurini ana ℥ iiij.

Olei moschellini ℥ β. Petrolei clari ℥ j.

Butyri ℥ iiij. Olei communis ℥ v.

Herbæ & radices Maio mense collectæ, in oleo macerentur diebus septem, deinde coquantur additis circa cocturæ medium siccis reliquis: tum colentur.

Colato oleo adice reliqua, &

Ceræ ℥ j. ℥ iiij.

OLEVM debet esse purum & vetus. Porro auctores nō ponunt certā mensurā olei: quidam iubent accipi ℥ v. vel quantum sufficit. Sed tantum h̄rbarum & radicū pondus & quantitas, nō potest bullire in ℥ v. olei: ideo accipe olei ℥ medicinales sex, & affunde aqua etiam aliquot libras, & coque ad consumptionem aqua, & cola.

IARV6

IARV est vera *Serpentaria*, pro qua ponitur *Aron* recenter effossam.

PVLICARIA, id est, *Conyza*, Germanicè vocatur *Duruvurtz*, & est similis *Enula Campana* in foliis, caulibus & floribus; sed multo minor: nascitur humidis locis & exiccatis aquis circa stagna.

LAVREOLA, est planta similis *Thymelea* id est, planta in qua nascitur *Coccum gnidium* eius loco sume radices vel folia *Cocci gnidij*.

OLEVM *Moschellinū* suo loco descriptū est.

P. C. SCHOL.

A Et affunde aquæ.] *Cacutit Cordus* in aqua unguentum coquens, cum in vino coquendum esse ratio dicitur.

Ceterum cum unguentum istud in ponderibus mirè corruptum undique legatur, nos id ipsum, quantum nunc licuit, restituimus.

PRODEST malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium. Item dolori colico, renum, articulorumque.

A *Unguentum Martiatum D. Nicolai.*

R. Cerae albæ ℞ ij.

Olei ℞ viij. [aut quantum sufficit.]

Rosmarini

Folio

Foliorum Lauri ana ℥ viij.
 Rutæ ℥ vij.
 Tamarisci [*foliorum scilicet*] ℥ vj.
 Maioranæ Sabinæ Balsamitæ Saluiæ
 Ocymī Polij [*videlicet veri*]
 Calaminthæ Artemisiæ Enulæ
 Betonica Branca vrsinæ Spargulæ
 Herbæ venti Pimpinellæ Agrimonie
 Absinthij Herbæ paralyfis
 Herbæ sanctæ Mariæ Cimarum Sambuci
 Herbæ crassulæ Millefolij
 Semperuiuæ Chamædryos Centaureæ
 Centumneruæ Fragulæ Tetrabit
 Quinquæfolij ana ℥ iiij. β.
 Radicum Hibisci [*id est, Altheæ.*]
 Cymini Myrthæ ana ℥ iiij.
 Cœni-græci ℥ j. β. Butyri ℥ j. ℥ ij.
 Vrticæ Violarum Papaueris nigri
 Mentha Saracenicæ Mentha crispæ
 Lappathioli Polytrichi Carduncelli
 Matris siluæ Maturellæ Herbæ moschatae
 Leluija Linguae ceruinæ Crispulæ
 Camphoratæ Styracis calamitæ
 Medullæ ceruinæ ana ℥ β.
 Adipis vrsini Adipis gallinacei
 Mastiches Thuris ana ℥ i.
 Y Olei

Olei nardini ℥ ij.

Herbæ omnes in Maio mense colligantur
& incisæ macerentur in vino odorifero per die
septem, octavo deinde die coquantur, donec
ferè consumatur vinum: postea cola, & colatū
ræ expressæ adde oleum, & coque denuo donec
consumatur vinum, mox adde ceram & reli
qua secundum artem.

In hoc unguente multa sunt herbarū nomina
quæ apud probatos Auctores nusquā inueniun
tur, ideoq; aliquis non facillè eas interpretabitur.

NICOLAUS Præpositus loco Maioranæ
habet Esbrium, alij autem habent utrumque.
Sed non constat quid sit Esbrium: alij enim di
cunt Maioranam esse, alij Saluiam: sed utrum
que ingreditur hoc unguentum tam Maiora
næ quàm Saluiæ.

BALSAMITA, id est, Mentha aquatica.

BRANCA ursina vera, quæ Romana co
gnominatur, accipi debet, quæ habet radices lon
gas multas, glutinosas, sapore Tragacanthæ. Et
alio nomine vocatur Acanthus: quæ verò Ger
manicè vocatur Bernclauv, & habet Anethi
umbellam & semina odore & sapore cymicum.
nihil minus est quàm Branca ursina: nam sem
per illam Romanam brancam ursinam intelli
gunt.

gant auctores omnes. est autem urbana & hor-
tensis herba Branca vrsina vera.

SPARGULA, id est, Gallion, Germanicè B
vocatur Ranrizen & Sprengelblum, herba est
denso, numerofo, conferta & odorato flore.

PIMPINELLA, quam Auctor intelligit, C
est Sanguisorba, qua Germanicè Blutssdrofflein
vocatur.

HERBA Paralysis, id est, Himelschuffel.

HERBA sancta Maria, secundum interpre- D
tationem omnium, est Persicaria.

HERBA Crassula pinguis habet folia: nas-
citur in muris & in tectis: Germanicè vocatur
Fetteheerne, siue Donner kraut.

CENTVMNERVIA. i. Plantago maior.

TETRAHIT, id est, herba Iudaica, quam
dicunt esse Orobum.

LYMINARIS maioris, auctor Ioannes Ia-
cobus Manlius, pro Cymino & Myrtha habet
Cimarum Myrthi. Sed nescio quàm bene non
tamen improbo. Porro Nicolai Alexandrini
impressum exemplar habet Cymini & Myr-
tha: sed Nicolaus Prapositus pro Myrtha ha-
bet Myrrham: sed malè.

LAPATHIOLVM, id est, Acetosa.

POLYTRICHON, herba est ex speciebus
Capilli Veneris.

E **MENTHA** *Saracenica*, Germanicè vocatur, *Vnser fravven mintze*. Herba habet folia oblonga, *Lapathio* minora, ut in summis caulibus aureos flores in corymbis dispositos ferè ut *Tanacetum*, tota odoratissima est.

CARDVNCELLVS, id est, herba *Turca*, quã nos in *Germania* vocamus, *Carduum benedictum*.

MATRISILVA, est *Periclymenũ*, Germanicè vocatur *Speklilien*: ascendit arbores ut *Vitis*, flores habet longos, reflexos & odore *Lilij*. *Nuremberga* in hortis colunt, cum alibi proueniat spontè in siluis.

MATVRELLA, id est, *Phu*, id est, *Valeriana maior*. Impressi codices *Nicolai Alexandrini* non habent *Maturellam*, sed *Marathrũ*, id est, *Feniculum*: sed malè.

ALLELVIA, id est, *Trifolium acetosum*: Germanicè *Buchampfer* vocatur.

CRISPULA, quã sit herba, non constat recentioribus: alij enim *Bupthalmũ*, alij herbam *Cancris* sic vocant, nec indicant figuram herbae *Cancris*: ego autem ponerem eius loco *Bupthalmum*, id est, *Cotulam maiorem*, non foetidam.

HERBA MOSCHATA duas habet species: una habet veluti acus longas, & est restrũ *Ciconia*:

nia: altera est parua, & non habet acus; sed est herba admodū parua, folia habet similia concava radici, id est, Holvvurtz, odorem habet in Maio mēse Masci: nascitur umbrosis locis iuxta concavam radicem i. Holvvurtz, in Maio tantū reperitur: Germanicè vocatur Bisemkraut.

CAMPHORATA est Abrotonum, quia odore accedit ad Camphoram: quidā dicunt esse Abrotonum silvestre siue albū, sed perinde est: efficacius tamen est vulgare Abrotonum.

Nicolaus Alexandrinus paulò aliter describit hoc unguentū, ut codices impressi ostendunt, ideoq; & eius modū subiungemus: nam variatur ponderum ordo & quantitas.

ADVERSUS frigida corporis mala, resolutionem coxendicum, nephritim, convulsionem, & id genus alia valet: tumores reprimat, durities emollit, liuoremque cutis emendat.

Vnguentum Martiatum magnum D.
Nicolai Alexandrini.

℞. Cerae albæ ℥ ix. Olei sextarios vj.

Pet. verò Cond. Cera ℥ xij. Olei sextar. lxvi.

Rosmarini Foliorum Lauri ana ℥ ij. β.

Amaraci ℥ ij.

Esbrij Sabinæ Balsamitæ Ocymi

Y 3

Eleli-

Elelisphaci [*id est, Salvia.*]

Polij [*scilicet veri.*]

Calaminthes Arthemisia Enula

Betonica Branca vrsina Herbae veti

Pimpinella Argemonia Absinthij

Herbae paralytis Herbae sanctae Mariae

Cimarum Sambuci Herbae crassulae

Semperuiuae Millefolij Chamædryos

Centaurea Centineruie Fragulae

Quinquefolij Herbae Tetrahit ana ꝑ j. β.

Radicis Euisci Cymini

F Myrthae ana ꝑ j.

Foenigraci ꝑ β. Butyri ꝑ v.

Vrticae Violarum Papaueris rubri

Menthae Saracenicae

Menthae alterius [*id est, Metha crispasatina.*]

Lapathioli Polytrichi Carduncelli

Matris filuae Marathri Herbae moschatae

Alleluia Linguae cervinae Crispulae

Camphoratae Styracis Medullae cervinae

Adipis vrsini Adipis gallinacei ana ꝑ iij.

Thuris ꝑ ij. Olei nardini ꝑ j.

Confice hoc modo: Herbas omnes atque radices in fine Maij mensis vel circa Solstitium aestiuū collectas, minutim incisas in vini sufficienti quantitate macerato per dies septem:

octaua

octaua deinde die coquantur lento igne, donec propemodum vinū sit cōsumptum: postea cola & exprime, & affunde colaturæ expressæ olei prædictos sextarios, & iterum coque, donec omnis aqueus herbarum succus cum vino in vaporem resolutus fuerit: deinde adde Ceram in partes contractā, & paulo post Adipes. Butyrum atque oleum Nardinū; ad vltimum verò Styracem, atque Thus in minutissimum puluerem trita: melius tamen esset, optimam & electam Styracem, & puram instar resinæ alicuius, vnā cum Cera iungere: nam liquescit in oleo. Sed talis Styrax calamita rarissimè ad nos affertur. Porro miror in hoc vnguento, quòd tam parum olei tot herbarum libris addatur: præterea etiam optimæ vires aromaticarum herbarum in coctura euanescent.

Ita se habet vnguenti huius compositio secundū impressum Nicolai Alexandrini exemplar.

SEXTARIUS mensura est Romana, quæ capit mensurales uncias viginti olei: pōdere verò habet olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum vnum. Sex autem sextarij olei, faciunt in hoc vnguento ℞ viij. ℥ iiij.

ESBRIVM quidā dicant esse Maioranam, quidā flores Salvia: ego autē acciperem pro Es-

Y 4 brio

brio *Maiorana* capitula, summitates & flores.

A M A R A C V M, ego hic non credo significare *Matricariam*, cum per eam vocē etiam *Maioranam* possimus intelligere, nam utraq. amarus vocatur: si autem *Maioranam* inieceris, multo odoratius unguentum fiet, quam si *Matricariam* indideris.

HERBA venti, id est, *parietaria* vera.

P I M P I N E L L A, hic non significat Germanicam *Pimpinellam* acri radice, quam Itali vocant *Saxifragiam*; sed eam quam Itali vocant *Sanguisorbiam*, Germani *Blutsstropffley*. Radicem habet rubram, *Tormentilla* sapore, nascitur in pratis una eius species, altera in montibus, & Itali acetariis miscent, habetque cucumeris odorem.

Q V I D A M non habet *Cyminum*, sed *Cimas* *Myrtha*; est autem *Myrtha* idem quod *Myrtus*. Alij habent *Myrrham*, sed male.

P R O *Papauere* rubeo habent alij *Papauer* nigrum: est autem rubrum *Papauer* idem quod agreste *Papauer* in agris nascens.

M A R A T H R Y M, id est, *Foeniculum*. Porro ego hunc locum *Nicolai Alexandrini* credo esse corruptum, & censeo pro *Marathro* legendum esse *Maturellam*, id est, *Phu maius*, cuius radices accipi debent.

Lingua

Lingua cervina est herba quæ hodie improprie Scolopendria nominatur.

P. C. in utrumque vng. Martiatum Schol. Vng. Martiatum.] Fuchsius rectè monet, non A Martianum, sed Martiatum nominandum esse.

Spargula, id est, Gallion.] Spargulam non B Gallion, ut Cordus ait, sed Apparinen esse veterum, Fuchsius ritè sentit.

Pimpinella.] Fuchsius per hanc vocem, non C Sanguisorbam Germanis vocatam, cum Cordus hic intelligendam esse vult; sed acrem herbam Saxifragam à multis appellatam, Germanis Pimpinella nomine cognitam: id quod ea propter, quod adstrictoria sua facultate, huic medicamento Sanguisorbam malè convenire existimet: quasi verò nihil unguentum hoc præterea recipiat quod adstringat atque etiam refrigeret. Itaque cum Italia multo prius (immò forsitan ea fabricatum) quàm Germania unguentum istud cognitum fuerit, Pimpinellam Italorum seu Sanguisorbam Germanorum hic intelligendam esse contendo.

Herba sanctæ Mariæ.] Hanc Persicariam D esse, sinistrè Cordus interpretatur, ut & Fuchsius quoque inquit: sed eam esse quam Saluam Romanam, & Mentham Græcam, seu Costum

hortensem ac Lassulatam. Etruscis vocari constat, Vnser frauven mintz Germanis dictam à Menthā Saracenica diuersam. Quā in re falli nihilominus Fuchsum existimo, Mentham hanc Gratam cum Saracenica confundentem eandemque facientem, cum diuersa sint: ni Germanis aliquibus ita eam appellare placuerit. Italis tamen secus; qui hac in re, ob eas quas superius dixi rationes, hic quoque consulendi atque credendi sunt.

E Mentha Sarac.] Hanc Menthā Saraceniam, vocatam quoque Mentham Romanam, in suis de Stirpiū libris, imagine & scripto depingit doctiss. Rembertus Dodonæus: quā hoc loco intelligenda erit: quicquid Fuchsius ex suo corruptissimo in medium proferat.

F Myrrhæ.] Fuchsius Myrrhā legi manuū nescio quā bene: cum vnguentum Martiatum paruum Nicol. Alexandrini, Myrti folia manifestè recipiat. Cur autem Myrtum aliāquā adstringentia admittat hoc vnguentum, hic dicere non vacat. Tantummodo miror id à tanto viro non esse olfactum, neque perpensum.

Ceterum hocce in vnguento, ut & multi aliis in medicamentis, plura longè aliter exponenda, miscenda, tractanda, atque consicienda sunt.

unt, quàm à Fuchſio & Franciſco Alex. eſt fa-
titatum: ita ut huius Apollo non uſque adeò,
veluti Thraſonice promittit, nebulos ſuis ra-
liis Pharmacopæos vibret, neque irradiet; quin
n denſa adhuc caligine aquè ut priùs verſentur
tque deambulent. Quod tamen illi condonan-
lum foret: eo quòd adoleſcentem ſe fateatur, niſi
iſa illius ætatis inuenilis iudicio vacua, & hinc
emeraria rei Pharmaceutices ſibi inexperta, de
(ut locis mille liquet) ignorata ſcriptione, Apol-
ine abuſus, illiq; iniurius, tantum diuum plus
quo contaminaffet. Sed hac, quoniam veſpe-
aſcit, citis, ſi voles, quadrigis.

Ad frigiditatem & dolorem capitis, pecto-
is & ſtomachi, ad ſcirrhos hepatis & ſplenis,
c ilij dolorem; ad paralyticos, arthriticos,
ſchiadicos, nephriticos, & podagricos, & ad
omnes dolores, ad tumores, durities, ſpasmus
& febrientes, ad ignem vel ſolem inunctum.

Vnguentum Martiatum paruum

D. Nicolai Alexandrini.

| | | |
|-----------------------------|---|--------|
| ℞. Foliorum Lauri | ℥ | ij. |
| Rutæ | ℥ | ij. β. |
| Amaraci [id eſt, Maiorana.] | ℥ | ij. |
| Rofmarini | ℥ | j. β. |

Folio.

Foliorum Myrthæ p j.

Esbrij [*accipe summitates Maiorana pro E*
Balsamitæ (br)

Ocymi ana ℥ vj.

Butyri ℥ v.

Styracis Medullæ ceruinæ Adipis vrsi

* Adipis Gallinacei ana ℥ iiij.

Mastiches ℥ iiij. Thuris ℥ ij.

* Olei nardini ℥ j.

* Olei oliuæ q. f.

Ceræ mundissimæ quantum sufficit.

Ego Olei acciperem p vj.

Cera verò p iiij.

Pet. verò Coud. olei p xxiiij. sumēdas esse dicit

Porro hoc quoque vnguentum conficies v
proximum.

MYRTHA, id est, Myrtus: sunt autem ac-
cipienda folia vera Myrti, quæ ex Italia affe-
runtur, & non eius plantæ quam vocamus Ger-
manicè Heydelber.

P. C. SCHOL.

Petrus verò Coud. olei, &c.] Si omnia hu-
iusce Dispensatorij loca manca erigenda, dubio-
sa expendenda, erronea collapsaq; restituenda
mihi essent, simulq; singulorum rationes scriptis
reddere deberem, in densum volumen præter in-
stitu-

titutum, libellus omnimodè extumesceret. Hic
attamen (priusquam sese negotium subducatur,
ad calcem enim ferè perductus sum) pedem fi-
gere, aliquidq; serij propalare, tempus & locus
opportunos summopere urgere videntur: ut pu-
a, si quid salis Francisco Alex. inesset, atque vel
minimum haberet rerum medicamentariarum
pharmaceuticarumue peritia, experientiaq; (ut
multis numeris absolutum opus se promulgasse
irroganter sibi persuadet) non ita leuiter osci-
anterq; aliorum errores incogitantiasq; etiam
evidentissimas transcriberet, & alioquin pagel-
as multa, tædiosa, atque inani dicacitate reple-
ret, conspurcassetq;. Consulat ille, quæso, vulga-
res tantum uniuersalesq; componendorum mis-
cendorumq; medicamentorum normas, tum à
eipso etiam conscriptas formulas, vel si volet,
etiam minores pharmacopolas hac in re exami-
net; herbarum materialiumue libra, num olei
quæ ad mixtus requirat. Carnis libris duabus
quæ libram coctura sufficere si dixeris, à coci-
uero nonne etiam rideberis? Itaque cum Cor-
nellius hoc in vnguento suo ex censu, olei hic libras
ex tantam, ad herbarum materialiumue libras
duodecim (qua quantitate vix madesce-
rent) accipiendas suasisset, ut adhuc dum eius
in

in contextu sonant verba, ego verò multas
dens olei libras, ex sex viginti quatuor effeci,
necdum sufficere pro tanta materia copia scio
oleo, ut regula & ratio decent, materia
contegenda. Simili insuper cecitate, ut in
unguento omnes dispensatoriorum combinata
vsi sunt, in unguento Martiato magno. Vbi ex
Nicolai Alex. aliorumque exemplaria, olei sex
ria sex admodum macrè legunt; ego sexaginta
sex multo pinguius, necessario reposui; rationem
errorumque causas hic prateriens. Bone Deus,
tantosque Aristarchos mirum est tanta labora
coryza, ut tantum intervallum, nempe à sex
sexaginta sex, à sex insuper ad viginti quatuor
non olfecerint, adeoque evidentes res animadu
tisse neminem. Hinc ut quantum in reliquis
glectum fuerat, colligere facile queas: quod as
rischi prater omnium scio expectationem, ita fr
quentes, locorum non omnium, sed precipuorum
tantum, in hocce tam exiguo enchiridio anima
versorum indicatiui demonstrare possunt. Quod
circa ut ingenuè quid sentiam tandem prof
ram, rei que summam semel explicem; tot inter
hodie dispensatoriorum divulgatores, nullum pa
digni quid Pharmacopœis consarcinasse prota
lisseeque video, nihilque ferè prater aliorum ignavia
tram

transcripsisse, ac in suas chartas transfudisse,
 et egisse errata & ineptias, erratis atque in-
 optis accumulasse comperio: ita ut posteriora
 prioribus etiam nonnunquam deteriora Phar-
 macopœisq; inutiliora esse conspiciantur. Eius-
 modi igitur omphacini rabulismi valeant. Sed
 edem retrahere, receptaq; canere tempestivè,
 istius est: priusquam malè audiens, vilis inep-
 tusq; apothecarius, sordidusq; immò olidus un-
 uentarius, à medico quopiam dispensatorij cor-
 asore appeller, nulla ratione cum seplasiario
 onferendo; à quo corripere reprehendere posse,
 quitas vetitat, piaculumq; putatur. Silere ita-
 ue volo, ne in Lacce labyrinthum aliquem in-
 autus incidens, illudere quempiam existimer.
 Verùm gallus in suo sterquilinio audet.

Ceterum hic obiter etiā referre volo, unguen-
 ū Aregon olei quoq. magna tabescere panuria.

A p podagram frigidam siue calidam, pa-
 lyticos, arthriticos, nephriticos, ischiadicos,
 & ad omnia vitia & dolores nervorum valet.

Vnguentum album.

℞. Cerussæ in aqua rosarum lotæ ℥ xvij.
 Lithargyrij albi loti ℥ j. β.
 Olei Rosati ℞ ij. ℥ iiij.

Cera

Ceræ albiſſimæ ℥ vj. aut circiter.

Confice ſecundum artem.

Quidam alia ratione cōponunt hoc vnguentum: nam alij addunt albumina Ovi, alij non addunt Lithargyrium, alij non Ceram, ſed Tragacanthum admiſcent.

POLLET aduerſus vlcera, ſcabiem & aduſtionem.

Vnguentum Dialthea ſimplex D. Nicolai.

℞. Radicum Altheæ ℥ ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnigræci ana ℥ j.

Olei ℥ iij. Ceræ ℥ j.

Terebinthinæ ℥ ij. Reſinæ ℥ v

Radices & ſemina contuſa macerentur tribus diebus in aquæ ℥ viij. aut quantum ſufficit: quarta die coquantur, donec remittantur crasſam & viſcoſam mucilaginem: eam deinde exprime mox.

℞. Expreſſæ mucilaginis ℥ ij. & coque cum oleo: cū deinde aquoſum illud in mucilagine conſumptum fuerit, ceram addito, & fac ſecundum artem.

EMOLLIENDI vim habet, calefacit, & humectat.

Vnguentum

Vnguentum Dialthea compositū D. Nicolai.

℞. Radicis Altheæ ℥ ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnigræci ana ℥ j.

Scyllæ recentis ℥ vj.

Olei ℥ iij.

Cerae ℥ j.

Terebinthinæ

Gummi Hederæ

Galbani

ana ℥ ij.

Colophonix

Resinæ ana ℥ vj.

Radices & semina cōtusa macerētur tribus *

diebus in ℥ viij. aut sufficienti quāritate aquæ: *

leinde coquantur donec crassescat mucilago.

Postea ℥. Mucilaginis expressæ ℥ ij. & adde reliqua,

ac fiat secundum artem vnguentum.

V A L E T propriè ad dolorem pectoris ex

frigiditate & pleuresi, & super pectus inun-

ctum sanat omnia loca, infrigidata calefacit,

molliciat & humectat.

Vnguentum Egyptiacum D. Mesue.

℞. Æruginis ℥ v. Mellis optimi ℥ xiiij.

Aceti fortis ℥ vij.

Coquātur omnia simul, donec fiat vnguen-

tum spissum, & colore purpureum.

A E R V G O, est viride eris.

Z

C O N-

CONFERT ad vulnera antiqua, fistulas-
que extergit: carnis excreſcentiæ medetur, ve-
hementerque exiccat.

Vnguentum aureum D. Meſua.

℞. Cera citrinæ ℥ vj. Olei boni ℥ ij. β.
Terebinthinæ ℥ ij.
Reſinæ Colophonix ana ℥ j. β.
Thuris Maſiches ana ℥ j. Croci ℥ j.
Confice ſecundum artem.

* VULNERA certò & ſalubriter glutinat.

Vnguentum Citrinum D. Nicolai.

* ℞. Boracis ℥ ij. Camphoræ ℥ j.
Corallij albi ℥ iiij.
* Amenti dulcis ℥ j.
Vmbilici marini Tragacanthæ albiſſimæ
* Amyli ana ℥ iiij.
Cryſtalli Entalij
Dentalij Thuris albiſſimi
* Nitri * Marmoris albi ana ℥ ij.
Gerſæ ſerpentariæ ℥ j. Ceruſſæ ℥ vj.
Axungia porcinæ recentis, non ſalitæ, ſed præ-
paratæ & mundatæ ℥ j. β.
Seni caprini præparati ℥ j. β.
* Adipis gallinacei præparati ℥ j.
Confice ſic: Axungiam porcinam atque
adipem

adipem gallinaceum in vitreato vase liqua-
mul, & impone tepidis adhuc, corticum Citrei
mali satis magnam quantitatem, & maccen-
tur per mensem vnum. Postea eximito corti-
ces, & eliquatis adipibus, vt dictum est: adde
seum caprinum: deinde addantur reliqua
tenuissimè trita: vltimò verò insperge Cam-
phoram subtilissimè tritam.

*Notandum est in hoc unguento non concor-
dare exemplaria in ponderum characteribus.
Nam quidam pro Z, ponunt 3, & econtrà.*

BORAX est nitri species, qua aurum fer-
ruminant Aurifabri.

AMENTVM dulce, est Gypsum quod in ca-
pillatas venas scinditur.

YMBILICI marini, lapilli sunt inuenti
in littore maris, figura Fabarum magnarum:
Germanicè vocantur Merbonen.

DENTALIVM testaceum quiddam est ma-
rinum, Fistula modo longum & concavum, fo-
ris strictum, longitudine digiti parui.

DENTALIVM conchula marina est par-
ua, dentatam rimam habens.

NITRVM est Salpetra.

GERSA Serpentaria, est radix Serpentaria
preparata, vt infra ostendemus.

A Amentum dulce.] *Amiantum veterum esse id, permalè verterunt Fuch. & Francis. Alex. longè enim alia res est. Barbara vocabula, doctis licet veterum vocibus quandoq. sint conformia non ea propter semper re ipsa eadè sunt, nec esse debent, idemq. significare. Qua in re docti etiam viros interdum hallucinatos videmus.*

FACIEI maculas emendat, scabiem in quacumque corporis parte exterit, cicatrice extenuat, ruborem oculorum aufert, & ea quæ aspera sunt, læuigat.

Vnguentum Populeum D. Nicolai.

℞. Oculorū Populi arboris recentium ℞ j. ꝑ.
* Axungia porcina præparata ℞ iij.

Oculi Populi contendantur, & macerentur in Axungia, donec sequentes herbæ colligant æstate.

℞. Foliorum Papaueris agrestis

Foliorum Mandragoræ

Cimarum rubi tenerimarum

Foliorum Hyoscyami

Solani

Vermicularis

Lactucæ

Semperuiuæ maioris

Bardanæ

Violaria

Scatuncelli

ana

℥

iiij.

Herba

Herbæ contundantur & misceantur oculis Populi & Axungię, & dimittantur per dies decem: deinde coquantur supra lentum ignē cum vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum cōsumatur: postea colentur & exprimantur, & expressum vnguentum reponatur.

MANDRAGORAE folia ubique haberi non possunt, ideò duplex pondus foliorum Hyoscyami sumendum est.

VERMICULARIS vera, est Semperuina minor, linguam non mordicans.

BARDANA. i. Lappa maior, cuius radicem precipit esse accipiendā Nicolaus Alexādrinus.

SCATVNCELLVM, re vera est Umbilicus Veneris seu Cymbalaris, & non Krentzkrant. Folia habet pingua cōcaua ut Cymbalū, radicem Aro similem: perquā pauci eam cognoscunt.

CONTRA nimium calorē valet, & temporibus illitum, somnum conciliat.

Vnguentum Fuscum D. Nicolai.

| | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------|
| ℞. Olei | ℞ j. β. | Ceræ nouæ | ℥ iiij. |
| Colophoniæ | | Picis naualis | |
| Sagapeni | ana ℥ ij. | | |
| Mastiches | Galbani | Thuris | |
| Terebinthinæ | ana ℥ j. | | |
| | ℥ 3 | Confice | |

Confice secundum artem vnguentum.
 SANANDI vim habet & extrahendi.

Vnguentum Diapompholygos D. Nicolai Alexandrini.

R. Olei rosacei

Ceræ albæ ana ℥ vj.

Succi fructus vuar lupinæ quantum sufficit.

Cerussæ ℥ ij. Plumbi vsti & lori

Pompholygis Thuris puri ana ℥ j

Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, id est, de Nihilo albo. Nam Pompholyx est Nihili album, id est, Galmes flux.

VVA Lupina, id est, Solanum siue Solatrum.

Ad exiccanda erysipelata, vulnera sordida, & ad sananda tibiaram vlcera, aliorumque locorum concaua vel dissipata, replet, refrigerat & cicatrifat.

Vnguentum Comitissæ D. Gulielmi de Varignana.

R. Corticum medianorum castaneorum

Corticum medianorum glandium

Corticis mediani quercus arboris

Myrtillorum Caudæ equinæ Gallarum

Corticum Fabarum Acinorum Vuarum

Sor.

Sorborum immaturorum siccorum

Mespilorum immaturorum siccatorum

Foliorum Pruni siluestris

Radicum Chelidoniae ana ℥ i. β.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ Plantaginis ℞ viij. aut quantum sufficit, donec media pars consumpta fuerit: deinde in colatura lauentur sequentia, nouem vicibus semper recentem aquam decoctionis affundendo quotiescumque laueris.

℞. Cerae nouæ ℥ viij. β.

Olei Myrtillorum

Olei Mastichini ana ℞ j. β.

Postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem.

℞. Corticis mediani castanearum

Corticis mediani glandium

Corticis mediani quercus arboris

Gallarum ana ℥ j.

Cineris ossium cruris bubuli

Myrtillorum

Acinorum vuarum

Sorborum siccorum ana ℥ β.

Trochiscorum de Charabe ℥ ij.

Confice secundum artem vnguentum.

ACINI hic significant lignea semina que sunt in vis.

SORBA sunt fructus similes Mespylis: Germanicè vocantur Sporling, Sparbirn, Sporepsel & Drecksecke.

PRVNVS silvestris, id est, Schlehendorn.

INCEPTVM abortum prohibet, hæmorrhoidas sistit, ac laxatos renes conciliat.

Vnguentum de Arthanita maius D. Mesua.

R. Succi Arthanitæ ℞ iij.

Succi Cucumeris asinini ℞ j.

Olei Irini ℞ ij. Butyri vaccini ℞ j.

Pulpæ Colocynthidos ℥ iij.

Polypodij ℥ vj. Euphorbij ℥ β.

Arida omnia contundantur & macerentur in succis per dies octo: affuso etiã oleo in vase vitreo diligenter obturato: nona deinde die coquantur lento igne aliquãdiu, postea colentur.

Colaturæ adde

Sagapeni in aceto dissoluti aureos v.

Myrrhæ aureos ij.

Coquantur iterum vsque ad consumptionem succorum: postea adde

Ceræ ℥ v. Fellis taurini aureos v.

Feruant simul donec liqueat cera, postea insperge æquum tenuissimũ puluerem.

R. Scammoneæ

Aloës

Mezereon

Colo-

Colocynthidos ana aureos v.

Euphorbij aureos ij.

Salis gemmæ aureos iij.

Turbith aureos v.

Piperis longi Zingiberis

Chamomillæ ana aureos ij.

Confice secundum artem.

Omnia ferè exemplaria habent Colocynthidos ana aureos v. meus autem manu scriptus Mesua habet aureum j. quod magis probo: sed textum nolui immutare.

ARTHANITA est Cyclamenus; siue Cyclaminus: quidam male vocant Panē porcinum. Si radices eius non adsunt recentes, tunc accipe radices eius siccatas circiter l vj. contendantur & coquantur in aqua, & eliciatur succus, ut ex Glycyrrhiza fit.

ILLITVM stomacho, vomitu purgat: hypogastrio autem inunctum, aluum deiecit, ob id hydropicos mirè iuuat: seorsum excrementum large vacuando, vermes quoque necat, & educit: adhibetur non potentibus fumere medicamentum purgans.

Vnguentum de Arthanita minus D. Mesua.

R. Succī Arthanitæ

Z s

Visco-

Viscositatis quæ exprimitur è radice filicis.

Succi Cathengit ana ℥ ix.

Succi extremitatum Tamarisci ℥ ij.

Oesyti [*id est, Hyssopi humida.*] ℥

Olei Irini ℞ ij.

Bdellij Hammoniacy ana ℥ j. ℞.

Aceti quantum satis est ad Hammoniacum dissoluendum.

Ceræ Citrinæ ℥ vi.

* Corticum radicum Capparis ℥ j. ℞.

Spicæ ℥ iij.

Confice secundum artem vnguentum.

FILIX non significat Polypodium, sed eam herbam quæ Germanicè vocatur Vvaltfaren. & Creutzfaren.

CATHENGIT, significat Ebulum: est autem hoc vocabulū valde corruptum in plurimis exemplaribus.

OESYPVS, id est, Hyssopus humida, & est pinguedo lanarum succidarum.

SPLENIS tumores etiam scirrhosos dissolvit, & strumas.

Vnguentum Potabile.

℞. Butyri recentis sine sale ℞ iij.

Rubæ tinctorum Castorei Spermatidis Ceræ

Tor-

Tormentillæ ana ℥ j.

Bulliāt simul in vino odorifero ad vini consumptionē, ac fiat vnguentū secundū artem.

DATVR ad consolidandum casum ex alto.

Vnguentum Rosatum D. Mesua.

℞. Axungiaē porcine recentis quantitatē quam volueris, & lauetur in aqua calida nonies, & tantundem cum aqua frigida lotionē vltima: deinde teratur cum ea Rosarum rubeorum recentium æquum pondus, & dimittantur marcescere per dies septem: postea coquantur cum facilitate ac percolentur, & rursus tantundem rosarum rubeorum teratur cum ea, & dimittatur per alios dies septem marcescere, atque adfundatur succi rosarū pars dimidia, olei Amygdalini pars sexta, & rursus concoquantur cum facilitate dum succi euanescant. Quod si parum Opij in aqua Rosarum colliquatum inter decoquendum iniicitur, fit efficacius.

P H L E G M O N A S, erysipelata, herpetas sedat: Cephalalgiam calidam & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat.

Vnguentum Pectorale.

℞. Mucilaginis seminis Psyllij

Traga-

Tragacanthæ Gummi arabici Seminis Lin
 * Fœnigræci ana ℥ j.
 Adipis gallinæ Medullæ viruli
 Butyri recentis loti cum aqua violarum ana
 ℥ j. β.
 Olei Violati

Olei Amygdalorum dulcium ana ℥ j.
 Cera albæ quantum sufficit: fiat vnguentum.

Mitigat dolores pectoris & tussim, digerit
 maturat, faciliat sputū, & resoluit pleuresin.

Vnguentum Album Caphuratum.

Rx. Olei Rosati ℞ j. Cera albæ ℥ iiij.
 * Cerussæ ℥ vj.
 * Albi ouorum num. iiij.
 Caphurę dissolutę cū aqua rosarū ex arte ℥ ij.
 Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum Rubrum Caphuratum.

Rx. Olei rosati ℞ j. β.
 Lithargyrii ℥ ij.
 Minij ℥ iiij. Cerussæ ℥ j. β.
 Thutiæ
 Caphuræ ana ℥ iiij.
 Cera ℥ ij. in æstate. Sed in hieme ℥ j.
 Fiat vnguentum in pila plumbea cum pi-
 stillo plumbeo.

CERO.

C E R O T A.

365

Cerotum Infrigidans Galeni ex Mesue.

℞. Cerae albæ ℥ j.

Olei rosati omphacini ℥ iiij.

*

*

Cōquassentur simul cū modico albi & clari aceti. Oleum verò Omphacinū antequā rosas recipiat, sæpius est lauandum cū aqua fontis gelidissima: deinde confice secundum artem.

R E F R I G E R A T febres ardētes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar & spinam dorsi linitum.

Cerotum Santalinum D. Mesue.

℞. Rosarum ℥ xij.

Santali rubei ℥ x.

Santali albi Santali Citrini ana ℥ vj.

Boli armeniaci ℥ vij.

Spodij ℥ iiij. Camphoræ ℥ ij.

Cerae albæ ℥ xxx. Olei Rosati ℥ j.

Confice secundum artem.

O L E V M Rosatum debet fieri ex oleo acerbo, id est, ex immaturis oliuis expresso.

P H L E G M O N A S & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè extinguit.

Cerotum

Cerotum Stomachale Galeni D. Mesua.

℞. Rosarum rubrarum ℥ xx.
 Foliorum Absinthij ℥ xv.
 Mastiches ℥ xx.
 Spicæ nardi Indicæ ℥ x.
 Cerae mundæ ℥ iij.
 Olei Rosacei ℞ j. ℔.

Cera & oleū aliquoties ex aqua Rosarū la-
 uentur, & excolata omni aqua rursus ad len-
 tum ignem resoluantur: deinde alia omnia in
 subtilissimum puluerem trita, inspergantur.

V E N T R I C U L U M & hepar roborat, hor-
 rum dolorem à frigido lenit, appetentiam ex-
 citat, coctionem iuuat.

E M P L A S T R A.

Emplastrum Diachilon simplex D. Mesua.

℞. Mucilaginis Fœnigræci
 Mucilaginis feminis Lini
 Mucilaginis radicum Althææ ana ℞ j.
 Olei veteris clari ℞ iij.
 Lithargyri ℞ j. ℔.

Coquantur secundum artem, & fiat Em-
 plastrum.

D I A C H I L O N vocatur hoc Emplastrum,
 à succis

de succis viscosis siue mucilagibus: hodie corrupto nomine dicunt Diaquilon.

Mucilagine ista debet esse spissa & viscosa: deoq; oportet ut quantitas seminū & radicum sit satis magna, unde fieri debent mucilagine.

SCIRRHOs hepatis, lienis, ventriculi, & liarum partium, ipsas etiam chœradas & dures reliquas emollit & iuuat.

Emplastrum de Mucilagibus seu Diaquilon compositum.

℞. Mucilaginis radicum Altheæ

Mucilaginis seminis Lini

Mucilaginis mediani corticis ulmi

Mucilaginis Fœnigræci ana ℥ iiij.

Olei Chamæmelini Olei Liliorum

Olei Anethini ana ℥ j. ℞.

Hammoniæ Galbani Opopanacis

Sagapeni ana ℥ ℞. Cera nouæ ℥ xv.

Croci ℥ ij. Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi siue lachrymæ resoluatur in vino optimo, & conficiantur secundum artem.

Porrò hicme licet oleorum & Terebinthinæ pondus augere.

VL MVs arbor est quæ vocatur Germanicè Ylmen & Rustern. Cortex eius medius est similis

milis cortici Tilia. Gleich vwie ein bast: ex eo debet fieri mucilago.

CHAMAEMELUM, vulgò vocatur Camomilla.

MATVRAT apostemata, & mollit durities, partim resoluit, & partim digerit, abstergitque saniem ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.

*Emplastrum Diachilon magnum Filij
Zachariae, ex Mesue.*

*℞. Lithargyrij mundi tenuissimè triti, & per
cribrum excussi ℥ xij.*

Olei Irini Olei Chamæmelini

Olei Anethini ana ℥ viij.

Mucilaginis seminis Lini

** Mucilag. rad. Altheæ*

Mucilag. Fœnigræci

Mucilag. Ficum pinguium

Mucilag. Passularum

Succi Ireos Succi Scyllæ Oesypi

** Glutinis Alzanahan ana ℥ xij. β.*

** Terebinthinæ ℥ iij.*

Resinæ Pini

Ceræ citrinæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrum.

S V E-

SVCCVS Scylla, est mucilago ex trita Scylla expressa.

OESYPVS, est pinguedo lanarum succidarum, cuius faciendi modum in ultimo tractatu indicabimus: vulgò vocatur in Pharmacopoliis *Hyssopus humidus*.

GLVTEN Alzanahan vel Alchanach siue Alzanach, est Ichthyocolla, id est, gluten, siue colla piscium: vulgò Hausenblasen.

Hoc Emplastrum debet habere consistentiam & spissitudinem Ceroti.

RESOLVIT & maturat omnes durities & inflammationes.

Emplastrum Diachilon paruum D. Mesuæ.

℞. Lithargyrij ℥ vi.

Olei veteris clari p j.

Mucilag. Psyllij ℥ iiij.

Mucilag. Hyoscyami ℥ j. β.

Mucilag. seminis Lini

Mucilag. radicum Maluæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrum Ceroti alicuius spissitudine.

TVMORES calidos digerit & maturat.

Emplastrum de Meliloto D. Mesuæ.

℞. Meliloti ℥ vi. Florum Chamæmeli

a

Fœni-

Fœnigræci Baccarū Lauri Radicū Altheæ

Absinthij ana ℥ iij.

Seminis Apij * Cordumēni Ireos Cyperi

Spicæ nardi Indicæ Casia lignæ

* Ammios ana ℥ ij. β.

* Sampfuchi [*id est, Maiorana.*] ℥ iij.

Hammoniāci [*id est, Harmoniaci.*] ℥ x.

Styracis calamitæ Bdellij ana ℥ v.

Terebinthinæ ℥ j. β.

Ficuum pinguium num. xij.

* Seni caprini

Resinæ ana ℥ ij. β.

Ceræ ℥ vj. Olei sampfuchini

Olei Spicæ ana quantum sufficit.

Confice Emplastrum sic:

℞. De Meliloto prædicto ℥ v. ℥ ij.

Fœnigræci

Chamæmeli seorsum præter prædicta ana

℥ iiij.

Coquantur in ℞ iiij. aquæ aut quantum sufficit, donec remaneat ℞ j. deinde omnia arida cum reliquis sex drachmis Meliloti subtilissime pulueriscentur. In decoctione autem colata secundum artem dissoluantur Hammoniācum & Bdellium: dissolutis addantur Ficus per se minutissime incisæ & contusæ, & optime

mè misceantur. Postea ad ignem simul lique-
fiant Terebinthina, Seuum caprinum, Cera &
resina Pini, & addatur olei Spicæ Nardi, olei
Sampsuchi ana circiter ℥ v. Cum deinde
omnia sunt mista, addantur pulueres triti, &
fiat secundum artem Emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione confi-
cere ℥ vi. ingredientis Meliloti, vnà cum reli-
quis aridis tundito, & iisdem permisceto: po-
stea ℞. ad decoctionem priuatim Meliloti m.
iiij. & gummi, videlicet Hammoniacum at-
que Bdellium, in vino dissoluto: Olei verò
Sampsuchini atque olei Nardini accipere tum
oportet ana circiter ℥ viij. aut ℥ viij. & confice
secundum artem Emplastrum.

*O L E I Sampsuchini compositio supra tradi-
tur in tractatu de Oleis.*

*Per oleum Spica, Mesue intelligit oleum Spi-
cæ Nardi siue oleum Nardinum. Mesue enim
nusquam meminit Lauandula maioris; qua ho-
die Spica vocatur, neque eius olei quod vocant
oleum Spica.*

E M O L L I T omnem duritiem quæ in ie-
cinore, liene & ventriculo existit. Dolorem
item vehementer sedat, hypochondriaque
tensa sanat.

- * *Emplastrum Triapharmacum Mesuae, cui
sub vnguenti nomine describitur.*

R. Lithargyri subtilissimè triti

Aceti vini ana ℥ j.

Olei veteris ℥ ij.

- * Fiat coctione secundū artem Emplastrum.

FACIT nasci carnem in vulneribus, &
consolidat ea.

Emplastrum Oxycroceum D. Nicolai.

R. Cerae Picis Colophoniae

Croci ana ℥ xij. Terebinthinae

Galbani Hammoniacci Myrrhae

Libani [id est, Thuris.]

Mastiches ana ℥ iiij.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniacum in aceti suffi-
cienti quantitate dissoluantur, & rursus ad
lentorem coquantur, donec acetum in vapo-
rem euauerit: tum addantur liquefactis simul
Cera, Pici, Colophonice & Terebinthine: post-
quam omnia sunt commista, inspergito etiam
Myrrham, Libanum & Mastichen subtilissi-
mè trita: ad vltimum verò etiam Crocum per
se in tenuissimum puluerem redactum. Et fiat
secundum artem Emplastrum.

OXY-

OXYCROCEVM dicitur hoc Emplastrum,
ab ingredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus secundum hunc mo- A
dum tradit Oxycrocei confectionem. Alij autem
qui ex eo hoc Emplastrū scripserunt, tertiā eius
partem describunt: & cum ℥ iij in tres partes
diuidere conarentur, tertiam earū partem sta-
tuerunt ℥ i. ℥ iij. itaque resultat ℥ i. Nam ter-
tria noxem faciunt: quapropter nos maluimus
ex fonte haurire huius Emplastri confectionem.

P. C. SCHOL.

Nicolaus Alexand.] Fuchsf. prauè hic censet A
Cordum in ponderum ratione errare, re non be-
ne ab ipsomet ponderata.

PRODEST omnibus fractis, item partibus
quæ dolore aliquo affliguntur: duritiem deni-
que omnem emollit & discutit.

Emplastrum Apostolicum D. Nicolai.

| | | |
|-------------------|-----|----------|
| ℞. Lithargyrii | ℥ | vj. |
| Ceræ fuluæ | | |
| Colophoniz | ana | ℥ ij. |
| Propoleos | | |
| Visci quercini | ana | ℥ j. |
| Hammoniaci | | |
| Lapis calaminaris | ana | ℥ vj. |
| | a | 3 Masti- |

Mastiches Olibani

* Mumia ana ꝓ iiij.

Terebinthinæ Bdellij Galbani

Myrrhæ Aeris vsti Squamæ æris

Viridis æris Sarcocollæ

Dictamni Cretici Aristolochiæ rotundæ

Opopanacis ana ꝓ iiij.

* Olei veteris quantum satis erit.

Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco
& Opopanace dissoluendis satis fuerit.

Confice secundū artem & diligenter Em-
plastrum.

*Nicolaus olei quantitatem non exprimit, qua-
re nonnulli ꝓ j. iniiciunt.*

*PROPOLIS, non sunt sordes alueariorum
apum, sed est Cera odorata; qua apes ante hie-
mem foramina alueariorum obturant: Germa-
nicè vocatur Bet & Nebenvvax: eam apes col-
ligunt ex oculis Populi & Betula arborum.*

*VISCVM quercinum hic non significat li-
gnum visci quercini, sed gluten illud lentum ex
visco quercino extractū, quo capiuntur aues, hoc
est, der vogelleyrn auß eichenmistell gemacht.*

* *SQUAMA æris est duplex, una est crassa,
qua vocatur Germanicè Kupfferschlach; alte-
ra farina modo tenuis & rufa: hac vocatur
Kessel-*

Kesselbraun, & est efficacior, & hic debet poni.

VALET ad dolores ceruicis potissimum
& renum; sagittas ac furculos corpori in-
fixos extrahit.

*Emplastron Apostolicum D. Nicolai
Alexandrini.*

℞. Lithargyrij 3 xviii.

Ceræ rubræ

Colophonix ana 3 vj.

Propoleos

Visci Quercini ana 3 iij.

Hammoniæ

Lapidis Calaminaris ana 3 ij.

Thuris

Mastiches

Mumiæ ana 3 j. β.

Terebinthinæ Galbani Bdellij Myrrhæ

Chalcu cecaumeni Sarcocollæ

Lepidos chalci Opopanacis

Dictamni Cretici Aristolochiæ

Prasij viridis ana 3 j.

Olei veteris quantum sufficit.

Coquatur Lithargyrium secundū artem in
oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhæ-
reat manibus dum refrigerata tractatur, quod
Græci vocant Amolinthum: deinde omnia

a 4

sigillatim

figillatim secundum artem iniiciantur. Galbanum & Opopanacum in vino dissoluantur, reliqua Gummi terantur & inspergantur. Di-
ctamnus Creticus verus solus vitimò addatur.

Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram: mihi autem videntur sufficere uncia sex.

CHALCVCECAVMENOS, id est, Æs vstum.

LEPIS Chalcu, id est, Squama aris: Germanicè Kupfferschlag vel Kesselbraun: & efficacione est altera eius species qua Kesselbraun vocatur.

PRASIVM viride hic significat Æruginem, id est Viride aris.

Ad omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intimè immerfas, & concavitates earum pura carne replet: repletisque cicatricem absque detrimento inducit: Sagittas, calamos, & similia altiùs membris infixæ, sine dolore extrahit.

Emplastrum Album coctum.

℞. Olei ℥ ij. Cerussæ ℥ j. β.
Cera albæ ℥ iiij.

Coquan-

EMPLASTRA.

377

Coquantur secundū artē, & fiat Emplastrū.

OPITVLATVR excoꝛiatis à calceamen-
tis, scapellatione, vel ab alia causa.

Emplastrū griseum, de Lapide Calaminari.

| | | |
|----------------------------------|---|-------|
| ℞. Lapidis Calaminaris præparati | ℥ | j. |
| Lithargyrii | ℥ | ij. |
| Cerussæ | ℥ | β. |
| Tuthiæ | ℥ | j. |
| Terebinthinæ | ℥ | vj. |
| Ceræ albæ | ℥ | j. β. |
| Seui ceruini | ℥ | ij. |
| Thuris electi | ℥ | v. |
| Mastiches | ℥ | iiij. |
| Myrrhæ | ℥ | ij. |
| Camphoræ | ℥ | j. β. |

Confice secundum artem.

DESICCAT, replet & cicatrifacit vlcera.

Emplastrum viride.

| | |
|------------------|-----------|
| ℞. Ceræ nouæ | Resinæ |
| Terebinthinæ ana | ℥ iiij. |
| Olibani | Mastiches |
| Viridis æris ana | ℥ iiij. |

Confice secundum artem.

Emplastrum Basilicum magnum.

| | | | |
|--------------|------------------|-------|--------------|
| ℞. Ceræ albæ | Resinæ | Pineæ | Seui vaccini |
| Myrrhæ | ana | ℥ j. | |
| Oleum | quantum sufficit | | |

fiat Emplastrum.

VLCEꝝA phlegmone carentia, præsertim
artium neruolarum, terget, & carne implet.

2 5

Empla-

Emplastrum de Crustapanis Montagnan.

℞. Mastiches Menthæ Spodij

Corallij rubri Santali rubri

* Santali albi ana ℥ j.

Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto p
horam mediam ℥ ij.

Olei de Mastiche

Olei Cydoniorum ana ℥ j.

Farinæ hordei, quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

VALET in vomitu puerorum, & his q
cibum retinere non possunt.*Emplastrum de Baccis Lauri D. Mesuæ.*

℞. Thuris Mastiches Myrrhæ ana ℥

Baccarum Lauri ℥ ij.

Cyperi

Costi ana ℥ β.

* Mellis calidi quantum ad cogendum satis e

Si verò triplum Cyperi & stercoris vacc
rum aut caprarum sicci ad pondus omniu
accipiatur, erit efficacius ad hydropisn, & in
flationes discutiendas.Ventriculi, intestinorum, hepatis, renu
vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem
flatibus aut intemperie frigida ortum placa

P R A

379

PRÆPARATIONES
QVORVNDAM
SIMPLICIVM.

Aloën cum Aromatibus abluendi modus.

Aloës purissimæ & cribratæ P j.
Cassia lignæ Spicæ nardi Indicæ
Sari Schœnanthi
Carpobalsami [aut succedanei eius.]
Glybalsami [aut succedanei eius.]
Cinnamomi Ligni aloës Croci Mastiches
Caccæ ana ʒ iiij.

Decoquantur aromata in aquæ quantitate
sufficienti, secundū artem in duplici vase: de-
inde colētur. In colatura dissolue Aloën con-
tinuè agitando: & pone ad solem in vitrea aut
treata patina, donec exiccetur. Oportet au-
tem patinā linteolo puro tectam soli expone-
re, ne aliquīd incidat. Quōd si hieme lauanda
est Aloë, in æstuarium ad fornacem ponatur:
oportet etiam fundo vasis insidentes arenas, &
quæ sunt aliæ sordes, diligenter auferre.

Aloën simplex abluendi modus.

Aloës purissimæ & tritæ P ij.
Aquæ celestis q. s. aut P vj.

Miscan-

Misceantur in patina vitrea, ita ut aqua cō-
 lefacta prius infundatur: deinde subsidere sin-
 to sordes & calculos, & puram pinguemque
 aquam, cui se pura Aloë miscuit, sensim excō-
 lato, & sordes in fundo abiicito; postea colatur
 ram tectam linteolo in sole exiccato.

Laccam abluendi modus.

*Modus abluēdi Laccā, qui passim à scriptoribus traditur, admodū absurdus est: & qui ex-
 primus inuenit aut tradidit, Lacca naturā pe-
 nitūs ignorauit: nam quidquid purū, sincerū &
 efficax est in Lacca, illud aqua miscetur, quā il-
 dicunt abiiciendā esse, & quod remanet, in Tro-
 chiscos formandum, hoc est calculos, ligna &
 sordes. Nos verò rectiūs modum trademus.*

Rx. Aristolochiæ longæ

Schœnanthi ana ℥ ij.

*Decoquantur in aquæ P iij. aut q. s. do-
 nec remaneant P iij.*

Colaturæ insperge

Laccæ integræ P j. ℥ iij.

*Decoquatur Lacca deinde lēto igne, donec
 aqua fiat coloris sanguinei: & quidquid in
 Lacca boni fuerit, dissoluatur, tum per filtrum
 aut laneum pannum cola, & remanentes sordes*

de

es abiice. Excolatam verò & sanguinei coloris aquam lentis prunis in duplici vase vsq. ad mellis spissitudinem coquito, & tepidam massam in Trochiscos fingito. hic itaque verus est modus abluendi Laccam.

Plumbum lauandi modus.

2. Mortarium plumbeum, in eum infunde aquam cælestem, & agitato aliquot horas aquam in mortario, donec aqua colorem acquirat liuidum, & crassescat in modum limi. Limum hunc per linteum exprime, & exiccatum repone.

Limatura ferri, quam Scoriam vocant, preparatio.

2. Limaturam ferri optimi, aut Chalybis, aut Squamam. hoc est, Batituram eius: purgacam ab omnibus immunditiis, hoc modo: Projiciatur in aquam clarissimam, & fricetur manibus, postea sordidam aquam effunde totam, deinde impone limaturam in vitream patinam, & affunde modicum aceri, vt tantum humectetur, nec emineat acetum; postea macera diebus xxx. ultimo tere & repone.

Scam-

Scammoneam preparandi modus.

℞. Scammoneæ optimæ ℥ iiij.

Contere in subtilissimum puluerem, deinde insperge illi olei Violati optimi modicum, fiat massa: deinde excava aliquot Cytonia magna, & in cavitatem eorū impone massam Scammoneæ, & cooperi foramina Cytoniorum: postea assa in fornace cum pane, donec Cytonia perfectè sint assata: deinde exime Scammoneam, & impone sequenti diluto.

℞. Carnium Myrobal. Citrinarum ℥
Succi Cytoniorum ℥ iiij.

Conterantur Myrobalani, & misceantur cum calefacto Cytoniorum succo, & stent in infusione horis xxiiij. deinde leuiter cola: colaturam verò infunde Scammoneæ, & optimè simul misce: vitimò in loco calido exicca, & exiccatam reponere Scammoneam.

Colocynthidis preparatio.

* ℞. Colocynthidis pulpæ ℥ j.

Bdellij

Tragacanthæ ana ℥ xij.

Incidatur Colocynthis minutissimè, Tragacanthum verò & Bdelliū dissolue in aquæ Rosarū q. s. & dissoluta insperge incisè Colocynthidis

idi, & fac Trochiscos, quos in sicco aliquo
co siccabis, exiccatos deinde Trochiscos ite-
m subtilissimè terito, & reforma Trochiscos
hibita Mastiche in oleo Rosaceo dissoluta.

Scilla præparatio.

Scillā magnā recentē, neq. putridā, neq. ge-
lu flaccidā: abiice eius exteriores aridas tu-
nicas: inuolue deinde eam massæ siue pastæ
pistorū vnde panis fit: assato postea in furno
cum panibus, donec panes percocti fuerint:
hinc è furno exime Scillā, & sigillatim om-
nes tunicas derrahe, & funiculo traiectas in
calido loco exiccato, abiicito verò medium
Scillæ cor, ynde germen enasci solet. Porro
Scilla non est incidēda ferreo aliquo cultro,
sed è ligno solido aliquo facta: nam cōtra-
hit à ferro venenosam quandā rubiginem.

Mezerei fol. præparatio.

Foliorū Mezerei quantū libuerit, ea mace-
ra in aceto vini horis xxiiij. postea exiccen-
tur: cum verò yti iis voles, cōtere, & in con-
tundendo abiice eorum venas & nervos.

Esula rad. præparatio.

Esula tam maior quàm minor, præparatur
odem modo quo Mezereon.

Gersam

Gersam Serpentaria faciendi modus.

℞. Radices Serpentariae verę, vel loco eius radicem
dicum Ari, id est, Aronis ꝯ iij. Terantur subtilis-
simè, & affunde eis aquę Rosaceę ꝯ iiii.
deinde exsiccentur ad solem in vitrea patella
na, linteolo tecta. Postea secundo tantum
aquę rosaceę affundito, & simili modo ex-
sicca: tertio eadem aquę Rosaceę quânta
inspergatur, & ultimo siccata in farinã cum
vino odorato in Trochiscos siue orbiculos
finge & repone: ingreditur autem hæc Ge-
sa vnguentum Citrinum, & reliqua quę ad
nitorem cutis conficiuntur.

Spodium præparandi modus.

℞. Eboris in partes secti ꝑ j.

Pone id in nouum & nondum crematum fi-
atile, & crudo operculo tegito, & iuncturam
luto figulino diligenter oblinito: postea in
fornacem figuli mitte, & cremari finito, donec
fistilia percocta sint; deinde exemptum Ebu-
in tenuissimum puluerem terito & cribrato, &
infunde ei in patina vitrea aquę Rosarum ꝑ i
& exicari finito. Deinde secundo terito, &
alias ij. ꝑ aquę Rosaceę affundito, atque si-
militer exicca. Tertio etiam terito, & admisc
aqua

in aqua Rosarum ꝑ j. in qua diligenter dissolu-
ta sint Camphoræ tritæ subtilissimè ꝓ iiii.
Tere omnia in tabula marmorea durissima, &
frange Trochiscos, quos repone in denso vase
liquo, ne expirent. Porro si Ebur habere non
poteris, loco eius sume Cornu ceruinum, & si-
militer præpara: est enim hoc quoque officax
medicamentum ad multa, præsertim contra
venena.

*Ebur crematum, melius est ut operto fictili
fiat: aliàs enim non candidum, sed nigrum fit.*

Pulmonis Vulpini præparatio.

ꝓ. Pulmonem Vulpis recentem, extrahe ex eo
arteriam siue fistulã, & lava in vino odorato
calefacto: mox ollæ impositum, exicca in
tepido furno: deinde exiccatũ repone in lo-
co sicco, & inuolue Absinthio, ne putrescat.

Hepatis Lupini præparatio.

Hepar Lupi eodem modo præparatur quo
pulmo Vulpis.

Sanguinis Hircini præparatio.

Hircum mediocris ætatis domi alito, & per
mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam,
Apium, Petroselinum, Leniticum, & similia:
deinde sanguinem eius, qui ex arteriis fluxit,
excipito.

excipito, & concrefcere finito; atque aqueum illud effunde, grumos verò sanguinis in furno exicca. Mañtandus autem eñt Hircus Veris exitu, id eñt, principio æñtatis cùm Sol Cancrum ingreñtus eñt.

Adipum vel Pinguedinum præparatio.

℞. Adipem vel Pinguedinem cuiuscumque animalis, & laua in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius saniofa aut cruenta appareat: deinde incifa in liqua in duplici vafe, & eliquatam in frigido loco repone fine fale.

Medullarum præparatio.

Medullas ex offibus auferto Autumnii initio, & laua, & liqua in duplici vafe, fecundum modum qui traditus eñt in Adipum five Pinguedinum præparatione.

Oefypum faciendi modus.

℞. Lanæ succidæ, hoc eñt, nondum purgatæ, ex collo, feminibus & femoribus ouis de tota quantitatē fati magnā: infunde ei aquam feruidam, & laua diligēter quoufq. omnem suam pinguedinem in aquam depofuerit. Poñtea expreffam lanam fepone, & aquam illam pinguem & fordidam vafculo aliquo diutiffi.

diutissimè ex alto fundito & refundito, donec spumosa fiat: tum finito spumam subsidere, & collige aquæ innatantem pinguedinem: iterumq. aquam refundito, donec spumet, & subsidentem pinguedinē aufer-to; & rursus refundito, donec non amplius spumet, & nulla concreascit supra aquā pinguedo. Tum collectam pinguedinem iungito, & in aqua lauato, manibusque diducito, donec pura fiat, & aqua clara defluat & albescat, & linguam admota non mordeat: tum reponere in fictili denso, loco frigido. Porro hic Oesypus hodie vocatur corrupto nomine Hysopus humida: sed non bene præparatus habetur in Pharmacopoliis.

Terebinthinam resinam coquendi modus.

℞. Resinæ Terebinthinæ, aut eius loco Laricinam resinam, quam Terebinthinam hodie vocant, ℞ j. affunde ei aquæ ℞ xxiiij. & coque in magno vase, donec odorem amittat & inspissetur, adeo ut refrigerata digitis in puluerem teri queat. Hoc modo vsta resina ingreditur in quædam Vnguenta, Olea, & in Trochiscos Cyphi, qui pertinent ad Mithridatium.

b 2

Acacia

Acacia Succedanea.

Acacia vera apud nos non potest confici: eius autem loco sumunt nostri Pharmacopola totius ferè Europæ, succum Prunorum siluestrium, id est, Schlehen-safft. Sed hæc, quam describemus, propius ad veræ Acaciæ vires accedit.

R. Seminum Thamarindorum
Sumach ana P ij.

Contundantur, & affunde eis aquæ celestis
P viij. ant q. s.

Macera deinde per horas xxiiij. Postea coque donec tertia pars aquæ remaneat: excolatam deinde aquam, cum albuminibus ouorum clarifica & despuma: despumatam deinde iterum coque supra lentas prunas ad spissitudinem iustam, deinde repone, vt Acaciam ex Prunellis siluestribus factam.

P O N D E R V M
R A T I O.

P O N D E R A quibus hodie Medici vtuntur, hæc sunt: Libra, Quartarium vel Quadrans, Vncia, Drachma, Obolus, Scrupulus, Lupinum, Granum, Siliqua, Lens: & hæc quidem à Græcis atque Romanis mutuauerunt.

Præter hæc sunt alia quæ à Barbaris atque Arabi-

Arabibus desumpserunt; qualia sunt, Manipulus, Pugillus, Aureus, Kist, Kirath, & Danic, quorum nominibus Mesuen potissimum uti constat.

Libra itaque, quæ & Pondo etiam dicitur, in duodecim uncias diuiditur. Errant itaque indotati huius ætatis Pharmacopola, qui libram sedecim unciarum, quot sanè mercatoria ac negotiatoria est, in medicamentis conficiendis accipiunt. Ea autem illos uti libra facilè ex quartis colligitur, quibus uncias quatuor assignant, quas si quater sumpseris, sedecim prodibunt uncia. Quartam autem libra partem, Latini Quadrantem nominant sicuti tertiam Trientem, sextam Sextantem. Quadrans itaque, vel (ut nostri loquuntur) quarta, vel Quartarium, pondus existit trium unciarum. Triens verò quatuor, veluti Sextans duarum unciarum.

Porro Vncia octo drachmas cõstituit: denarios septem. Drachma scrupulos tres. Scriptulũ verò, qui Græcis ρεῖσμα dicitur, quasi primum ponderis elementum, nonnulli Scrupulum etiam nominant: habet verò obolos duos. Obolus pendet grana duodecim, qua idcirco viginti quatuor scrupulum constituunt. Nicolai tamẽ scrupulus ex viginti tantum granis constat.

b 3

At &

At & alia pondera Græcorum Medici usurparunt Drachma enim nouem Lupinos pendit Siliqua verò, quæ Græcis $\kappa\epsilon\gamma\acute{\alpha}\tau\omicron\nu$, est dimidium Lupini Siliqua itaq. sex, Lupini tres scrupulum pendunt. Semen autem in Siliqua contentum, non tota Siliqua intelligitur: & id mediocre, non enorme & habitius, neq. strigosum & emaciatum, qualia hordei aut tritici grana usurpamus, quæ hodie minimum pondus faciunt veluti olim grana lentis. Vnum enim Siliqua grarum sex lentis seminibus pondere respondet: quæ si sexies sumptis, in vniuersum triginta sex lentis semina prodibunt, quæ scrupulum constituunt.

Nunc ad ea, quibus Arabes & recentiores vsi sunt, veniemus: inter quæ primum Manipulus nobis occurrit. Sic autem vocant herbarum fasciculum, qui manu deprehendi & complecti potest. Pugillo autem perperam pro pondere vtuntur recentiores, cum sit diminutiuum potius à pugno, qui compressis fit digitis. Aureus, illis pondus vnius drachmæ cum dimidia significat. Danich pondus octo granorum. Kirath verò quatuor.

P. C. SCHOL.

Danich.] Contra Georgij Agricola, aliorumque doctiorum virorum sententias, Cordus Danich pondus granorum sex, & Kirath trium faciebat.

NOTÆ

391

NOTÆ PONDERV M

QVÆ HODIE IN

V S V S V N T.

| | | | |
|------------|---|----------|---------------------------|
| Grani | } | Nota est | Ġ. Ein gren oder ger- |
| Scrumpuli | | | sten kornleinschver. |
| Drachmæ | | | Ʒ. Ein scrupel ein drit- |
| Vnciæ | | | teil eins quintlins. |
| Quadrantis | | | z. Ein quintle, oder gul- |
| Libræ | | | den schver. |
| Semis | | | z. Ein untz, ist Zuvvey |
| Manipuli | | | lot. |
| Pugilli | | | Quart. Ein quart, Ʒ |
| | | | lot. |
| | | | l. Ein pfund. |
| | | | ß. Halb. |
| | | | M. |
| | | | P. |

FINIS eorum qua Valerius Cerdus Nu-
rembergensi Senatui exhibuit.

b 4

VALE

VALERII CORDI

DE EXTRACTIONE, VT

VOCANT, PURGANTIVM MEDIC

*amentorum, & Oleorū destillatione; in gene**re primū: deinde priuatim de Oleo è Chal-**cantho duplici, vno austero (vel acido,) al-**tero dulci: Libellus tripartitus à Conrado**Gesnero primū publicatus, & Val. Cordi an-**notationibus in Dioscoridē ab eodē annexus.*

P A R S P R I M A.

De Extractione. Cap. I.

EXTRAHITVR ex medicamentis So-
lutiuis ipsa qualitas purgans æquē ac
Olea, sed diuersa ratione. Olea propter aëtiā
substantiam ascendunt in destillatione. Solu-
tiua verò facultas, quoniam terrestri corpori
inseparabiliter inhaeret, non ascendit, sed in
fundo relinquitur: excepto vno atque altero,
flore videlicet Pruni siluestris & Persici; quo-
rum aqua destillata alnum subducunt; & h-
quia flores hanc vim obtinent: nam hi melius
à Sōle excoquantur, & subtiliores vires, quæ
facile resolvuntur in vaporem, acquirunt. Sed
quæ

ORDINE
ONE
MEDIC
quæ propriè solutiva vocantur, vt sunt radi-
ces, aut radicum liquores, aut succi, aut corti-
ces, aut semina, omnibus inest tenaciter inhæ-
rens & viscosa qualitas. Ideoque eorum solu-
tiua vis non potest ascendere in destillatione,
sed manet in substantia decoctionis, ex ea eua-
porante quicquid est aqueum. Excogitata au-
tē hæc est extractio pro delicatis & nauseabun-
dis, vt qui magnam solutiuæ dosim non ferunt.

Ellebori nigri extractio. Cap. II.

A. SE
RECIPERE rad. Ellebori nigri recent. libras
iij. lauentur, dum sunt succo præditæ: deinde
incide minutim, ac superinfunde sequentis
decoctionis colaturam:

Succi Buglossi, Borag. ana ꝑ ij. Succi depu-
rentur, & colentur diligentissimè, vt auri cla-
ritatem acquirant, & reponantur ad tempus
conueniens.

Deinde ꝙ. rad. Fœniculi, Cichoreæ, Aspa-
ragi, Petroselini, ana vnc. iij. Fruct. Iuiuba-
rum, Sebesten ana ꝑ ij. Seminum Melonum,
Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, ana ꝑ β. de-
coquantur secundum artem in aquæ ꝑ xij. Co-
laturæ infunde prædictas ꝑ iij. succorum: de-
inde sine ebullire paululum ad ignem. Postea
b s incisas

incisas & contusas radices Ellebori iniice, & coque lento igne paulatim, vsq. dum radice emineat: deinde exprime rursum per filtrum Colaturam coque ad Mellis crassitudinem clemēti igne, adhibita assidua cura ne aduratur. Postea repone, & vttere faciēdo periculum in dosi, à scrup. semisse, vsque ad scrup. vnum

P. C. SCHOL.

Sebesten ana ℥ ij.] *Cum Gesneri editio ana ℥ ij. legat, ego ex industria (si pondere metiendi sunt hi fructus) ex drachmis uncias feci, & legendas esse puto. alioquin cuiusque uncia una ad minus sumi debet. Cumq. semina frigida ponderibus carerent, ego cuiusque ℥ β. adscripsi. Si cui verò hac non placuerint, illi, ut suo more loca hac restituat, permittitur.*

Extractio Rhabarbari. Cap. III.

RHABARB. electi ℥ j. minutim incidatur, & grosso modo teratur: postea ad funde
 * succi depurati Boraginis, Buglossi, ana ℥ ij. maceretur per horas xxiiij. deinde coque ad lentissimum ignem, vsquequo extra emineat Rhabarbarū. Exprime postea fortiter, & expressam decoctionē per laneū colatoriū trans mitte & exprime, vt substantia in colatorio maneat:

eat: colaturā coque ad mellis spissitudinem,
 dictis Zuccari vncijs ij. Quidam in balneo
 Mariæ ad spissitudinem coquūt, ne aduratur,
 quod melius est, quemadmodū etiā in duplici
 vase. Purgando deglutiendū cum gutta olei
 Cinnamomi, aut Anisi mixtū & azymo inuo-
 lutum, faciendo in dosi periculū, à scrup. j. vsq.
 ad scrup. ij. Quidam, quia Rhabarbara per se
 non valde purgant, acuiunt totā extractionem
 ū modico Diacridij optimi, quod nihil nocet.

*De Extractione è Massis Catapo-
 tiorum. Cap. II II.*

Cv m virtutē solutiua ex massis pilularum
 extracturus es, necesse est, vt prius diligenter
 dispensata sit massa, sumpta Aloë purissima, &
 aliis medicamentis electis. Deinde recipe quā-
 tumq. volueris massam, & cōcidas in minutas
 partes, ac macera per octidū in aqua pluuiali,
 succorū Boraginis, Fœniculi ana q. s. Coque
 deinde in vitreo duplici vase per integrum
 diem: deinde exprime per laneū pannū mun-
 tissimū, qui nullos pilos emittat, & iterum in
 balneo vel in duplici vase ad iustam spissitudi-
 nem diligenter coquito, & forma pilulas mi-
 nutas. da scrup. ij. aut circiter vnū. Hoc modo
 extracta

extracta massa est purissima, tenera, & facili
in manu liquefit. Porro reliquorum purgan-
tium medicamentorum vires similiter exprimi
possunt. Sed animaduertendum, quod semper
sint admiscenda in decoctione lenientes &
lubrici succi, quales prædicti sunt: & melius
multo est, ut omnia in duplici vase coquantur.

Aloë quomodo optimè lauetur. Cap. v.

ALOËN optimam, fuluam, pellucidam
facile in manu liquefcentem, cōfringe in par-
tes minutas, & pone in patinam vitream
mundam: & infunde desuper sufficientē quan-
tatem aquæ pluuiæ: dissolue in duplici va-
se omnino, & permitte denuò refrigerari. po-
stea aufer innatantes, si qui sunt, pilos; & sen-
sim quod est liquidissimum ad spissitudinem
in duplici vase coque. Quod verò in fundo
vasis est crassiusculum, in alios vsus seruetur.

PARS SECVNDA.

De destillatione Oleorum. Cap. i.

QVONIAM Aromata quædā, & omnium
umbelliferarū herbarum semina ferè
constant magna ex parte, calida, tenui & aëria
substantia: ideo necesse est, ut aliquid de olea-
ginosa substantia habeant. Nam talem habet
mixtu-

ixturam propemodū omne oleum. At cūm
eum & pinguedo quæ in simplicibus medi-
amentis continentur, duplex sit, quædam
monenda sunt. Naturæ periti, duplex inueni-
unt oleum. In simplicibus medicamentis:
num terrestre, crassum & viscosum, & totali-
ter suo corpori in quo est commixtum: quale
est oleum Nucum, Amygdalarum, Baccarum
auri, Seminum Lini, Hyoscyami, Sinapi,
apaueris, & omnia similia quæ in fructuum
ut seminum nucleis continentur. Hæc autem
omnia propter totalem cum substantia cui in-
est commixtionem inseparabilia sunt, nec
illo modo per destillationem elici possunt.
Quare vi exprimenda sunt è substantia. Alte-
rum tenue, æriumque est, & separabiliter suo
corpori inhæret: & hoc est segregabile. Ascen-
dit enim facilè in destillatione, nec difficulter
suo cui inest corpori decedit. Tale autem est
quod continetur in aromatibus, Carpobalsa-
mo, Cardamomo, Pipere nigro, Cubebis,
Cinnamomo, Garyophyllis, Macere, Nuce-
moschata, Ligno aloës. Item quod continetur
in seminibus umbelliferarum herbarum: qua-
es sunt Ligusticum, Angelica, Angelica mi-
nor, Libanotis nigra, Magistrantia, Pastinaca,
Caros

Caros, Cymīnū, Ammī, quod appellant Ammū: item Apiū, Petroselinū, Gingidiū, Pimpinella, Anisum, Fœniculū, Anethum, &c. Elicuiuntur autē hæc olea per destillationē in arena, ita ut tusa aromata aut semina iniiciantur in cucurbitam vitream luto intestam optimam una autē vice ad L. ij. iniiciantur, & sint tria secundū capacitatem cucurbitæ: infundatur deinde ad vj. lib. aquæ clarissimæ, ac miscetur diligenter. Pone deinde cucurbitā in capellam aptam fornaci, & arena imple, & non attingat fundum, sed intersit arena. Cucurbitæ impone alembicū vitreū, cuius rostrū desinat in stans neam vel ferream fistulam stanno intus & foris illitā: ea fistula transeat in obliquū per vas quod habet in se aquam frigidam, ut inter destillandū egrediens cū oleo liquor refrigeretur, claude iuncturas accuratè, madefacta papyro vel linteo, & suppone exceptoriū. Postea accende ignē lentū, & vide ne nimium surgat & ebulliat in alembicum, quod in cucurbita continetur. Semina enim quædam ut Anisum propter raritatē substantiæ suæ, simulq. viscosum quod habet largiter ebulliūt, ideò nō statim alembicum imponere debemus: sed postea quàm bullas excitari videris, & vaporē sursum ferri

ferri. Quod cum fiet, depone alembicū, & im-
misso bacillo agita, ita resoluetur in vaporem
spuma, quæ postea mediocri igne moderari,
cōpesci & excitari potest. Quo facto, impone
rursus alembicum, & circumlutato satis, ac di-
stillato sine cessatione, donec cōieceris nullum
amplius intus contineri oleū: quod visu & gu-
stu statim percipies: nam cū gustu distillantes
guttæ non amplius respicient iniectionis aromatis
saporē, desistendum est ne aroma fundo cucur-
bitæ inhereat & exuratur. Deinde segrega con-
tentū in distillata aqua oleū optimū, quo po-
tes artificio. Porro notandū est, quædam ex his
oleis aquæ innatare, quædam fundum petere.
Innatant Piperis nigri, & recētis Cardamomi
& Anisi: Fundum petunt, Cinnamomi, Macis
& Garyophyllorum, &c. ut videtur. Aqua Cin-
namomi & Anisi cum destillantur, lacteum
habent colorem, & lacteum hoc paulatim in
oleum conuertitur. Reseruanda autem Cinna-
momi est aqua, præsertim quæ primò exierit.

Natura & vires Oleorum. Cap. II.

FOENICULI & Anisi olea, naturam mi-
rabilem habent: nam in hieme vtrumq. con-
crescit instar butyri, ita ut aspectu imitentur
sperma

sperma Ceti, præsertim Anisi. nam hoc æstat
media concrevit aspectu niveum: reliqua
omnia liquida permanent. Reponuntur opti-
mè in loco frigido & puro, præsertim Carda-
momi & Piperis. Ea enim omnium tenuissi-
mam substantiam habent, adeò vt neglecta
omnino evanescant. Vires autè habent earum
rerum, è quibus extracta sunt; sed multò effi-
caciores. Nam efficacia quæ vni libræ inest, in
paucas drachmas contrahitur. Garyophylli
enim vnciæ xvj. contrahuntur in vnciã vnam
semis, aut duas. Cinnamomi in drachmas duas
semis, aut duas. Piperis, in drachmas duas aut
tres vna semis. Miscentur autè in confectione
gutte x, vel xv, aut xx. librę Zuccari pro delica-
tis: sed infundendum est vltimò cum morsel-
lis, quos facis, vel orbiculis, optimè miscendo.

P A R S T E R T I A.

De Oleo Vitrioli faciendo. Cap. I.

OLEUM vitrioli, quod à quibusdam
Oleum vitæ appellatur, aut melancho-
lia artificialis, nihil aliud est, quàm aluminosa
qualitas, & substãtia ex vitriolo per artem ex-
tracta, modicoque sulfuri mixta. Nam ipsum
vitriolum è quo fit, triplici constat mixtura,
videli-

videlicet multo alumine, modica ærugine, & pauco sulphure. Aluminosa enim aqua in metallis per cris venas & Marchasitam distillans, æruginosam qualitatem acquirit, & sulphuri, quod Marchasitæ inest, mixta paulatim con- crescit, aut industria ad spissitudinem coqui- tur: in distillando autem aluminosus & sul- phureus vapor tantum ascendunt, æruginosa qualitate in fundo retortæ relictæ; quo fit, vt hoc oleum aluminis, & non æruginis saporem habeat. Est autem duplex hoc oleum, nempe austerum & dulce. Austerum duplici constat mixtura, scilicet alumine multo & modico sulphure. Dulce verò simpliciter sulphure con- stat. Nihil enim aliud est, quàm liquidum sul- phur ex austero oleo extractum. Quapropter gustu nequaquam alumen, sed sulphur emula- tur. Faciendū est autē vtrumq. maxima cura & diligētia, adhibitis aptis fornace, retorta, & receptaculo: siquidē aptitudo instrumētorum, t aiūr Chimistę, magistrū parit. Quapropter sequentes Canones diligenter obseruentur.

Electio Vitrioli. Cap. I I.

C V M plurimæ sint Vitrioli species, operæ cetiū est indicare, quæ nam species eius huic
c operi

operi potissimum cōducatur. Et quamuis omne vitriolum hoc oleum reddat, nullum tamē est ex omnibus præstantius caruleo aut viridi: quoniam plurimū fugitiui sulphuris obtinet, quo adiuuatur, vt facilius oleum ascēdat. Notandum etiam melius esse facticio natiuum Vitriolum, & maximē Vngaricum: aut si huius copia non sit, Goslarie. Eligendū præterea est quod magnis racemis constet, & maioribus cubis concretum sit. Quod autem fractum, minutum & puluerulentum est, veluti inutile non est recipiendum, quemadmodum etiam quod Solis vel aëris iniuria candorem & puluerulentam canitiem contraxit.

Coctio Vitrioli. Cap. III.

At quia Vitriolū multū in se habet aquei & excrementici humoris qui oleū diluit, & non nisi longo tēpore & magnis molestiis per distillationem ab oleo separari potest; cōpendiosa est inuenta via, qua breui tēporis intervallo id absumi queat, ne lōga mora artifici fastidium pariat. Recipe igitur prædicti Vitrioli P xij. conice eas in ollam magnam, nouam & optimē crematam: ollam impone fornaci profundæ, supra ardentes prunas: cū liquefierit

& bullire cœperit, spatula agitetur, vt integrum liquefacto misceatur, donec & ipsum liquefiat. Bullire demum finito, vsquequo nullam prorsus bullam amplius excitet, & donec totum densetur. Deinde exemptam è fornace, cum Vitriolo ollam refrigerari permittito, loco neque humido neque ventoso, sed sicco & tepido: postquam refrigeratum fuerit, ex olla eximito, & considera an superficies eius vndique rubescat. nam si rubescit, bonum est signum, & facilius calcinatur, vt iam dicemus.

Calcinatio Vitrioli. Cap. IIII.


EXEMPTVM olla Vitriolum, in minutas partes confringe, & in mortario subtilissimè terere: deinde tertiam aut quartam eius partem in nouam ac bene coctam ollam conice, ac rursus in profundam fornacem, sicut antè, dimitte, & aliquamdiu vrito, donec rufus fiat color. Mox ollā ab igne depone, & moue eam, vt videas notam, an satis calcinatum sit Vitriolum. Nam si in olla fluctuat argentiviuū ut liquefacti plumbi modo, & exilientes bullas eiacularur, satis vsum esse intellige: tunc effunde in magnam & recentem ollam prius calefactam, & effluet quasi sit liquidū, aut ad

c 2

modum

404 VAL. CORD. DE ARTIF.
 modum argenti viui. Quod autem reliquum
 est Vitrioli, similiter sigillatim, vt calcinetur,
 vras. Cum vltum fuerit, commisce rursus op-
 timè in mortario, modeste agitans ne pulue-
 rem excites nares & fauces offensurum. Cum
 hæc omnia executus fueris, Vitriolum in bi-
 lancem ponito, & animaduerte pondus ipsius.
 Nam si vj. lib. id est, medietas superfuerit, be-
 ne omnia facta sunt: sed hæc sufficiant.

De fornace faciunda, Cap. V.



MATERIA quæ di-
 stillanda est, quomodo præ-
 paranda sit, iam indicaui-
 mus. Nuncautem dicere de
 fornace res & ordo postu-
 lat. nam si hæc inepta fue-
 rit, frustra omnia fient. Ex-
 truenda igitur est fornax
 ex lateribus in planum po-
 sitis, quo crassioribus parie-
 tibus ignis facilius & diu-
 tius contineatur: fiet etiam
 quadrata & æqualiter cras-
 sa, intusque habeat prope-
 modum duarum spithama-

rum

rum latitudinem, non tamen omnino, sed dempta tertia parte spithamæ. Extruaturn autem hoc modo: Prima & infima cavitashabeat altitudinem semipedis, cui pertransuersum imponantur ferramenta satis crassa, ut ignitis carbonibus non inflectantur: secunda cavitass, quæ est constituta supra ferream cratem [id est, *vber den rost*] habeat duum pedum altitudinẽ, & ex anteriori parte foramen, per quod carbones iniciantur. hoc incipiat lateris transuersi crassitudine super cratem. Per mediam deinde cavitatem, in ipso medio inspicienti fornacem, per transuersum infigatur ferreus axis, quadrangularis, crassitudine pollicis, qui impositam retortam sustineat. In latere deinde sinistro fornacis, relinquatur meatus, per quem retortæ collum exeratur.

Destillatio Vitrioli. Cap. VI.

POSTQVAM fornacem extruxeris, eligito retortam capacem, aptamque ante omnia, ex vitro Venetiano aut saltem Hessiaco factam, prius vndique luto obductam: in eam coniecito totum Vitriolum, ita ut aliqua pars retortæ relinquatur vacua, quò facilius à Vitriolo spiritus ascēdere queant. Mox transuer-

sam & ferream trabem in fornace optimè luto
 obducito, ei que in medio superposito perlu-
 tatum testæ fragmentum; super id collocabis
 retortam, ne à candente ferro immediatè dis-
 secetur, ita tamen, ut in medio fornacis retorta
 constituta sit; eiusque rostrum extrorsum mo-
 dicè primum promineat, & meatus per quem
 collum suum è fornace exierit, diligentissimè
 luto farciatur atque obstruatur. Postea accipe
 quinque tegulas, & fac ex iis tectū supra for-
 nacem sub quo lateat retorta ad eum modum
 quem depinxi, tectū luto vndique obducatur,
 quatuor pro fumo foraminibus relictis, in
 singulis angulis singulo, ea amplitudine, ut
 crassissimus pollex liberè intromitti & exeri-
 queat. Fac etiā quatuor conos ex luto, quibus
 foramina obstruantur: quo facto, applica re-
 tortæ orificio receptaculū grande ex vitro Ve-
 neriano aut Hesiaco: quo enim maius id ip-
 sum fuerit, eo liberiùs spiritus recipiet: si verò
 parvum fuerit, periculū est ne spirituum copia
 distentū rumpatur: infunde etiam in retortam
 aquę clarissimæ vnc. xviii. aqua enim citò spi-
 ritus ad se rapit, & prohibet ne cōfringatur re-
 ceptaculum. Ita applicatum optimo luto dili-
 gentissimè obstruatur, magna adhibita cura,

ne

ne quicquam in receptaculū incidat, tingitur enim inde in rufum colorē oleū. Cū omnia hæc feceris, dimitte per integrā noctem lutum exiccari: ac si quæ fatiscunt rimæ luto illinantur: manē deinde perlucidum accende ignem, ex puris & magnis carbonibus, aperto vno superius foramine, per quod fumus exeat, augeaturque successiue ignis vsque ad vesperam: quo tempore aperiendum est secundum foramen, & attende diligenter an appareant spiritus, qui è retorta egrediūtur, veluti si quis candidum efflaret fumum: nocte sequente vigili cura cauendū ne ignis remissior fiat, sed acrior, paulatim tamen: ita deinde auctum ignem in vigore teneas, ac altera die tertium aperi foramen, augendo sigillatim ignem, vsquequo etiam retortæ collum candescat. Sequenti secunda nocte auge ignem, & post mediam noctem aperi quartum foramen. Cū ita in summo vigore ignis fuerit constitutus, videbis spiritus egredi, veluti conglomeratas nubes; qui cū cessare voluerint, aperi omnes fornacis aditus, & sine intermissione carbonesingere, vsquequo etiam receptaculum excandescat; studiosè cauendo ne quicquam frigidum aut humidū super retortam aut recepta-

culum iniuria aut casu decidat. Agenda hæc sunt in loco clauso, quò neq. imber, neq. ventus ingrediatur: cōseruandus autem ignis est, donec nulli prorsus spiritus in Vitriolo relinquatur: quod visu facilè percipi potest. Cùm autem nulli amplius egredientur, sine vt per se extinguatur ignis, ac totum opus integrũ cum nocte diẽ quiescere ac refrigerari finito: postea aufer cum contento humore receptaculum; & repone, donec oleum ab aqua segregabis: tum confractam retortam inspice, & vide an caput mortuum nigrum sit: hoc enim signum est perfecti operis. Est autem caput mortuum exustum in retorta Vitriolum.

Segregatio infusæ aquæ. Cap. VII.

QVONIAM in receptaculo continetur vnà cum Vitrioli oleo aqua, segreganda hæc est, vt Vitrioli liquor sincerus reponatur: segregatur autem per distillationem in balneo aut cinere subtili, tutius tamẽ in balneo: quapropter totum humorem qui est in receptaculo, in cucurbitã vitream Venetianam aut Hefsiacam infunde, superponendo Alembicum è simili vitro factum, quæ bene luto circumlinatur: sub balneo deinde accenso igne, paulatim

tim sine aquam exstillare, donec habeas vnc. xvij. illas quas infudisti. Si Vitriolum non bene calcinatum fuerit, plus egredietur: quare vide ut prædictæ xvij. vnciæ sint bonæ mensuræ. Cùm hoc feceris, refrigerari balneum finito, & aquam quæ distillauit abiicito. Quod verò in balneo cucurbitæ in fundo reliquum fuerit, purum est Vitrioli oleum: habet tamen plerumque rufum colorem, idcò secundum sequentem modum rectificandum est, ut clarum fiat.

Rectificatio olei Vitrioli. Cap. VIII.

ACCIPERE retortam Venetianam aut saltem Hessianam, antea luto optimo vestitam: in eam funde quod in cucurbita continetur oleum: retortam pone in minorem fornacem, in capellam quæ pura & lota arena repleatur. Et quemadmodum antea in balneo, ita nunc in arena distilla, paulatim ignem acuendo, ut sigillatim ex intervallo delabantur guttæ. Retortæ orificio applica receptaculum ex eodem vitro factum, ac commissuram optimè luto claude, ne quicquam expiret: cùm deinde totum è retorta distillauerit, refrigerari finito, ac postea aufer, & infunde sensim in purum vitrum

c s

trum

trum Venetianū, quod habeat angustum orificium, ac reponere, ceu præsens in multis morbis remediū. Hoc est austerū Vitrioli oleum, cuius vires & naturam nunc indicabimus, quas excellentes & efficaces habet.

Vires eius. Cap. IX.

M E R V M ac non dilutum, neq. debet neque potest intra corpus sumi: nam propter nimiam acrimoniam, ignis modo interanea, & quicquid attingit, adurit: omnia nēpe corrodit præter vitrū & pingua, veluti ceram, picem, seuum, & liquidorum etiam oleorum colorem immutat, præsertim olei Macis; cui si misceatur, sanguineum reddit colorem. Si etiam in duobus vasculis contineatur quantumvis frigidum, & repente sibi ipsi misceatur, adeo incallescit sua sponte, ut manibus vix teneri queat. In terram effusum bullit, quemadmodum etiā pura melancholia: quare etiā melancholia artificialis appellatur. Quemadmodum enim melancholia, ita etiam hoc oleū ventriculum confortat, & ad cibi appetentiam inuitat ac stimulat, frigidum ventriculum calefacit, phlegma consumit, crassos & viscosos humores incidit, colicæ ac dysentericæ opitulatur.

EXTRACTIONIBVS. 411

etur, sitim ac feruorem interancorum in febribus extinguit: singultum prohibet confestim, & nauseam ac cibi abominationē auertit; sed temperandū est cum aliis quibusdam. Quare exemplum vnum atque alterum ponemus.

Aduersus Calculum.

R. Olei Macis

Olei Terebinthinæ clariss. ana guttas xij.

Aquarum Anisi

Fœniculi ana vnc. ij.

Syr. Liquiritiæ vnc. j.

Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optime, & gusta: si habet acetositatem, quæ dentes non in stuporem trahat, bene est; si non est acetosa portio, instilla adhuc vnam aut alteram guttam, & consule palatum, ac propina secure.

Ad ventriculum debilem.

R. Syr. de Mentha vnc. j.

Aquæ Cinnamomi, vnc. iiij.

Olei Cinnamomi guttas ij.

Olei Vitrioli guttas iiij.

Da secure.

Ad calorem & sitim in febribus.

R. Syr. ex succo aut infusione Violarum vnc. j.

Aquarum

Aquarum Cinnamomi vnc. j.

Hordei vnc. iij.

Olei Vitrioli guttas iij. aut iiij.

Misce, & contrahet puniceum colorem, & saporē vini austeri Cinnamomo aromatizati.

Ex austero quomodo dulce fiat. Cap. x.

ANTEA dictū est, Austerū Vitrioli oleum duplici constare mixtura, videlicet multo alumine, & paucō sulfure. Quare cū ex austero oleo dulce extrahitur, nihil aliud sit quā quod sulfur ab alumine segregetur. Est itaque dulce Vitrioli oleum nihil aliud, quā oleum sulfuris aut ipsum sulfur in liquidam substantiam redactum: & hoc propriē oleum dici potest: est enim pingue vinctuosumque, quemadmodum ipsum sulfur quod in oleo, & non in aqua liquescit. sequitur autem modus segregationis.

Modus segregationis. Cap. xi.

RECIPE vini ardentis acerrimi & ter sublimati vnc. vj. Olei Vitrioli austeri tantundem, misce in Veneto vitro, & pone in cucurbitam parvam, angusto orificio, & optimē luto orificium claude: dimitte ita per integrum mensem aut duos. Deinde effunde in cucurbitam

bitam cui sit immediatè vi ignis agglutina-
tum & annexum alembicum, [hoc est, *ein kolb
mit einen angeschmeltzen helm*] cuius figu-
ram subiiciemus: pone deinde in paruum for-
nacem, ac dimidiā partem eius cinere obrue:
postea applica recipientem, & luto iuncturam
claudere diligenter, & extrahe vnc. vj. vini ar-
dentis, quas infudisti: vt verò tutius hoc fiat,
pone in balneum Mariæ, sic solum vinum abs-
que oleo ascendet. Cum extraxeris autem per
balneum infusas sex vnc. vini ardentis, pone
id quod residuum est, in fornacem, vt arena
mediam cucurbitæ partem attingat, ac nouo
& vacuo recipiente, eoque non magno applica-
to, luto iuncturam diligenter claudere. Accende
deinde lentū ignē, & sensim extrahe omnem
humiditatem quæ relicta est in cucurbita, do-
nec nihil humidi amplius in fundo appareat:
adhibita semper maxima cura & diligentia, vt
ignē ita modereris, ne ebulliat vsq. ad alem-
bici canalem. Nam si hunc ebullitio attigerit,
sedari non potest, nec prohiberi, quin in rece-
ptaculum egrediatur: ac totum oleum corrum-
pat; solet enim facillimè ebullire. Cum au-
tem sensim extraxeris, aufer statim recipien-
tem cum suo humore, tum videbis duo conti-
neri

neri in eo, videlicet aqueum humorem, & oleosum ac pinguem. Segregabis autē vnum ab altero statim, ita vt. nihil aqueum in oleo relinquantur, nam aqua illa perdit oleum. Solet



autem oleū ipsum plerumque aque in-
natare, maximè si
infusum prius vinū
omnino per balneū
extractū fuerit: sed
statim poteris tactu
discernere oleū ab
aqua. Oleum enim
pingue est, aqua
minimè. Segrega-
tum oleum deinde
vsi reserua.

Einen Kolb mit einem angeschmelzen
helm/ der muß man endlich auß der Glasz-
hütten bestellen zu machen / auß zerbroch-
nem Venedischem glas / oder auß Hessi-
schem glas.

Vires eius quod segregatum est. Cap. XII.

V I R E S habet qualcumque & Sulfar, sed
omnia efficacius præstat, quia propter liqui-
ditatem

EXTRACTIONIBVS.

415

ditatem facilius penetrat, & ad actiones pro-
perat, quod sulfur non potest; quia impeditur
à soliditate & spissitudine sua, quo minus pe-
netret. Illud verò amplius potest sulfure hoc
oleum, quòd valeat potenter ad omnes in
corpore putrefactiones, & præcipuè ad pestem.
Ad educendum è pulmone in pleuritide, &
peripneumonia, & difficili tussi, pus, & crassos
viscososque humores: tutò enim absque omni
periculo intra corpus sumitur. Calculum ne-
que in renibus, neque vesica coalescere finit,
exulceratam vesicam sanat. Dosis eius est vna
aut altera guttula, aut tres, in vino modico
temperatæ. Miscetur etiam rotulis & mor-
sellis è saccharo factis. Diligenter autem re-
seruandum est. Nam modicum fit ex lib. j.
austeri olei Vitrioli, & faciliè propter tenui-
tatem partium euanescit.

F I N I S.

Metal

EPI.

EPITAPHIVM VALERII

CORDI, QUI SEPULTVS EST
Romæ in æde D. Mariæ de anima,
regione Parionis.

VALERIO Cordo Simesusio Hesso,
Euricij filio, moribus, ingenio, comitate præ-
stantiss. Doctorum omnium admirationem
merito: Qui naturæ obscuritatem & herba-
rum vires adolescens senibus explicauit: Cum
expleri cognoscendi cupiditate non posset,
perlustrata Germania, Italiam adiit, Venetiam
in honore habitus, & Romam vix ingressus,
subito morbo inter amicorum lachrymas, non
recuperabili studiorum iactura, opt. ætate ex-
tinguitur, anno salut. M. D. XLIII. VII
Calend. Octobr.

Ingenio superest Cordus, mens ipsa recepta est
Calo: quod terra est, maxima Roma tenet.

APPEN-

417
A P P E N D I X E X

SCRIPTIS D. IACOBI
SILVII MEDICI PARISIENSIS,
PRO INSTRUCTIONE PHAR-
MACOPOLARVM.

DE SINGVLORVM MEDI-
CAMENTORVM SIMPLICIVM
exacto delectu, Collectionis tempore le-
gitimo, Repositione commoda, & Dura-
tione eorum.

DE RADICIBVS.

RADICES euellenda sunt, cum medica-
mentosa sunt maximè. Quæ dos omnibus
eodem non inest tempore, sed alio alia ve-
geta magis sunt: quamquam sunt qui putent
omnes radices legendas Autumno, ubi folia de-
ciderunt: alij Veris initio, priusquam in folia aut
caulem erumpant. Omnes tamen integra sunt, si
fieri potest, vellenda. & unaquaque in solo &
calore natura ipsius maximè familiari, bene nu-
trita, bene habita, non præ alimenti copia enor-
mes, neque ob inopiam strigosa, tenues, rugosa:
mox aqua lauanda, & radicalis portione quan-
dam alimenti repetentibus, & stolonibus etiam-
d dum

dum trahentibus, purganda: post (nisi utendi recentibus aliqua inceserit vel commoditas vel necessitas) siccanda, quaedam umbra & vento, ut apij, foeniculi, iridis, & quae alia sunt vel minores, vel sicciores, vel rariores, quarum vires sol ceu ignis promptè dissipet: quaedam contraria dictis sole & vento, vel igni siccantur si calum est nubilum, aut hiems: & saepe versanda, ne mucida aut putrida fiant: ut bryonia, gentiana, mandragora, rhei pontici. Si verò siccatis cito est opus, patella ignita impositas saepe versando siccabis. Quaedam item integra siccantur, ut gentiana; alia in taleolas dissecta, ut iris; alia lignosa matrice (sic enim cor Plantarum Gaza ex Theophrasto vocat) adempta, ut foeniculi, petroselini, apij. Deinde reponuntur loco non insolato, non infumato, non humido, non puluerulento, sed sublimi puro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridiem spectante, praesertim quando haec planta quaedam adhuc humidiores requirunt, modo non flectat auster. Eadem quamdiu vegeta adhuc sunt seruanda, parua scilicet ac tenues & rare, ut asari, asparagi anno tantum, quamuis elleborus uterq. etiam triennio seruari possit, ut magna & crassa essentia praeclata, bryonia, rheon Ponticum, aristolechia, gentiana. Haec autem

autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio commoda, & duratio, non in radicibus solis observanda sunt, sed etiam in aliis plantarum partibus, atq. adeò quibusdam animalium aliquorum partibus, ut sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propterea Chamapityn, chamædryn, thlaspi, centaurium, polion, hypericum, aliaq. florentia capiebat Galenus, theriacen vel aliud medicamentum compositurus, non sole æstivo siccata, neq. dum fructus eorū adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem cōtinua speculatione cognoscendū, quando fructus sunt futuri, quando eduntur, quando augentur, quando denique vigent. Quo tempore potissimum eos cōmodè decerpas, & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis urantur, neque humiditate à tecto vel muris madesiant. Ob id domo non vult subterraneas eos reponi, nec aliis vicina, neque sub tegulis, sed horum media, quæ ostia meridiem spectantia habeat, prope qua tamen medicamenta ne reponas. Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium, & accusandi tum mercatores tum herbarij, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tempus carpūt, & in vrbes conferunt. In quibusdam & astrorum obser-

d 2 ustio

uatio valere putatur. Paonia enim radix a
epilepsiam legenda decreſcēte Luna quibusdam
videtur, & Alyſſon ſub aſtu Canicula vult legi
Galenus, ut Aſchryon caneros fluuiatiles cap
contra rabiem, unde eſt herba nomen, tamquam
vis quadam illis cōtra rabiem à ſidere accedat
rabiem canibus aſſerente. Plantas item calidas
ex calidis regionibus, & ex harum editis & ſic
cis locis, ut Creta montibus, præfert Galenus.

DE HERBIS.

QUAE prius in radicibus dicta ſunt de colle
ctione, repositione, duratione illarum, a
herbas etiam transferri poſſunt, niſi quod his fe
rè recentibus utimur quibusdā omnino, ut por
tulaca, lactuca, bugloſſa, atriplice, beta, braſſica
acantho, naſturtio, helxine, mercuriali, viol
nigra, intubo, fumaria, hyoſcyamo, mādragora
& aliis permultis. Quibusdam verò recentibu
utimur, quādo his mitioribus opus eſt, ut ruta
mentha, abſinthium, abrotonum, recentes minu
calent ob miſtam humiditatē excrementoſan
ſiccata verò calidiores ſentiuntur, & fumari
recens minus aluum ſubducit magis ſicca.

Colliguntur ferè cū floribus herba, aut ſem
nibus, ſic benediſtus carduus acanthiū putatu
centaurium paruum, calaminthe, chamaedry
chama

chamapitys, daucus, fumaria, maiorana, pelium, pulegium, origanum, serpyllum, thymus: aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore, praesertim quae cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si quae scapo sunt crassiore, aut folio humidior, & ob id apto putrere. Vbi probe sunt siccata, reponuntur uti radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutanda.

DE FLORIBVS.

Flores ut plantarum partes reliqua legantur, cum maximè vigent, ut capparis in gemma, rosa ex pando coepta, reliqui ferè aperti. Sed haud ita pridem & ex quibus vis nondum exhalauit, siccantur sole magis minus, pro varia ipsorum naturæ: quidam siccandos volunt, donec ex ponderibus decem unicum supersit. Reponuntur, ut alia: quotannis mutetur, quamuis schœnanthos etiam decennium efficax seruari possit: chamamelum item diu vegetum est ob sortem partium suarum mistionem.

Flores & omnia quæ iucundū odorem efflant, arculis tiliaceis vullo situ obductis reponuntur.

DE SEMINIBVS.

Legenda sunt semina cum sunt matura, & fructus quibus includuntur maturi. Semi-

na verò quotannis mutare præstiterit, etiam si pleraque diutius seruari possint.

Ut aptè perennet, charta aut foliis aptè involuantur.

DE FRUCTIBVS.

Fructus ut maturi decerpantur necesse est.

DE CORTICIBVS.

Corticibus ut recondantur eximere cõuenit, cum herba suis foliis exuuntur. siccantur etiã expurgata inibi, locis asperginẽ nõ redolẽtibus, sed cū luto aut puluere sunt obfita, aqua elui debẽt.

DE SVCCIS.

XΥΛΙΣ, id est, succus ex plantis totis vel plantarũ partibus concisis & tuis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua interdũ aspersa aut vino, aut liquore alio, vel recens vsurpatur, vel vase aut loculamento aliquo reponitur, hicq; vel liquidus vel siccus. Liquidus item aut per se seruatur, ut vinum, acetum: aut misto sale, ut omphacium, oleum: aut superfuso phiala oleo, ut succus rosarum, granatorum, limonum, cydoniorum, sambuci, ebuli, & similium: aut sole, vetustateve, aut igni per se siccatur, ut succus glycyrrhizæ, opos Cyrenaicus, scammonium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem facta sole vel igni, ut in plurimi

ritus syrupis audies. Qui verò succi sine melle aut saccharo reponuntur, plurimū corrumpuntur, nisi igne diutius cocti, aut sole æstivo usque ad mediocrem crassitiem siccati fuerint. Idem temporis spatio sicciores evadunt, pluribusq; annis servati, eò siccitatis veniunt, ut balauisticis similiter lenigari possint, quales sunt succus hypocistidis, vna acerbæ, glycyrrhizæ, centaurij, & alij propè omnes. qui verò ex his lentorem quandam natura habent, dilatantur magis quàm lenigentur, nisi siccioribus multis mista horum parva portio, Portulacæ, semperuini, cotyledonis, & aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi, quare cum omphacio probè trita herba exprimitur, alij tritas igni lento calefaciunt: alij tritas loco frigido, ut cella vinaria, vimineo vasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt. ῥόδος etiam, id est, succus, sæpe cum humore aliquo extractus ex partibus plantarū, ut semine psyllij cydoniorum, lini, fænograci, lentorem aut velut cremorem & mucorē significat, unde dictum est emplastrū διὰ ῥόδου, id est, de glutinosiss quibusdam succis, diversum tamē ab eo quod est de mucilaginibus, ut in compositis leges.

Liquidis medicaminibus densior materia ar-

d 4

gentea,

gentea, vitrea aut cornea conuenit. Fiſtilis etiam, ſi modo rara non ſit, accommodatur, & lignea, præſertim è buxo: ſed ænea vaſa oculariis medicamentis liquidisq; &c.

DE LACHRYMIS.

△ *A'nguon*, id eſt, lachryma, ſeu humor ex plāta ſponte ſua defluens ſiue in gummi aquea res concreſcat ſiue in reſinā liqueſcat, oleagina eius ſubſtantia Arborum partibus, præſertim truncis à germinatu incifis & ſcarificatis, etiam reſinas elicimus. Accenſis autem arboribus reſinoſis, ut pinu, picea, larice, terebintho, teda, cedro, ex reſinoſa ſubſtantia igni parum ſiccata fit pix liquida, cui quod ſupernatat, piſſantbum tenui conſiſtentia & facultate eſt astringente, ob id canitiem ſine vlla noxa tardat, ut piſſellaum, id eſt, pix liquida, cum oleo miſta. Gale- nus lib 1. comp. ph. part. Piſſaſphaltus autē eſt Mumia Serapionis. Si pix iterum coctione ſiccetur, Palimpiffa dicitur, ſicca adeo ut pulueriſari poſſit, qualis eſt Græca, etiā Colophonia, & Hiſpana, & Gallica dicta *πίοςα βεγόνα*, lib 8. comp ph. part. & Dioſcoridi probatur & Lycia. Eſt etiam Dioſcoridi ex iſdem arboribus reſina liquida & ſicca. Reſina omnis calefacit, ſiccatur, tenuius eſt partium, magis minus.

DE

DE ANIMALIBVS ET
EORVM PARTIBVS.

S Anguis hirci quadrimi, bene habitus, aliquamdiu nutriti vino albo, fœniculo, seseli, auro, & ceteris calculum frangentibus, Augusto mense iugulati, medius effluens (nam primus enarior, postremus crassior putatur) vase vitreo receptus, tectus linteo raro, Sole siccatus, etiam cum myrrha, foliis Lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur, Tralliano, Auienna & ceteris practicois.

Adipem & medullam stanneis vasis recondi conuenit.

Medulla loco sicco & edito, & Septentrionem spectanti reponitur, cum foliis lauri siccis ne putrescant, aut situm ducant, qua iniuria in locis humidis Meridiem spectantibus eis accidit: sunt qui reponant bifariam, adipum modo.

ADVLTERRA SIMPLI-
CIVM MEDICAMENTORVM.

A Cacia succo & carne prunorum agrestium representatur dolo parum malo, cum utraque viribus conueniant.

Aloës crassa partes & impura lotionem separata aqua

d s

ta aqua

et aqua marina & croco Mesua adulterantur, sed croci odor dolū aperit. Alij acacia, alij gummi iminiscendo adulterant, tuncq; minus est ad minima friabilis, & odor & sapor est alius.

Ambra, pulvere ligni aloës, styracis, ladani, ambra largioris moscho in aqua rosarū soluto. Sed hac manuū attritu multo, ceu cera, mollescit, vera non mollescit. Platearius.

Amomum, planta amemide simili, sed inodora, ex Armenia delata, seminis dissimilitudo vitium detegit.

Asphaltum, id est, bitumen pice mistū Dioscoridi, licet adulterari non posse, ut neque carpobalsamum, neque xylobalsamum, scribit Gal. lib. i. antid.

Ærugo multis modis adulteratur Dioscoridi: sed hodie sincerior videtur, si adulteratum suspiceris, notas ex eo repete.

Æris flos limata æris scobe.

Bdelliū adulteratur gūmi, sed ita vitiatum minus est amarū, & suffitu odoratū, Dioscorid.

Balsamum, id est, opobalsamum, vitiatum terbinthina paucō opobalsamo mista, vel sine hoc croco orientali, & succo foliorum citri, vel oleo nardino. De quo in opobalsamo plura leges.

Bitumē adulteratur pice, ut in Asphalta dixi.

Casto-

Castorium variè adulteratur; vitium autem facileprehendes attentus notis quas in vero & laudatiore Castorio diximus in partibus animalis medicamentosis.

Costus, radice prædura Helenij Comagenij, sed odor Helenij minus vehemens, neque caput tentans, & sapor minus acer, quàm costi.

Crocus misto crocomagmate tuso, flore croci, vel oleo & pulvere bersilij, ut vocant; qui fri-cando dolum detegit, vel sæpe sublitu & lithar-gyro vel plumbagine ad pondus augendum, utrumque minus odore vegetum est, præterea hoc est puluerulentum. Adulterati quoque croci color & odor celeriter euanescent, veri diu per-manent. Galenus primo Antidot.

Cassia odorata, corticibus capparis & radicis tamaricis mistis.

Caphura, gummi Iuniperi, sed hoc est minus odorum & durius, illa est friabilis, & odore va-lentiore. Platearius.

Garyophylli vetustate examinati, vino pul-uerem optimorum Garyophyllorū habente irri-gantur, siccantur, foris solum Garyophyllos olent, & vix ad dies decem molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra Palæstina oppido affertur: auctor

auctor est Diosc. adulterari tamen non posse affirmat Gal. I. Antidot.

Euphorbiū lacte hadino, sarcocolla & glutini. mistione cōspurcatur, experiētia veri est difficilis: nā euphorbiū leui gustu os diu accendit, ita ut omnia gustata euphorbiū resipiant. Idem iniectum igni odorem edit fastidiendum, Dioscor.

Ebur vstum (quod cur spodiū vocet vulgus, non video) ossibus canis vstis vel albo marmore vsto, id verò gravitate proditur, illud forma ossis, & linearum desiderio

Galbanum mutatur resina, farina fabarum excorticatarum, hammoniaco, Dioscorid. ex cuius notis sincerum deprehendes.

Galanga acris cypero Europæo insipido, vel falso, vel bistorta, ut vocant, radice austera: si verò dictæ radices aceto puluerem vera galanga & piperis habente biduū macerentur, foris solum galangam referant. Platearius.

Ladaniū, stercore caprino & putuere nigro, id autem tractando non mollescit, sed in puluerem abit, modo ladani vetustate exucti. Viribus prætereā & odore ladani caret, quod sic vitiatū est.

Laser omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: sed maleficiū deprehenditur colore, odore, sapore, dilutione, Diosc.

Lycium

Lycium quibusdā *amurca*, *succo absinthij*, *felle tauri*: sed id à viribus *sinceri* multum recessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram à falsa possit secernere sic & *Lycium*, *Indicum*, & plurima alia, ut verorum nota à falsorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur, amarum enim est: alij semen *fœniculæ* aut *seseleos* admiscetes *Ligusticum* dolo vitiant.

Lentiscina resina, id est, *mastiche*, *thuris* & resina *pinæ* *nucis* *mistura*.

Moschus pelliculis incisis puluere carnis *columbinæ* siccata, sanguine *badino*, & pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquamdiu sit grauius, est legitimum; si pristinum pondus seruat, *suppositicium*.

Manna Arabū, *saccharo* & folliculis *sennæ*.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua *myrrha* maduerit, *Dioscorid.*

Nardus adulteratur *stimmi*, seu *stibio* cum aqua aut *palmeo* vino *inspissationis* ponderisq; causa *inspirato*.

Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, quæ *birculus* ab odoris grauitate vocatur: sed herba candidior, sine capliculo, *minori-*

poribus foliis, radice nec amara nec odorata, uera nardus est.

Opi omnes adulterantur addito sagapeno, ante quā inarescant, colore, odore, sapore dolus deprehenditur: & quia cum aqua vel salina non mox solvuntur adulterata, adulterantur etiam fursure & farina, precipuē nardias, id est, quod ex caule defluit, quia dilutior: & ias verò, i. quod ex radice perlucidior & purior. Quamvis enim radice incisa aut caule quod effluit crassum & lentum ὀπός, id est, liquor dicitur, lib. 6. simpl.

Opium, semine lactuce agrestis.

Opopanax, hammoniaco aut cera, tunc in aqua si digitis teratur, non solvitur, nec lateſcit uti sincerum. Diosc.

Os ex corde cervi cartilaginosum, simili ex maiorum animalium corde.

Opobalsamum tam variè adulterāt & astute, ut eius adulteria etiam exercitatissimos fallant. Hac verò adulteria inuulganda nō cenſeo ne maligni etiam vitient à nobis edocti. Vitia-
tur mīſta unguento terebinthino, lentiscino, cypriao, balanino, susino, metopio, melle, vel Cypria cera liquida: sed maleficio facile deprehenditur. Nam verus liquor in vestem lanceam fusus, maculam non facit, & post lotionem no-
tam

tam non relinquit, cum vitiatus inhareat. Ad-
hac merus, lac si instillatur, coagulat, & in
aqua aut lacte celerrimè liquatur, & colore la-
ctescit. Alias quasdam notas apud eundem &
Simeonem, si libet, legeris potius, quàm apud
barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, profunda
hominum ignorantia, & magno mortalium in-
commodo.

Piper longū fraudulenter preparatū, est her-
ba quadam flaua, quæ à Xene assertur, aspectu
quidem, non autē gustu macropiperi similis: hac
autem aqua irrigata soluitur, natium macro-
piper insolubile permanet, Gal. lib. i. Antidoto-
rum. Piper longum verū ex Barbaria assertur:
adulteratum verò duplex est; alterum, quod in
Alexandria maximè conficitur, alterum herba
cuiusdam germen. Quod facticiū est, si per diem
totum in humore maceretur, illico liquatur ac
soluitur, lib. iij sanit. tuend. Illud fortè ex massa
subacta aqua, in qua dissolutum aut macera-
tum sit piper, & in formas effictas coniecta, post
siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine &
velut nucamento betula & coryli.

Pastilli theriaci, ex radice pentaphylli, id est,
tormentilla Venetiis male componuntur, non ex
viperarum carne, Hermolaus in Coroll. Musa.

Phu,

Phu, radice rusci admista vitiatur, sed malificium facile deprehenditur; quia hac dura es frangi contumax, & sine ulla odoris gratia.

Pompholyx, taurino glutine, ouillo vel marino pulmone, aut grossis vel quibusdā aliis cremati.

Pentapetalon, *Pentaphyllon*, *Pelium*, nihil simile habet in plantis, ob id non adulteratur.

Rha-Ponticum, radice centaurij magni. *Rhabbarum* examinatur maceratū aqua diebus quinque, postea siccatum idem minus in crocum tingit, intus nigricat, varietatem in fracturā amisit, densius est, astringit magis: ex aqua vero illa siccata trochisci fiunt regibus.

Rhōn cum viget ac integrum est, valente astringit, densum est ac contractū tota substantia, tamen celeriter perforatur. Incolae regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquam trahunt. deinde rheum siccatum, tamquam integrum sit, nec coctum, transmittunt: sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam astringentem retinens. Quantū aliis notis rheon à rhabbaro differat, alibi diximus.

Sagapenum, succo laseris & galbano, *Dioscoridum* id non liquefit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissoluitur, Galen. lib. 1. Antid.

Sarcocolla puluerizata est suspecta adulteris.

Dioscoridum

Diosc. à quouis puluere misto, integra eligatur.

Styrax modis multis Dioscoridi adulteratur, sed dolus facile deprehenditur notis ab eo dictis.

Santala lignis aliis, rubrum bexfilio inodoro, flauum & album ligno cedrino odoratiore linguam calefaciente.

Scammonium lacte tithymali & sarcocolla, vel erui farina, tunc linguam minus valenter pungit & mordet.

Saccharum, intus faculentum aut spuma succi canna eius auctum, tunc in ore vanescit, & fractum nigricat.

Turbith gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito, verum autem si frangitur, gummosum est intus.

Tamar-Indi prunis adulterati non splendent, humidiores sunt, sapore & nucleo prunorum multum à semine Tamar-Indorum diuerso.

Thus, pini resina & gummi, suffitum autem gummi flammam non edit, resina autem in fumum vanescit, thus statim ardet, odore etiam maleficium proditur.

Thuris cortex, pini aut nucis pineæ cortice horum tamen index ignis: nam reliqui cortices suffiti, quāquam incenduntur, sine odore fumant. Thuris verò cortex ardet, & odorum fumum edit.

c

Thuris

Thuris manna, adulteratur cribrata pini resina, aut polline aut cortice thuris contuso: seu hac igne deprehenduntur.

Hæc abundè fuerint ei, præsertim qui veras simplicium sincerorū notas, ex nostro libro simplicium primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio secundum docuimus, & in uno quoque rerum genere quoad perfectissimum est, idem sit simplex ac unicum. Id si cognoueris, alia ei congeneria aut etiam arte affinia nullo negotio secreueris.

SIMPLICIS ALICUIUS NOMINE ABSOLVTE SCRIP- PTO, QUID ACCIPIENDUM.

I AM tradamus simplicis alicuius nomine scripto absolute & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figura, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, &c. quòdnam sit eligendum: nam pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora deligimus. Quam in rem te iuuabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quæ enim radicibus solis sunt efficaces planta, illarum nomine radices veniunt:

niunt: quæ foliis, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo, gummi, sunt utiles ac medicamentosa magis, dum planta nomen effertur, partē eius usurpari solitam elige. Quum verò pluribus suis partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamento constituendi forma, ut anisi, anisum, apium, carum, cnicus, cuminū, gith, libysticum, nasturtium, psyllium, seseli, staphis agria, semine sunt præstantiora, idēq; solum illarum nomine intelligendum, in aliis multis similiter.

Anisum, Cretense, lib. iij. sanit. tuend.

Agnus, id est, flos eius aut semen, licet folia etiam sint utilia.

Agaricus albus & femineus.

Aloë, id est, succus eius, aloë Indica, lib. 9. simplicium in diphryge.

Alumen scilicet scissile, quia præstātissimum, lib. compos. pharm. gen. primo.

Acetū, ex vino non hydromelite vel cerevisia.

Aristolochia, pro re proposita explicanda est: rotūda enim cum multum tenuare crassum humorem, tergere ulcera, digerere ex utero; longa autem, cum mitiora hac volumus. Clematitis autem quia fragrantior in unguentis expetitur.

Amomum, *Scythicum* lib. 8. comp. phar. part.
Ammi, *Illyricum*, lib. 9. eiusdem, *Ægyptium*
 alij laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligen-
 dum, quàm carpobalsamū aut xylobalsamum,
 lib. 2. comp. phar. part.

Bryonia, alba, quia efficacior, quàm nigra.

Buglossum, utrumq; foliis & flore efficacius,
 radice tamen non inutile.

Casia vel *cassia* in libris Græcorū. *Cassia sy-*
rinx optima & *cinnamomo* viribus & toto ha-
 bitu finitima. In libris *Arabum* eadem lignea
 dicitur, altera verò fistula his dicta ponitur,
 cū medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis, cortex radice.

Centaurium, minus in purgantibus medica-
 mentis: in ceteris maius dictū à facultate mul-
 tiplici & efficaciore.

Calaminthe montana, quia efficacior quàm
 domestica.

Costus, amarus, cū subamarus & valde
 acer solum nominetur, dulcem tamen nescio
 quem *Arabes* inuexerunt.

Cypressus, id est, nuces eius in astringentibus
 medicamentis: lignum aut folia in diureticis.

Cinna-

Cinnamomum optimum, de quo in simplicibus abundè.

Corallium, rubrum.

Cuminum, Æthiopicum, lib. 4. sanat. tuend.

Daucus, agrestis, nam satius pastinaca est, alimentum verius, quàm medicamentum.

Elleborus, niger Mesua, quia salubrior: albus Galeno Aph. 1. lib. 5. Obserua igitur an compositio sit Arabica aut Græca. Elleborus uterque & belenium ex locis editis præstant.

Eruca, silvestris quia efficacior hortensi.

Epithymum, Atticū melancholiam ex ventriculo purgat: id in Græcis compositionibus usurpandum; in Arabicis Arabicum.

Fœniculus, semen, sed in collyriis succus foliorum aut radicum.

Galla solida, efficacior quàm perforata.

Gummi, Arabicum, id enim omnium perfectissimum vel Plinio auctore.

Gluten, mastiche, ceteris glutinis efficacius, ut vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur: aliis ichthyocolla: aliis taurocolla magis placet glutinis nomine.

Hyssopus, montanus hortensi melior, ut calaminthe montana efficacior domestica. Hyssopum Cilicium Diosc. Creticum verò Archi-

genes, apud Gal. lib. 8. comp. phar. part.

Hyoscyamus, albus, seu albū eius semen, quod tamen interdū exprimitur frequentius tacetur.

Iris, radix ireos Illyrica veteribus, nūc pharmacopolarum ignavia Florentina vsurpatur, cū illa per Venetos facile haberi queat.

Lupinus, amarus, nam dulcis esculentus est, ut ille amaritudine per macerationem in aqua deposita.

Lactuca, semen, praterquā in victus ratione, ubi herba potius intelligitur.

Lapathum, oxylapathum efficacius rotundo.

Lithargyros, auri, tamen lithargyros chrystis aliquoties in lib. comp. phar. Gal. legitur.

Mastiche, Chia, lib. 7. met. & alibi passim. Ægyptiam tamen ac recentem ob id pinguis-
simam laudat, lib. 2. ad Glaucon.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel, apum: alterū, aëromeli seu mel aërium & roscidum.

Margaritæ, solidæ meliores perforatis, nisi etiam sint flauæ, obscuræ, solidis pares.

Medulla, si nō additur cuius animalis, & valens futurū est medicamentū, ceruina miscenda valentior quā vitulina, lib. 6. com. phar. part.

Nuclei, pini, olivæ, dactyli autem Auicenna.

Oleum,

Oleum, olium, ex oliis expressum.

Opium, Thebaicum, Galenus lib. 7. simpl. & post eum omnes.

Petroselinum, Macedonicum & in hoc Astreoticum, & huius semen maximè in usu est, lib. 8. comp. phar. part.

Pruna si alius deicienda est, Damascena, & Hispana seu Iberica, hodie Augustana & Cathalaunica Italis dicta, sunt multò præstatiore, vel si qua his similiter sunt pingua, dulcia. Si ad cohibendum & astringendū fit medicamentum, Damascena immatura, vel potius qua Iorana nobis dicitur & Iuliapi & Turonica.

Papaver album semen.

Piper, album, quia acrius, & linguam magis pungit, quàm nigrum, à quo per adustionem vis exhalavit, Gal. lib. 8. simpl. sed album id maturum intellige. Nam album ex macropipere in racemum granatim dehiscens, recens factum, minus acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum.

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus: sicca, in siccantibus unguentis epuloticis & glutinantibus, Galen. lib. 7. simpl.

Paeonia, mas seu eius radix vel semē, Manardus statis nostra medicus lōgè doctissimus in epistolis.

Polypodium, quercinum vulgò usurpatur murale, & à saxis pratulerim cum Narbonensibus quibusdam, quod frequentissimum, & pro quercino omnes venditant, nisi si quando a strictione opus est, qua ratione hederam quoque quercinam nonnullis expeti audio.

Quatuor emollientia { malua
althæa
viola nigra
acanthus, id est, branca vrsina

Quatuor semina { Frigida { Maiora, meloni, cucumeris, cucurbita, citrulli.
Minora, lactuca, portulaca, intubi, eichorij.
Calida { Maiora, cumini, carui, anisi, fœniculi.
Minora, apij, dauci, ameos, anomi.

Quinque radices vretica, apij, petroselini, asparagi, graminis, rusci.

Resinarum primas non iniuria meruit lentiscina, id est, mastiche: inter alias verò præfertur terebinthina, quia melior quàm colophonina, & frieta dicta, aut illius loco ponitur laricea dicta, terebinthina propè similis, Galen. lib. i. comp. phar. gen. Recentioribus verò pinea intelligitur.

Ruta,

Ruta, folia ruta agrestis: Gracis verò folia ruta domestica. Illam verò & illius semen, moly, vel hesanum, vel hesasa, vel cum Syris, apud quos nascitur, Hermola ferè vocant.

Rosa, rubra recens in purgantibus: sicca in astringentibus.

Raphanius, siluestris.

Rosmarinus, folia, interdū flos, quē nescio cur hodie vulgus ἀρωγῆ .i. florem absolutè appellet.

Rhus, cortex fructus sumach dicti.

Stœchas, Stœchados Arabica flos.

Styrax, calamite: nam liquidus vulgò dictus est myrrha stacte, si verus sit.

Santalum, flauum.

Spica nardi, Indica.

Sulfur ἀνθραξ, id est, ignem non expertum seu viuum, est nobilissimum, ad quædam extinctum ceu nobis familiarius præfertur.

Σχοινόν, id est, iuncus: pro schoëna anthos.

violæ

Tres flores cordiales, { violarum

buglossi

boraginis.

Thymum, Atticum, aut ex editis locis & sic-

cis, lib. 4. sanit. tuenda.

Viola nigra seu purpurea, vulgò Martia &

quadragesimalis, quòd in ea tempora flos ferè

incidat,

442 SIMP. ABS. SCRIP. QUID ACCIP.

incidat, & eadem recens si haberi potest: nam
sicca inefficax.

Zizipha. i. iniuba, recentia & bene matura
aut saltē integra, nō putria aut vetustate exu-
ca, quod illis post sextum mensem ferē accidit.

Si quæ singula in singulis regionibus sunt
præstantissima & laudatissima.

Alumen, Milesium.

Agaricus, Ponticus Andromacho iuniori i
Myfi, Cyprum. (Theriaca

Nitrum, Berenicium. Sinon, Syriacus.

Cuminum, Hispanum, alibi Æthiopicum
melius Ægyptio.

Anisum & Thymū, & alia plurima, Cretica
lib. 4. sanit. tuend. in diatrion piper. & diacala

Meon, Hispanum & Macedonicum.

Aristolochia, Pontica, & hac melior Cretica
lib. 10. comp. phar. part.

Phu, Ponticum. Castorium, Ponticum.

Daucus, Creticus, semine & radice bonus: ce-
teri solo semine.

In Dicaearchia, quæ nūc vocatur Puteoli, eru-
go, cerussa, as, squama aris, & alia nōnulla. Ro-
ma argenti spuma fit optima: ex Sicilia, item
magna Libya & Creta quotannis multo præ-
stantissima Romam afferebantur.

Hucusque Siluius.

D I A

DIARIVM PHARMACORVM PARANDORVM,
ET SIMPLICIVM LEGENDORVM,

MATTHIA LOBELIO collectum.

IN uniuersum annum optimè instructurus officinam Myropola per dies & menses operariis, famulis & officina caculis iniungit quæ faciendæ sunt; quia nonnulla medicamenta omni tempore parari nequeunt: quorum quidem aliqua si concinnari possent; tamen non debent, quia omnia simplicia suo tempore & in summo virium vigore (ut scitè Diosc. & Gal. docuere) colligenda, recondenda, præparanda, & aliis miscenda. Nonnulla verò quouis anni cardine, solo & celo, vel minori sumptu præparantur, & miscentur. Exemplo igitur sumpto ab iis qui opera locarunt, exordium sumemus.

I A N V A R I O.

ME N S E primo & anni primis diebus perlustranda quæ supersunt valida & integra in officina; ut vitiosa, cariola, antiquata, deprauata & putrefacta abiiciantur; ut & quæ desiderantur, inueniantur, & absumpta restituantur.

F E-

QVAECVMQVE imperata sunt mense
Ianuario, fieri possunt hoc & sequenti mense
Et circa finem in regionibus calidis. in quibus
omnia præcocia sunt, collige Violas ad syrup
præparationē; Conseruationē siue Conditum
ad Oleū: & ad pulueres cordiales siccatas ser-
uādas; quas & tardius colligere potes vt sicci-
ores sint, & calor maior adsit ad siccandas eas
Collige item Keyri.

RADICES COLLIGENDI
T E M P V S.

Circa finem Februarij, initio Martij, & pri-
mo Vere collige radices in varios vsus, prius-
quam vis in folia erumpat.

Censuit tamē Dioscorides omnes incipien-
te foliorū defluuio esse legendas, & cælo sere-
no, cui in quibusdā Gal. Auicenna & Mesues
consentiunt, in alijs diuersa sentiunt.

M A R T I O.

RADICES quouis anni tempore colligi
possunt quæ hominum cultu & satione crebra
in omnem anni partem vegetæ incidunt: qua-
les ferè sunt hortenses alimentosæ. vt,
Arij

Apij vulgaris
Buglossi vtriusque
Betæ
Lactucæ
Intubi
Oxalydis
Raphani
Napi
Pastinacæ
Sisari
Cepæ
Porri
Allij.

Et præter has erraticæ,

Dauci
Gingidij
Caucalidis

Ari
Dracunculi
Cyclaminis
Periclymeni
Cotyledonis.

Nam hæ quin-
que vt bulbosæ quæ-
dam, aliæ etiã æsta-

te siccatis foliis plenæ sunt, & frequenter
Autumno regerminant, alimenti pinguis &
crassi copia.

Quæ verò solius naturæ sponte crescunt, aut
semel à nobis tempestiuè seruntur aut plantan-
tur; ferè sunt optimæ, solo aut vere, aut (vt dixi)
autumno, paucissimæ æstate aut hieme. Quin
& hæ quas multis anni partibus communes
diximus, sunt præstantiores, cum tempestiuè
sata adoleuerunt & vigent: aliis verò temporibus
ignauiores; quãdo vt quadã & holitoris opera
& irrigatione coguntur adolescere sub cælo sibi
parũ propitio; quale æstiuũ est, ac autumnale
&

& hiemale. Sic vere ipso quando primum germinare incipiunt, nobis leguntur in annu-

| | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| Enula | Lilium | ger |
| Althea | Alni nigrae ra- | Esula maior |
| Iris | dieis cortex | Farfara |
| Acorus | Hyoscyamus | Filipendula |
| Symphytum | Angelica vtra- | Filix |
| Ruscus | que | Filix florida. |
| Asparagus | Anonis | Gentiana |
| Petroselinum | Asarum | Iarus |
| Apiū palustre | Asclepias | Aron |
| Foeniculum | Bistorta | Imperatoria |
| Bryonia | Betonica | Lepidium |
| Agrimonia | Buglossum | Mandragora |
| Meum | Carlina | Narcissus |
| Phu | Garyophylla- | Nymphaea |
| Cyperus | ta | Radix cana |
| Rubia que po- | Centaureum | Capnos Plin |
| tius autumno | maius | Rubus |
| Saxifraga | Chelidonium | Scrophularia |
| Eringium | utrumque | Perasites |
| Tormentilla | Coryledon | Petrosel. Ma |
| Pentaphyllon | Cynoglossum | cedon. |
| Pœonia vtraq. | Dictamnus | Peucedanum |
| Polypodium | albus | Pimpinella |
| Gramen | Elleborus ni- | Pistolochia |
| | | Pitiusa |

PHARMACOR. PARAND. 447

Pitiufa & Rustica- Cortex rad.
 Cortex rad. nus Fraxini
 Populi Muscus arborū Cortex rad.
 Sigillū Mariæ Cort. rad. sam- Lauri.
 Orchides buci Cortices arbo-
 Raphanus syl. Rad. Ebuli. rum.

HERBAE ET FLORES.

Viola Martia ad
 Syrupum
 Conseruam } in regione temperata.
 Oleum
 & cordiales confectiones.

Keyri.

Aquæ destillantur ex violis & herbis hieme
 vegetis, vt Aqua

Vmbilici Veneris

Mandragoræ

Semperuiui

Capill. Veneris.

Adiantum omne, Asplenium, Phyllitis.

In regionibus calidis Syr. ex herbis recentibus
 parari possunt, vt,

Capillorum Veneris simplex & compositus

Grana Hederae arboreæ

Oculi Populi.

APRI-

Quaecumque omiffa Martio mense, initio
Aprilis parari poffunt.

Keyri Primula Veris

Narciffi flores ad oleum

Gochlearia Orchides Salvia vita.

M A I O.

Quæ prætermiffa funt mense Aprili, funt
initio Maij.

Destillêtur herbę quę ad statũ peruenierunt

Herbæ quæ iam caulem producunt, & se
men edunt illo mense, conseruantur ad The
riacam vel aliam compositionẽ. Reponantur
in altiori parte domus.

Vnguenta ex succis fiunt.

Emplastra ex succis herbarum parantur.

Conseruationes ex plantis.

Colliguntur

Abfinthij coma ad conser.

Eupatorium ad succum.

Paludapium Serides Plantago

Daphnoides Lens palustris Lupulus

Cichorium Leucoia Tamariscus

Fumaria Lichen Thlaspi semẽ

Genistæ flores Mezereon Vineæ per.

Lactuca syl. Napi semen uinca

Bugu-

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| Bugulæ | succus | Pulmonaria |
| Asplenium | Limoniū Ger- | vtraque |
| Phyllitis | manicum | Rosæ |
| Borago | Sem. Pyrolæ | Rosmarini |
| Buglossum | Ophiogloss- | flores |
| Bursæ pastoris | sum | Flor. Sábuci. |

IV N I O, & initio IV L I I.

| | | |
|----------------|------------------|--------------|
| Abrotonum | Cassitha | Epithymbra |
| Agrimonia | Centaurium | Equisetum |
| Alchymilla | minus | Euphrasia |
| Altercum, siue | Chamædrys | Galega |
| Hyoscyamus | Chamæpitys | Genistæ semē |
| Altheæ flores | Rosæ in regio- | Gratiola |
| & folia | nibus tem- | Hypericum |
| Anethum | peratis | Hyslopum |
| Anthemis | Syr. Ros. cōser. | Iacobæa |
| vtraque | oleū, vnguē- | Labrū Vene- |
| Artemisia | tum, succus | Laurus (ris |
| Asari folia | Betonica | Lysimachia |
| Ballotæ | Brassica mari- | lutea |
| Calamintha | na | Maiorana |
| montana | Botrus | Marrubium |
| Calēdulæ stil- | Branca vrsina | Marum |
| laticia | Cari semen | Matricaria |
| Cardus bene- | Coriandrum | Melissophyl- |
| dictus | Epithymū & | lum |
| | f | Men- |

| | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| Mentha | res | cus & stilla |
| Mentastrum | Periclymini | ticia |
| Mercurialis | flores, & fru- | Ros solis |
| Millegrana | ctus, & folia. | Ruta vtraque |
| Nepeta | Petroselinii | Sabina |
| Nummularia | Macedonici | Salvia |
| Origanum | semen | Sanicula |
| Papaver | Phlomos | Satureia |
| Rheas | Pilosella | Serpyllum |
| Opium | Polium | Scordium |
| Parietaria | Polygoniaqua | Verbena |
| Parthenij siue | & succus | Veronica. |
| Cotulae flo. | Portulacae suc- | |

I. V. L. I. O.

In regionibus temperatis quæ prætermiffa
sunt Iunio, facienda.

Quæcumque Solis feruorem requirunt, pa-
randa, vt Theriaca, quæ in calidioribus regio-
nibus parari solet, Iunio mense, vbi omni-
sunt præcocia.

Parantur Trochisci Aliptæ moschatae, qui
mollescunt Ladanum & Styrax, si soli exponantur.

Quod si quis eo tempore hæc neglexerit
aut prætermiserit, licebit aquam rosaceam ad-
dere calidè; & vi caloris liquecant; (sicut
balneo) quod melius est, quia illa longa in so-
latio exoluit vires odoratorum.

Apud nos quia semina seriùs matureſcunt,
inſolatio & fermentatio Theriaces poteſt iu-
uari & accelerari in balneo vel hypocausto.

Colligenda

| | | |
|---------------|-----------------|---------------|
| Abſinthium | Lauendulę flo- | Sem. Anethi |
| Abrotonum | res | Morus |
| Ageraton | Ligustiſci ſemē | Orobùs |
| Coriandrum | Sem. Sefeli | Capita & |
| Dauci Cretici | Maſſilienſis | Sem. Papa- |
| ſemen | Sem. Litho- | ueris vtriuf- |
| Sem. Petroſe- | ſpermatis | que. |
| lini | Lupinus | Pſyllium |
| Hydropiper | Sem. Maluę | Ribes |
| Pulegium | Flores Melilo- | Sophię ſemen |
| vtrumque | ti | Tanacetum. |

A V G V S T O.

Quęcumque neglecta aut omiſſa ſunt præ-
cedente menſe, ſiant Auguſto.

Collig.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Altheę ſemen | Fraxini ſemen |
| Sem. Cataputię | Milium |
| Cnici ſemen | Floſ Nymphę |
| Cornus | Petum. Mel Peti |
| Cynosbatoſ fructus | Omphacium |
| Dauci vulgariſ ſemen | Prunus ſyl. |
| Cucumis Elaterij | Sem. Sábuci & Ebuli |
| | f 2 Rham- |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Rhamni Cathartici | Momordica |
| sem. | Scordium |
| Polium | Seseli Æthiopici se- |
| Ricinus | men. |
| Spica Lauendulæ | Sem. Hyoscyami |
| Tribulus aquaticus | |

SEPTEMBRI & OCTOBRI.

Antispodium è Myrto & Cydonio
 Cortices Castanearum
 Cotonea mala Halicacabum Mespilus
 Rhamni cathartici semen
 Radices nonnullæ omiſſæ Vere nouo. vt,
 Iridum, Pœoniæ, Acori.

NOVEMBRI & DECEMBRI.

His duobus mensibus, Nouēbri videlicet ac
 Decembri, eadē erit ratio, si modò in eis conti-
 gerit eiusmodi cæli tēperies, vt radices adhuc
 validæ nulla vel frigoris vel nimis tempestate
 concutiantur. nam sepe iisdem mensibus con-
 tingit, vt sine vlla cæli iniuria Pharmacopœis
 quod reliquum est radicū in hortis remanen-
 tiū, æquē ac in præcedētibus, colligere liceat.

*Sequuntur & nonnulla purgantia me-
 dicamenta M. Lobelij.*

A L I-

453

ALIQVOT MEDI-
CAMENTA COMPOSITA
HABERE IN PROMPTV
OPERAEPRETIVM.

DOLUM esse si quis compositis utatur Villanovanus dixit, ubi in promptu habentur simplicia: Duabus tamen de causis nonnulla composita pharmaca non minus utilia quam necessaria sunt. Prima & potissima, quotiescumq. praecipites implicati morbi, eorundemq. saevissima symptomata adeo urgent, ut nova medicamenta, magistralia vocata, repente per otium concinnare non liceat. Secunda, quia multa comprobata, & usu & ratione recepta compositiones fermentatione egent; unde nova & optata exoritur facultas; quandoquidem simplicia quovis loco, calo & solo, ad manum esse nequeunt; ideo quo tempore maxime vigent, in annum usum ex his composita nonnulla medicamenta preparari, permisceri & asservari operapretiū est, ut Theriaces compositio, Mithridatica, Philonis antidotus, & huiusmodi. His rationibus ductus, quia medicamento purgante indies utendū, aliquot tuta eaq. pauca pharmaca composita, blando nulloq. labore euacuantia, singulis humoribus dicata, nobis

f 3

elegi-

elegimus; quibus diu felicissimè usi sumus, & ex duabus tribusque cōpositionibus unā fecimus, ne mole & copia compositionum obruamur; quæ diu in officinis asseruari solita, sæpe putrēt, non sine Pharmacopœorū & agrotantium dispendio.

CHOLAGOGVM ROSATVM

CLEMENS, OMNI AETATI VTI-
le, ori, ventriculo & visceribus gratū, feбри-
bus & affectibus biliosis aptū. Respondet Ele-
ctuario Rosato, & Elect. è Prunis solutiuo.

℞. Succi Rosarum rub. ℥ xv.
Sacchari albi ℥ xxx.
Mellis candidi despumati ℥ vj.
Prunorum ℥ xx. quæ exhibent pulpæ
solidiusculæ ℥ xvj.
Passularum à stipitibus mundatarum ℥ xij.
quarum pulpa solidiuscula est vaciarum vj.
Pruna & Passulæ coquantur separatim ad
mollitiem ex decocto sequenti, & per se-
taceum cernantur.

℞. Cichorei totius
Boraginis Acetosæ
Polytrichi, vel Adianti
Endiuæ } ana m. iij.

Hor.

Hordei integri m. j.

Glycyrrhizæ mundæ ℥ j. β.

Florum violarum

Boraginis ana m. j.

Anisi ℥ iij.

Fiat omniū decoctio in s. q. aquæ ad ℥ iij.

In cuius colatura coque in vase occluso Pruna

& Passulas. In residuo infunde, coque leniter

Seminis Psyllij

Quatuor seminū frigid. maiorum

Sem. Lactucæ } ana ℥ β.

Oxalidis

& Portulacæ contusorum

Dissolve G. Tragacanthi ℥ j. β.

Saccharum, Mel & Succus rosarum coquantur

ad Electuarij solidiusculi consistentiā: de-

inde pulpæ & emulsionēs seminū addan-

tur, iterumque coquantur lento admodum

igni; tum demum insperge pulueres

Cinnamomi electi ℥ β.

Santalorū rub. ℥ j. β. Santal. alborū ℥ vj.

Garyophyllorum

Surculorū vel foliorum Lentisci } ana ℥ j. β.

vel Garyophyllorum ℥ ij. ℥ j.

Macis ℥ iij.

Adde denique singulis lib. siue ℥ xij. huius

f 4

Ele-

Electuarij, Scammonij optimi ℥ j. cocti in
 ℥ j. β. Succo rosarum lento igne vel cineribus
 calidis, quemadmodum coquitur à Mesue in
 suo Elect. Rosato.

Tota compositio est librarum v. & ℥ v.
 Dosis à ℥ iij. ad ℥ iiij. v. & vj.

Si velis minus purgare, vtare minori dosi.
 medicamenta enim validiora minori dosi as-
 sumpta, debilia sunt.

EXTRACTVM MELANAGO-
 GVM SANGVINEM DEFECANS,
*& serosa excrementa euacuans, omnibus cutis
 & cuticulae vitiis, lepra & elephantiasi con-
 ueniens, siue à bile, siue à pituita salsa. Sple-
 neticum & Hepaticum medicamentum efficax.*

R. Succorum Rosarum rub. defecatorum ℥ ij.

Suc. fumariae

Lupulorum

Boraginis

Pomorum dulcium

Mercurialis

Endiuiae vel Cichorei

Vini albi

} ana ℥ j.

(culo occluso.

Quibus decoque sequentia in balneo oper-

R. Po-

℞. Polypodij recentis, & adhuc viridis ē quer-
cu vel fraxino ℥ vj.

Foliorum Senæ mundatorum ℥ ix.

Summitatum & florum Thymi,
Cassithæ
& Absinthij } ana ℥ vj.

Radicū Lapathij acuti virentium
Helenij Ebuli, vel
Corticis radicum Sambuci
Corticis rad. Fraxini
& Populi nigri } ana ℥ j. β.

Capillorū Veneris vel Polytrichi
Asplenij Chamædryos
Chamæpityos } ana m. j. β.

Florum Chamæmeli Romani
& Cotulæ fætidaē siue Parthenij ana m. j.

Seminis Cnici ℥ iij.

Sem. Anisi
Fœniculi } ana ℥ vj.
Carui

Contusis, infusis, decoctis, expressis &
transcolatis infunde

Agarici candidissimi & leuissimi

Hermodytylorum, &

Pulpæ Colocynthidis ana ℥ j.

Omnium Myrobalanorum ana ℥ ij.
f s Zingi-

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| Zingiberis | Cinnamomi | } ana ℥ j. |
| Schoenanthi | Macis | |
| Galangæ | Garyophyllorum | |

Iterum expressis & defecatis percoquantur lento admodum igne cum mellis candidi & tribus ad mellis vel Electuarij liquidi crassitudinem. Addendo singulis ℞. Scammonij præparati vel cocti in succo Rosarū, vt antè diximus, ℥ β. pul. Gummi Arabici ℥ j. Dosis ℥ iij. ad ℥ iiij. & vj.

Extremis morbis adiciuntur vniuersæ compositioni

Hellebori albi
& nigri ana ℥ β.

CATHARTICVM HY- DRAGOGVM.

℞. Radicum Graminis ℥ vj.
Rad. Asari ℥ j.
Granorum Hederæ arboreæ ℥ iiij.
Garyophyllorum Galangæ tenuis
& Cinnamomi ana ℥ ij.

Coquantur ex arte, vt dixi modò, in f. q. aquæ mulsæ, & ℞. j. vini albi, ad ℞. j. Colaturæ adde Succorum rad. Iridis & Brassicæ marinarum ana ℞. β.

Succo

Succorū Chamælææ } densatorum, vt docui-
 & Thymelææ } mus capite de Chamæ-
 læa, ana ℥ iij.

Vel eorundem vice in regionibus frigidis quę
 carent vel non abundant Chamælæa &
 Thymelæa, sume

Extracti Laureolæ vel Gratiolæ ℥ j.

Percoquantur igni lento cum sacchari p. j.
 ab igne vbi abstuleris, adde pulueris radicis

Mechioacæ ℥ j. β.

Tarrari albi ℥ β.

Macis ℥ iij.

Datur ex aqua Graminis & mulsa à ℥ iij.
 ad ℥ iiij. cum pari quantitate Melanogogi.

DIACNICVM CVM CITRO

SOLVTIVVM PHLEGMAGOGVM

& Hydragogum, quartana febre affectis, vt
 si quod aliud, vtilissimum. Respondet Dia-
 carthamo & Electuario à Citro solutiuo
 Morspeliensium.

HÆC Compositio à Cnico siue Carthamo
 nomen accepit, tamquam precipuo agente: me-
 ritò igitur ℥ iiij. Medullæ seminis Cnici
 cum Rondeletio legendum, pro ℥ iiij. (vt de-
 prauatè habent omnia exemplaria) censemus.

Ad

Ad hac Cnici semen omnium viscerum obstructions reserat; colluviem propellit, & pituitam purgat egregie.

Recipit autē Medullæ seminis Cnici ℥ iii.
vel eius loco sume seminis Cnici boni &
pleni ℥ xiiij. ℥ vj. ℥ ij.

(ex ℥ j. autem seminis habebis ḡ. vj. medullæ.

Contundatur, & fiat emulctio ex aqua mulsa, vel iure gallinacei, ut docet Dioscor.

Confer. Corticis Citri* melle conditi *ad deterfionem pituitæ

Confer. Violarum &

Florum Boraginis ana ℥ x.

Carnis Dactylorum vino albo maceratorū ℥ j.

Pul. specierum Diatragacanthi frig. ℥ j.

Turbith ℥ j. ℥ vj.

Diagridij vel Scammonij ℥ j.

Zingiberis albi ℥ ij.

Hermodaetylorum ℥ iiij.

Spiritus Anisi, vel

Eceniculi Cochlearia tria.

Mellis optimi despumati ℥ xij.

Sacchari albi ℥ xx.

Terenda terantur & permisceantur.

ANTI-

ANTIDOTI DIAPHOENICI

MESVAE EMENDATA DESCRIPTIO.

R. Dactylorū Cheyron, id est, è Chayero op-
pido, non Cirrhon siue fuluorum, vt malè
ex Græco vertit Ruellius, nonnullas offici-
nas secutus, ℥ xij. & β.

Macerentur vino *albo, loco tepido ad *Rondel.
mollitiē, terantur, cernantur per cribrum.

Pinearum non penidiorum aqua hordei mun-
datarum & infusarum ℥ v.

Turbith optimi ℥ iiij. ℥ iiij.

Amygdalarū dulcium purgatarū ℥ iiij. ℥ vi.

Scammonij ℥ j. β.

Zingiberis Piperis longi

Cinnamomi Macis

Galangæ Xyloaloës

Foliorum Rutæ siccorum

Anisi Fœniculi } ana ℥ ij. β.

Dauci Cretici, vel eius lo-
co Cari semen aroma-
ticum.

Probè trita omnia excipiantur, libris tribus

Mellis despumati ex infusione vini Dactylo-
rum & aqua Hordei, in qua post lotionem

Pinei & amygdala macerata sunt.

Tota cōpositio est ferè lib. v. & ℥ xj. Dosis
ab ℥ β. ad ℥ vj.

H I E.

462 MEDICAMENTA COMPOS.
 HIERA AROMATICA
 SIVE PILVLAE EX ALOE
 AROMATICAE.

℞. Aloës succotrine aliquoties macerate succo
 Rosarum rub. & exsiccate in clibano ℥ ii
 Agarici Trochiscati tenuissimè triti ℥ ii
 Cinnamomi
 Rad. Asari
 Spicæ Nardi
 Mastiches
 Caryophyllorum
 Macis
 Galangæ
 Schœnanthi
 Xyloaloës
 Croci
 Cum Syrupo è Stœchade excipiantur.

} ana ℥ j. ③ β.
 } ana ③ ij.

PLURA iam non excutiemus, freti D. Rondeletij Pharmaceuticam officinam mendis innumeris vindicatam, tandem in publicum prodituram.

Querenti autem Medicamentorum varia & comprobata genera, eiusdem Rondeletij Remediorum formula obiciantur.

SVC

463
S V C C E D A N E A,

Q V I D P R O Q V O

V O C A N T.

AΝΤΙΣΤΑΝΤΙΑ, hoc est, Simplicia, qua aliorum facultate similium penuria supponi possunt medici consilio. Quae nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur, Galeni non esse hinc liquet, quod statim ipso initio Galenum citat. Adhuc Anacardij fructus mentionē facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima, ut loco Agarici, Euphorbium: pro Serpyllo, Potamogetona: vice Galla, sordes gymnasiarum: in locum Polypodij, radicem Chamalea aut chamaleontis: pro Polytricho, Absinthium, & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamē quae recipienda magis sunt, tum ibidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Arabibus utcumque proferemus: ut

P R O Aq u a p l u u i a, supponi potest aqua fontana pura, & ab omni mistione sincera, Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in diacodio.

Acatia, succus & caro prunorum agrestium, vel hypocistis, Auic. 2. canon.

A s a r o, acori par pondus & dimidium. Carpesium

sum quoque pro asaro & cum asaro, lib. 2.
compos. phar. part.

Absinthio, cum Galen. abrotonum: & econtri
pro abrotono absinthium.

Acanthij semine, lychnis, & econtrà ἀνθαδό
μενον.

Acantha Arabica seu Ægyptia herba (qua su
caba Serapioni dicitur) acantha leuce no
stras eidem dicta bedegar.

Alicacabo, semer solani.

Aspaltho, pix liquida, brutia.

Æthiopica olea lachryma, lachrymarum aca
cia partes duæ, seu pro gummi lemnij, gummi
Arabicum.

Acoro, ad flatum & hepar ac lienem iuan
dum, cumini par pondus, & tertia pars ari
stolochia, Auicenna.

Anchusa, hyacinthus.

Arsenico, sandaracha.

Amylo, sicca farina.

Amygdalis amaris, absinthium.

Aristolochia quauis, una ex tribus aristolo
chiis, quamcumque habueris, Gal. lib. 3. comp.
phar. part.

Adipe vulpis, ursinus.

Adipe cervino, anserinus.

Alu-

Alumine, sal fossitius.

PRO Balaustio, malicorium.

Buccinis, ostrea usta.

Balsami liquore, myrrha stacte.

PRO Cinnamomo casia aut amomi duplum ad odoris gratiam, Gal. lib. 5. comp. ph. part. in dentifricio Pro Cinnamomo, duplum optima casia, vel cū Quinto medico duplum vel multum carpesii, vel certè non paucior casia, Gal. lib. 2. 3 & 8. comp. ph. part. & lib. antid. Quidam carentes Cinnamomo, in vicem eius ponunt aequale pondus ex semine cardamomi, Democrates in Cyphi, lib. 2. antidotorum Gal.

Casia, cinnamomum, Gal. lib. 2. comp. ph. part.

Casia cortice, nardus Indica vel malobathri folium, vel contrà, lib. 6. comp. ph. part.

Chamameli floribus, duplū foliorū & radicum.

Costo hodie rarissimo, pyrethri dimidiū, vel bacca cedri vel radix helenij vel ireos.

Cimolia terra, ex Cimolo una Cycladum retri-
mentum ferri & mole simul attritorum.

Cardamomo maiore, minus, & contrà.

Calamintha omnis mentastrum & pulegium
similia sunt facultatibus, ob id iniicem sunt
antiballomena.

g

Croco,

Croco, crocomagma.

Cypero, iuniperus maior.

Cumino, semen ruta vel agni.

Clinopodio, heliotropium.

Colocynthide, semen ricini.

Capparis radice cortice, cortex radice tamaricis vel erica.

Cicutæ semine, coriandrum.

PRO Dictamno, elelisphacis vel nepitha.

Doronico, dimidium seu dua tertia garyophyllorum, Auic.

Damaſonio, eringium.

PRO Elaterio, succus foliorum cucumeris agrestis.

Ebeno, lignum Guaiaci, & contrà. Nam quas vires hodie in ligno Guaiaci experimur, ebenus tribuit Gal. lib 6. simpl.

Eupatorio Mesua, absinthij & asari ana dimidium pondus eius, ut ambo simul mista æquent pondus Eupatorii Mesua, ab eupatorio Graecorum diuersi.

PRO Folio, folium garyophylli, nardus Indica si inuenitur, casia, id est, vulgare cinnamomum, macis, Auicenna 2. canon.

Ferrum, ferrugo, squama ferri: idem propè polent, & pro se mutuò ponuntur.

Fimo

Fimo palumbis, fimus columba.

Felle suillo, vel perdicis, vel piscium.

PRO Gentiana, asari, & radice capparis ana
dimidium.

Gongilide, heliotropium.

Glycyrrhiza succo, aequaleradicis eius. Andro. in
arter. 15. apud Gal. lib. 7. comp. ph. part.

Gnidio cocco, semen lathyridis, & contra.

Galbano, sagapenum.

PRO Hammoniaco, propolis.

Hermodactylo, in doloribus iuncturarum folia
Anchusa & dimidium Bdellij.

Hedera gummi, gummi Persici.

Hyacintho, flos Isatidis.

PRO Iride Illyrico, helenium odoratum.

PRO Lapide lasio, lapis gagates.

Lapide magnete, lapis Phrygius.

Lapide Phrygio, pyrites lapis vel argyrites.

Libystico, semen staphylini, id est, pastinaca, praesertim agrestis.

Lepore marino, cancer fluuiatilis.

Lanaria radice, radix veratri nigri.

Lycio, succus radice centaurij magni, lib. 7. simp.

alij succus baccarū periclymini, auctor libelli

Dynamenon, Galeno male adscripti.

RO Melle, mel aërium vel saccharum.

Malobathro, casia, vel nardus Indica.

Myrrha Troglodytica, calamus odoratus.

Myrrha, Smyrniū, & contrā. Diosc. in Smyrni

PRO Nasturtij semine, folia eius sicca.

Nuce moschata, par spica.

Nardo Syriaca, iuncus odoratus.

PRO Opopanace, hammoniā, vel galbanum

vel sagapenum, vel bdellium, lib. 2. ad Glau

conem in curando scirrho. (di

Ocimo garyophyllato, melissa in affectibus con

Oleo Laurino, pix liquida, licet illo inferior, v

oleum cedrinum, vel cicinum, vel vetus, v

oleum ex lucerna cum Hera, Gal. lib. 1. com

ph. part. vel coctum (sic enim tenuius fit, &

veteri ac cicino simile) vel sordes lucerna

rum luti crassitie, ibidem.

Oleo rosato, violatum, nymphae, amygdalinu

autem loco rosacei boni, id est, ex multis ro

cum oleo omphacino insulso facti, lib. 3. com

phar. part. initio.

Oleo ricinino seu cicino, raphaninum.

Opebalsamo, opocarpasum Gal. vel myrrh

acte, vel liquor myrti.

Oryza, hordei farina.

Oesypos, medulla ceruina.

Omphacio, succus rhois, vel vinum austerum.

P R O Pipere longo, album: pro albo, nigrum optimum, id est, grauissimum, & contrà, 4. sanit. tuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radicis eiusdem drachma tres, lib. 9. comp. phar. part.

Phoenicobalanorum pinguium carnis drachmis tribus, palmula seu daëtyli tres, aut sex, Gal. lib. 7. comp. phar. part. in arteriac. 15. Andromachi.

Psyllio, lens palustris.

Petroselino Macedonico in Theriaca, alterius regionis petroselinum, Galen. lib. 1. Antid.

P R O Resina fricta, pix, aut pix brutia, Galen. lib. 9. comp. phar. part.

Rubigine, scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem cyathus unus, Gal. lib. 9. comp. phar. part.

Rosis, flos rosarum, vel contrà, Gal. lib. 6. comp. phar. part.

Rhoë coriario, rhus obsoniorum, & contrà, Gal. lib. 6. comp. phar. part.

P R O Staphide agria, pyrethrum.

Spodio Gracorum, cinis super fornacem aurariam inuentus melior quàm abur vstū, quod nescio cur hodie Barbari spodium vocent.

Styrace, castorium.

Sale Indo, saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi cedri, hammoniacum, resina picea sicca.

Spuma nitri, nitrum molle vel aphronitrum, Gal. lib. 3. comp. phar. part.

Sulfure viuo, flauum vel vstum & purgatum.

Satyrrio, semen eruce, vel scincus, vel contrà.

Sinapi, cardamomum vel cardamum.

Scammonio, ricinus.

Stibio contuso, squama aris, stannum vstum.

Sepia osse, pumex.

Serapiade, peonia radix.

Scilla, bulbis.

Struthio, in sternutamentis elleborus albus.

PRO Terebinthina, larix dicta resina, ei prope-
modum similis. Gal. 1. lib. comp. phar. gen.

Thapsia succo, chamaleontis nigri succus, vel
nasturtium, vel nasturtij aut aruce seminis
pendens aequale, licet illa sint multo inferiora
thapsia, Gal. lib. 1. comp. phar. part.

Tamaricis succo, succus sambuci, Gal. lib. 9.
comp. phar. part.

PRO Veratro albo, nigrum.

Visco quercino, chamaleon niger.

Vino Falerno, aliud quoduis colore fuluum sub-
stantia tenne, vt perluceat, & sit odorum ve-
hemens.

hementer, ut Aruifium ex Chio. Lesbium ex
Mitylene, Cresso, Methymna, & Tmolites;
Gal. lib. I. comp. phar. gen.

PRO Zedoaria, aristolochia.

Zingibere, pyrethrum.

Αὐτὴ καὶ ἄλλα, vel horum aliqua vel alia,
potest quauis regio noua, desideratis facultate
affinia facere, doctorum medicorum cōsilio: nam
si Arabibus & Gracis pro sinapi Cardamomum
forte ipsis frequentius licet substituere, quidni
pro cardamomo frequentissimum nobis sinapi
vsurpabimus? praesertim cū ut pro cinnamo-
mo casiam, sic contrā pro casia cinnamomum
assumi probauimus: idemq; in aliis faciendum
puto. Ob id Galenus lib. 7. simplicium, melisso-
phyllum (inquit) marrubio facultate simile, sed
ipso multò imbecillius, ob id melissophyllo utitur
neme. Nam absurdum fuerit, praesente ubique
terrarum magno marrubij prouentu, uti melis-
sophyllo. Si cui verò ad manum non fuerit mar-
rubium, melissophyllo uti poterit, obseruata eius
pra illo imbecillitate, ut ob id quantitas eius au-
geatur. haec Gal. qua ratione pro cinnamomo tri-
plum casiae optimè miscemus medicamentis, ut
quantitate qualitatis imbecillitatē redimamus.

Qua igitur apud singulas gētes sunt copiosa,

modo sint facultate proxima his qua desiderantur, quia faciliora sunt paratu, ponantur, ut in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum, rustici cedrio dicto utuntur: eius panuria pisselao, id est, pice & oleo mistis liquida forma: interdum etiam cedrio & pisselao simul magis & minus mistis, prout vires eius intendere student: hoc autem linunt sinciput, nares, frontem, aures, & quibusdam plantam & sedem, Gal. lib. 2. comp. phar. part.

Sed videmur Antiballomenis non egere, qui magna cura iam simplicia generis omnis in promptu habeamus: imò maximè egemus, cum multa simplicia veteribus laudatissima (ut Theriaces compositio docebit) hodie nobis parum sint cognita. Qua ubi certa erunt, his utendum potius quam antiballomenis. Ut enim plurius est equo domini oculus, quam equisonis industria; plurius agro domini vestigium, quam villici stercorisatio; plurius familia paterfamilias, quam procurator; plurius prator, consul, rex, pastor, quam proprator, proconsul, prorox, mercenarius: sic plus tribuendum puto his qua maiores magno delectu & ratione optima in compositiones cooptauerunt, quam qua illorum loco coacti adoptamus. Hac haecenus ex Iacobo Siluio.

P E.

PETRVS COVDEB.⁴⁷³

PHARMACOPOEO.

LIBELLVM hūc, Pharmacopœe can-
dide, denuò percurrissem, atq. exactius
ruminassem, loca agrota reliqua leniendo,
ac nubila scholiis illustrando, extremam illi
manum adhibens; nisi otium, opusculi angu-
stia, typographi quoque commoda occasio,
atq. immaturæ quodammodo frugis extor-
sio, perorare me, atque vela ventis commit-
tere coëgissent. Omnia itaque hæc, cū obiter
saltem, ex tempore, & tamquam ex trans-
cursu tibi tradantur (etenim ne tantillum
quidem à Pharmacopœo vestræ farinae homi-
ne, cuius tamen propriè muneris est, hæte-
nus nostro seculo prodisse cognoscitis) æquo
sunt consulenda animo, dum meliora dare
Deus permiserit.

F I N I S.

SS

DE

DE SVCCEDANEIS
LOBELII, IMITATIONE
RONDELETTII, E CVIVS FRA-
GMENTIS ET PRAELECTIONIBVS
HABC FERE DECERPTA SVNT.

CVM attentiore lectione animaduertif-
sem vulgatum Succedaneorū libellum,
quem nonnulli Galeno, alij Paulo acceptum
ferunt, scatere mendis, & plerisque locis mu-
tilum esse; vtpote qui ex Græco in Arabicum,
& de Arabico sit denuo Latine versus, aut po-
tius peruersus, à Mauro quopiam, vel Mauro-
græco, qualis fuit & Actuarius: visum fuit,
quæcumque Dioscorides, Galenus, Aëtius atq.
Paulus litteris mādassent, experimentaq. tum
veterum tum recentiorum confirmassent, seli-
gere; eaque sic digerere, vt quid alteri cuius
æquipolleat, studiosis in posterum patēret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam
esse, vel id plus satis arguit, quòd nonnulla ad-
dita inibi sint quæ Galeni tempore ignota fue-
re, vti Anacardia, aliaque complura: nullo ta-
men ordine aut delectu, ac sine iudicio. Vt,
quòd fortè Chamæmelini legerant alicubi,
nominis decepti affinitate, Melinum subdide-
runt;

IMITATIONE RONDELETTII. 475

runt;quàm inſcitè, nullus eſt qui id ignoret:il-
lud enim laxat & moderatè calfacit, hoc verò
refrigerat aſtringitque. Eadem ineptia,quòd
fortè Cepæam Portulacæ ſimilem legiſſent,
illius vires huius facultatibus reſponſuras pu-
tarunt. Itidē leporem fluuiatilem cancri loco
uſurpari; vel, vt alius quiſpiam correxit, mari-
num, indoctè, vt qui ignoraffe videatur can-
crum alimentū & antipharmacum eſſe; lepo-
rem verò vel odore ſolo vomitorium & vene-
nū. Nec hoc falſum ſolummodò, at & diſcri-
minis plenū, cū loco Opobalſami Opocar-
pation ſubſtituunt, quod venenū frigidum eſt
Dioſcoridi, vinoque, vti Cicuta, expugnādum,
teſte Gal.lib. De antidotis. Verū ſi hīc Car-
paſon legamus, vera fuerit lectio, eſt enim te-
nuium partium. Cinnamomo item Behen ru-
brum reſpondere nequit. Neque placet ordo
ſeriesq. collationum: nam olea oleis, non reſi-
nis aut aquis ſunt conferenda; vt, quoad eius
fieri poteſt, ſint ſimillima. Deinde ſi non licet
ex ſpecie proxima, ſaltem è genere, cū abun-
demus probis remediis. Nec parui facio re-
gionū vbi naſcuntur proprietates, veluti Cre-
ticarum plantarum, quas Italicis efficaciores
puto; niſi ſqualida admodum fuerit ætas: tum
enim

enim Polium Italicum aut Stœchas non cedunt Cretico aut è Stœchadibus insulis.

Imperitiæ fatuæ est, substituenda præcipere rarioribus inuentu, ea quibus caremus, aut adulterata, vt loco cinnamomi, amomum. Insaniæ itidem, vbi abundamus lactuca, opocarpatum optare. Licuerit tamē, si qua sint rarius obuia aut minus trita, eorum loco vsurpare viribus similia, vti Terebinthinę verę loco, Lentiscum, qui frequentior & feracior est.

Cum autem succedaneis vti non rarò cogamur, nec enim omne fert omnia solum, nec vbiuis medicamēta opportuna occurrunt, (ruri enim *ἐν τοῖς οἰς* vtendum; & cum medicamenta necessaria ad repentinos casus ad manum minimè sint, præsentibus vtendum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt, vt Galenum fecisse legimus, cui Euphorbium cum ad spicula, aculeos & infixæ eximenda deesset, ex alueariis Propoli pro Euphorbio felici successu vsurpauit.

Succedancorum verò vsus hodie magis est necessarius quàm vmquam fuit; cum multis quæ antiquis in regionibus suis exortiuis & exoticis diues & vber prouentus sufficiebat, hodie careamus; tum suppositicia Hebræorum
&

& mercatorū vafro ingenio adulterata transfuehantur; quæ si reiicienda, alia substituere necesse est. Adhæc pleraq. prisca simplicia medicamēta exoleta, antiquitus notissima & vſitatissima, hodie ignorantur.

Permultæ Arabibus excogitatæ & vtilēs inuentæ compositiones, efficacissimaq. remedia in vſum recepta, quorū simplicia barbarie vocum nobis prorsus ignota sunt. Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus; aut illis caremus. At in ſuccedaneorum delectu & vſu, peſſima illa medicorū conſuetudo meritò reiicienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno ægrotantium incōmodo; qua in compositione remediorum omnia quæ commendata ſunt vel ad morbum, vel ad partem affectam, vel aliquod ſymptoma, congerunt temere; & cū omnia ſimilia vſurparunt, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamēto ſubſtitui poſſit. Quòd ſi vna, duabus, vel tribus herbis contenti eſſent; numquam ſuccedaneo deſtitueretur pharmacarius. Sin autem quantitas neceſſaria foret, pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo conſequentur cōmoda; certior medicamenti operatio, facilior & citiſſima præ-

præparatio; pluribus remediis & succedaneis summo artis Medicę ornamēto abūdabit medicus, cui iterare, immutare, supponere pharmacæ licebit, & plura quàm vulgus Medicorum & Clinicæ sapere. Vt si in suo decocto Boraginē præscribat; ea si defuerit, Buglossum agreste substituet, vel contrà: si Scariola defuit, succum substituere vel syrupum licebit: si Cichorium, Dens leonis, vel Endiuia: si Chamæpitys, Chamædrys substituatur, si defuit, vel contrà. Sed quid faciet, si omnia congerantur in vno eodemq. medicamento? certè nihil aliud erit, quàm poëticum illud chaos,
Rudis indigestaque moles.

Illud Villanouani ante oculos voluant, vbi in promptu habentur simplicia, dolum esse si quis compositis vtatur.

A praua igitur consuetudine recedant, & illos tamquam scopulos vitent: caueant item malos, auaros, improbos, indoctos & impudentes pharmacarios, qui nummi & lucri rapaces, farraginem medicamentorum etiam semiputridorum collaudant. Quidam hoc faciunt vt copiam ostentent, vel ignorantia, vel superbia; & aliqui docti, ne videantur in remedium cognitione minus exercitati.

Por-

IMITATIONE RONDELETII. 479

Porro cum sint quædã compositiones utiles
priscis medicis excogitatę, experiętia & ratio-
ne receptę & cõprobata, nonnulla succedanea
inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, vt
parari possint nobilissima pharmaca, quę ea
ratione minimę excludenda & reicienda: cum
non tanta infelicitate succedanea quædã illis
non inferiora interdum æquę bene expleant
omnes pollicitationes genuini medicamenti.

SUCCEDANEA, QUANTVM FIERI
potest, eiusdem sint generis
& speciei.

Rondelet. Herba pro herba.
Radix pro radice.
Flos pro flore.
Semen pro semine.
Succus pro succo.
Lachryma pro lachryma.
Resina pro resina.
Muccago pro mucagine.
Metallum pro metallo.
Lapis pro lapide.
Terra pro terra.
Pix pro pice:
Axungia pro axungia.

Medulla

Medulla pro medulla.

Auis pro aue.

Serpens pro serpente.

Pars animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COM-
POSITIONE.

Puluis pro puluere.

Trochiscus pro Trochisco.

Opiata pro opiata.

Electuarium pro electuario.

Pilulæ pro pilulis.

Eclegma pro eclegmate.

Tabella pro tabella.

Confectio pro confectioe.

Conseruatio pro conseruatione.

Syrupus pro syrupo.

Emplastrum pro emplastro.

Oleum pro oleo; siue simplex, siue
compositum.

Vnguentum pro vnguento.

THEO-

IMITATIONE RONDELETII. 481
THEOREMA VNIVERSALE
VEL COMMUNE.

Medicamentum
quod substitui
debet, siue in-
ternis, siue ex-
ternis conueni-
re debet

viribus occultis, mani-
festis, & consisten-
tia.

Sit etiam simile in
Sapore,
Odore,
Ætate,
Natalitiis & regione
Natura & tēperamento.

Nonnulla in externis remediis supponun-
tur; quibus in internis vti non licet: vt suc-
cus Carpathi substitui potest pro Lactucæ suc-
co in externis: cū tamen venenum sit, non
introsumitur.

Non totum simplex; sed aliquæ partes sub-
stituuntur.

vt Muccago seminis Psyllij pro muccagine
seminis Cydoniorum: non totum semen, quia
pars interior temperamento differt à mucca-
gine, & venenata putatur. Neque etiā Cydo-
nium malum conuenit pro semine suo; quia
viribus & consistentia differt.

h

For-

Formulae quædam in quibusdam remediis sibi mutuo succedunt. vt

Conseruatio, pro syrupo eiusdem simplicis fructus, floris, vel radicis.

Conseruatio Capillorum Veneris, pro syrupo in opiata substitui potest: Sed in syrupo consistencia non potest; quia remedij formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herbarum decoctum substituatur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum Conseruationis; quia in syrupo conseruantur. Vt syr. Conseruationis Citri, pro syrupo è corticibus Citri. Syr. Conseruationis radicis Buglossi, pro syrupo de Buglossò.

Emplastris item pro vnguentis vti licet; & contrà, modò pars affecta assentiatur. vt Emplastro filij Zachariæ, pro vnguento Resumptiuo; & Resumptiuo pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluatur aut malaxetur, nō vtendū, quia emplastra imposita dilatationem costarū & respirationē impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro vnguento albo, nisi inflammatio prohibeat; quæ neque durare neque graua ferre potest.

V A R I A

IMITATIONE RONDELETII. 483
VARIA ALIA MEDICA-
MENTA PRO ALIIS SVB-

*stituere licet, modò vires
correspondeant.*

Pilulæ pro confectionibus; & Confectiones
pro pilulis. vt

Hiera simplex pro pilulis de Hiera & Be-
nedicta; & contrà.

Et pro pilulis pituitosis; Electuarium Dia-
carthami; de Citro solutium.

Pro biliosis, Electuariū de succo Rosarum,
& contrà, obseruata cuiusq. quantitate. Hieræ
& similiū Electuariorū doses augendæ, ob mel-
lis molem, quæ medicamenti vires minuit.

Syrupus pro eclegmate, si lambendo assumi
debeat, vt

Syr. Iuiubarum pro Lohoch sano & experto.

Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Puluis pro trochisco, & contrà, vt

Diarrhodon pro trochiscis diarrhodon.

Trochisci de Squilla, pro eclegmate de
Squilla, aucta vel imminuta quantitate pro
ratione, indicatione morbi, & scopo medici.

In simplicibus partes aliquando religiosè
non obseruantur.

vt Turbith pro Agarico trochiscato, & contrà.

h 2

Hic

Hic simplex pro composito ponitur, vel compositum pro simplici.

pro Agarico Colocynthis in minori quantitate. Carthami duplum & triplum pro Agarico, & contra.

Difficile tamen inuentu simplex medicamentum substituendū, quod verè vndeque omniq̃ue ex parte conueniat; vt testatur Aui-cennas in suo canone; vbi vix reperies duo simplicia medicamenta, aliorum facultate similium pænuria, substitui tutò possint. Quod cum difficillimum foret, ille aliquando duo, interdum tria, pari pondere & mensura, nonnumquã duplicato & triplicato, addita quinta aut octaua parte alterius medicamenti, supponit. Quia paucissima sunt medicamenta quæ omnino simile temperamentum obtineant, aut eandem cōsistentiam, crassitiem, tenuitatem partium, & proprietates occultas.

Variis in compositionibus est medicamentorum vsus.

Vel ob calorem, frigus, humiditatem, siccitatem; in principio primi, in medio & primo gradus, & sic de aliis.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassitiem, lentorem, saporem, odorem, colorē: quare id
quod

IMITATIONE RONDELETTI. 485
quod tēperamento respōdet, sepe dissidet cras-
sitie vel tenuitate partium; vel alia facultate.
vt pro Asaro Acorum substituendum censent.
At in omni operatione nō conuenit. non enim
omnia potest Acorus quæ Asarum. Vrinas qui-
dem & menses ciet: (quare in vreticis tantum
supponendum) vomitum verò excitare, aquas-
que educere, vti Asarum, minimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchusa
substituitur: Sed si ob colorē Anchusa opus sit,
vt in vnguentis, Hyacinthus non conueniet.

Eius verò loco Lacca supponitur, vel Brasi-
lia, Santala rubra, Lacca pictorum, vel Coccus
baphica.

Assa dulcis pro fœtida nō cōceditur propter
odorem, vt Auicennas substituit, in affectibus
vteri, quia odore iucundo vterum sursum alli-
ceret: sequitur enim odorata, fugit fœtida.

Propter saporem quædam vsurpantur; sed
non conueniunt vnde quaque.

Pro Saccharo Mel & Manna substitui po-
terit in quibusdam remediorum formulis, vt
in medicamentis laxantibus; minimè autem
in adstringentibus, quia Manna ventrem sol-
uit magis quam Saccharum vel Mel.

Muccus utilis est in fluxu sanguinis, & ob

h 3

lento-

lentorem vsurpatur Fœnumgræcū, quod muc-
caginem reddit, sed calidā: ideo in sputo san-
guinis reiicienda, quemadmodum in externis
remediis, vt Ophthalmia, in qua oui albumen
præfertur quidem in principio & incremen-
to, in statu verò & declinatione mucago Fœ-
nigræci commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni formula
remedij substituuntur.

vt Myrrha pro Bdellio in pilulis & vnguentis,

Sed in pilulis è bdellio nullo modo cōcedi-
tur, quia sanguinis fluorem & hæmorrhoida-
rum, vt menses Myrrha, elicit.

In substitutis igitur hæc obseruare oportet,
vt suppositicium in locum adulterati genuini
pænuria; eadem efficiat quod ipsum genui-
num præstabat.

Vt si calfaciebat, refrigerabat, humectabat
vel siccabat, adstringebat vel laxabat, vel con-
coquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in cōpositio-
nibus Græcorū, Seriphium vel Santonicum.

Pro Absinthio è Ponto vel Tauro monte,
Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omnium herbarū delectu præ-
stare,

stare, quæ sunt alicuius regionis; modò illam ipsam herbam regionis finitimæ, vel saltem simillimæ assumas. Cuiusmodi est *Craux* vulgò Gallo-provinciæ, siue Creta, vbi Thymus nostras angustifolius & Epithymus optima & copiosissima.

Secundo loco herbæ regionū humidarum, modò æstas squalida fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse Galenus docet in præparatione Theriaces.

Pro Macedonico Petroselino, Petroselinum alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare oportet. nam regio auget vel minuit medicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro Iride Illyrica, Venetam sumemus. & Pro Africana, Florentinam.

R A D I C E S.

pro { Rhapontico, Radix Centaurij maioris, vel nostri Rhabarbari magma, siue Rhabarbarum ad alios vsus prius infusum & expressum. Rhabarbarum torrefactū improbatur à multis propter empyreuma.

Zingibere; Costus, & contrà, vel Helenium, vel Pyrethrum.

h 4

Costo;

(Costo; Pyrethrum.

Aristolochia longa; Rotunda, & contrà;
vel vna pro omnibus.

Acoro, Calamus aromaticus Officina-
rum, & contrà.

Acoro in laxantibus & cientibus vrinas
& menses; Radix Asari.

Asaro, quando purgare & vomitū ciere
opus est; Elleborus, Semen genistæ &
Raphani, vel hæc tria simul.

Galanga; Cyperus rotundus; & contrà.

Calamo odorato Libani; Schœnâthum;
calamus siue Acorus officinarum: si
ad odorem solum; Santalum citrinum
officinarum.

pro

Althæa; radix maluæ hortensis, vel syl.

Asparago altili; Corruda imminuta
quantitate, quia acrior & efficacior.

Rusco; Radix Asparagi, & contrà.

Cortice radice Capparis; Cortex radice
Tamarisci, Sambuci, Ebuli, Populi
& Lauri.

Apij; Petroselini, vel Macedonici.

Gentiana; medietas Asari & radice
Capparis.

Turbith; Thapsiæ radix, siue Turbith
Mesuæ.

Mesue, Agaricus trochiscatus, vel Co-
 locynthis minore dosi.
 Zingibere, Mechin.
 Serpentaria, Iarus, Dracunculus.
 Lapatho, Oxalydis radix.
 Rhabarbaro ad laxandum, succus Ro-
 farum.
 Rhabarbaro ad adstringendum; Hydro-
 lapathi radix, vel Galangæ maioris,
 si calore opus est; si refrigeratione, ra-
 dix Bistortæ.
 Nardo, Nardi species.
 Secacul, radix pastinacæ marinæ.

S V C C E D A N E A Q V A N T V M

FIERI POTEST SINT SIMILIA

*omni ex parte, viribus, genere,
 & specie. ut,*

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Omnes Dauci | Abrotoni, | Brassicæ, |
| species, | Sideritidis, | Calaminthæ, |
| Intubi, | Aconiti, | Cepæ, |
| Adianti, | Veratri, | Chelidoniij. |
| Condrillæ, | Anagallidis, | Costi, |
| Hierachij, | Anchusæ, | Nardi, |
| Rumicis, | Anemones, | Betæ, |
| Absinthij, | Asparagi, | Bliti, |
| | | h s Iu- |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| Iuniperi, | Marrubij, | Aristolochiæ, |
| Sabinæ, | Leucoij, | Valerianæ, |
| Cedri, | Orcheos, | Bituminis, |
| Rhāni Diosc. | Maluæ, | Picis Resinæ, |
| Myrti, | Polygoni ma- | Allij, |
| Piperis, | ris & femine | Porri, |
| Cyclaminis, | Symphyti, | Plantaginis, |
| Ranunculi, | Tribuli, | Panacis, |
| Hederæ, exce- | Rubi, | Pastinacæ, |
| pta Hederu- | Equiseti, | Lychnidis, |
| la terrestri. | Vrticæ, | Conisæ, |
| Rutæ, | Tithymalorū, | Nymphææ, |
| Seseli, | Mercurialis, | Anthemidis, |
| Apij, | Heliotropij, | Verbasci. |
| Rosmarini, | Origani, | |

Et denique omnes, nisi quid proditum inhibeat, vt de Clematide; quarum altera vrere, ventrem laxare, bilem, pituitam trahere scribit Diosc.

Prior verò alui profluvia & dysenterias sedat.

Sic eucumis agrestis, & satiuus: pepo & colocynthis. sed hæc paucis euenire solent.

De partibus etiam obseruandū. nam aliquæ facultatibus differūt, vt Radix mediij menses decocta sistit per aliquot dies sumpta. Semen autem

autem in vino sumptum menstrua pellit.

Iuniperi fructus introsumentur; ramenta
verò occidere produntur.

Coriandri herbæ succus interficere credi-
tur: semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniuersali-
bus, sed potius particularibus niti præstaret:
Nam eorum plerumque est maxima differen-
tia quæ eadem esse putantur.

Sume igitur

Pro folio Indo & Malabathro, folia Citri,
Canellæ vel Malabathri vulgaris.

Pro foliis Lauri; Citri folia.

Papaueris albi; Solani folia; Papaueris nigri
minore quâtitate, vel folia Hyoscyami albi.

Lactuca; Scariolam, & contrâ.

Cichorio syluestri; Dentem leonis.

Pro Dictamni prima specie; secundam, ter-
tiam, vel pulegium.

Calamentha montana prima; secundam, &
tertiam. Sic de similibus.

Chamæpity; Chamædryn, & folia Eupatorii.

Malua syluestri; hortensæ.

Malua arborescente; Althæam.

Thlaspi; Nasturtium.

Mentha; Balsamitam.

Pulegio

Pulegio Regali; Ceruinum, & contrà.

Lepidio Pauli Æginetæ; Drabam, vel Iberida, vel Nasturtium.

Phyllitide; Asplenium siue Scolopendrium, Ceteráchve, & contrà.

| | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|
| Foliis Oleæ vel Lentisci | } Folia | nucum Iuglandis, |
| | | Cupressi, |
| | | Pini, vel Pinastris. |

| | |
|--------------|--|
| Foliis Myrti | } Baccas Myrti, vel Iuglandis nuces immaturas. |
| | |

Thymo; Saturciam, vel Origanum.

Ruta syl. Rutam domesticam siccata maiori quantitate; vel contrà.

Spica Lauēdula; Lauendule species hortenses.

Adianto; Saluiam vitā, Polytrichum, Adiantum nigrum Plin.

Telephio; Portulacam.

Portulaca; Umbilicum Veneris.

Foliis Terebinthi; Lentisci folia.

Myrto alba; nigram, & contrà.

Foliis Myrti; folia Pyri siluestris, Sumachi,

Lentisci, Cotinos, Sorbi, Cydoniorum.

Foliis Oleastris; Oleæ folia.

Foliis Sambuci; Ebuli, & contrà.

Beto-

Betonica; Verbenacam.

Melissa; Marrubiū, & contrā: Corticem Citri.

Apio mōtano; domesticū siccū in maiori dosi.

Cepea; Portulacam.

Nardo montana; Nardum Gallicam.

Philyreæ foliis; Oleæ folia, & contrā. (trā.

Foliis Caprifici; Ficus domesticę folia, & con-

Thymbra; Thymum vel Serpyllum.

Coriandri foliis; Petroselinii hortensis folia, in
externis remediis tantū.

Hypomarathro altero; Coriandrum vel Petro-
selinum domesticum.

Foliis Dauci; pastinacę agrestis vel domesti-
cę folia.

Conisa prima, secundam.

Conisa secunda; tertiam maiori quantitate &
siccata. (trā.

Sanguinalis feminę foliis; folia maris, & con-

Hippuride prima; secundam, & contrā.

Semperuiuo maiore; paruum Vmbilicum
Veneris, & contrā.

Foliis Labruscę; domesticę vitis folia minus
cultę.

Chamælęa; Thymelęam, Chamępityn pri-
mam Diosc. Laureolam.

Alfinę foliis; Helxines folia, & contrā.

Vite

Vite alba; nigram, & contrà.

Bubonio, siue Inguinaria, siue Astore Attico;

Antirrhinum, & contrà.

Foliis Sabinæ; folia Cupressi, Iuniperi,
Cassiam.

Dorycnio; Mandragoram, & contrà.

Draguntio; Ari.

Foliis Abietis; Populi folia.

Eryfimo; Erucam, & contrà.

Foliis Hippolapathi; Lapathi folia.

Foliis Picæ; folia Pini.

Lathyridis foliis; Tithymali folia.

Libanotide sterili; folia Libanotidis coronari

Lepidij foliis; Nasturtij folia.

Nymphæa alba; luteam, & contrà.

Sorbi foliis; Mespili folia, & contrà.

Oxyacantha vera; Pyrastrum.

Foliis Pepli; Tithymali folia.

Pityusæ foliis; Tithymali folia.

Polygoni maris foliis, feminæ folia.

Filice femina; marem.

Seride; Condrillam.

Smyrnio; Apium aut Petroselinum.

Solano hortensi; Halicacabum.

Symphyti Petræi foliis; alterius folia.

Pro Beta alba; nigram.

Pr

IMITATIONE RONDELETII. 495

Pro vnus speciei Tithymali foliis; folia aliorum in laxando.

Pro Tragorigano; Origanum, & contrà.

Pro foliis Tribuli terrestris in refrigerando; folia aquatici; non in humectando.

Pro Hypecoi foliis; folia Papaueris.

Pro Verbasci vnus foliis; aliorum folia.

Pro Spica Indica, Syriaca; Valeriana.

Pro Viticis foliis & semine; Rutæ folia & semen.

Pro Seridis foliis; Lactucæ folia.

Pro Buglosso siue Boragine latifolia; Buglossum angustifolium.

Pro Soncho leui; Sonchum asperam, & contrà.

Pro Fumaria; Senam.

Pro Hyssopo; Origanum, Sampsucum.

Pro Hyperico; Androsimum, Ascirum, Schoenanthum.

Pro Stœbe Diosc. Stœben herbariorum, Iaceam, Scabiosam, Pastoriâ bursam, Bellides, & Gnaphalia.

Pro Halyca, Auenæ ptisanam totam.

Pro Amylo; farinam filiginis siccam.

TA-

TABVLA PRIMA REFERENS CAPSVLAS
RADICVM ET CORTICVM.

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
| 5 | Cosr'vs. | | Cinnamomū siue offic. cassia tenuis | Cortex inter- nus nucis moschatae | Alarum | |
| 4 | Zedoaria | Calamus odoratus | Cassia siue of- fic. cinnatho- mum crassum | Nux moscha- ta | Schoenan- thum | pro Corti- ce thuris |
| 3 | Zerumbet | Galanga maior | Phu | Macis | Spica Nardi | Cortex Pini |
| 2 | Mequin. | Galanga minor | Anthophylli | pro Folio malobathri | Spica Cel- tica | vel Len- tisci |
| 1 | pro Zingi- bere. | Cypero | Garyophyllis | | | |

| Cortic. quercus | Cortic. mali-granati. | Cortic. myrobal. Citrinarum |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Ilicis | Cortex nucis iuglandis | Kebularum |
| Suberis | | Indarum |
| | | Emblicarum |
| | | Bellericarum |

In hac tabella primum reposuimus Zingiber, quia frequentius eo utimur quam Mequim (quod species est Zingiberis) si forte alterum pro altero sumatur, nihil inde mali sequetur. Zerumbet, Zedoariam & Costum in ultimis capsulis reposuimus, quia eis minus frequenter utimur. Hoc modo medicamentis dispositis multo minori negotio medicamenta parabuntur, ut quae frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inueniantur. Adde quod haec medicamentorum dispositio ἀντιπαλλόμενα indicabit. Nam quae in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt, & e contra diminuto pondere. Cum dicimus quantitatem augeri, nolumus duplum substitui; quia haec medicamenta non sunt duplo fortiora, quamquam pro Cinnamomo duplum Cassiae iusserint antiqui substitui: nam si medicamenta

sint adeò imbecilla, satius est eis non uti, quàm duplo pondere substituere ea: nam moles medicamenti auge-
tur, & vis aliorum medicamentorum minuitur. Ut omnia
medicamenta ordine digerantur, oportet locum in mul-
tas classes diuidere, & in vna classe partes superiores at-
que inferiores. In iisdem classibus distinguenda erunt
medicamenta calida, frigida, sicca & humida, tam sim-
plicia quàm composita.

CAPSVLA RADICVM SECVNDA.

| | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 5 | Costus dulcis Arabum | | |
| 4 | Tussilago | Pistolochia | |
| 3 | Helenium | Clematidis | |
| 2 | Iris Floren- tina | Arist. longa | Hermodacty- lus |
| 1 | pro radice Iridis Ve- netæ | Aristolochiæ rotundæ | Asphodeli |

499

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------------------|
| 5 | Grami- nis | | | | | Glycyrrhi- zæ |
| 4 | Aspa- ragi | | Staphisa- gria | | | Tussilagi- nis |
| 3 | Rufci | Oenan- thes | Aristol- chia om- nis | Bryonia | Zedoaria | Cyper |
| 2 | Petro- selini rad. | Rubia maio- ris | Asari | Pyrethri | Costi | Galangæ minoris |
| 1 | pro Apio | Penta- phyl- lo | Cappari | Mequin | Zingibere | Galanga crassa |
| | | | | | | IrideFlo- rentina |

CAPSVLA RADICVM QVARTA.

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 3 Cucumeris agrestis | Centaurei minoris | Polypo- dij | Ellebori vtriusque | | Hermada- ty- lorum |
| 2 Asphode- li | Suc. Rosa- rum | Tur- bith | Ebuli. | Asari | |
| 1 pro rad. Gentianæ | Rhabar- bari | Agari- co | Hermada- tyli | Cyclami- nis | Asphodelo- rum |

CAPSVLA RADICVM QVINTA.

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| 3 Boragi- nis | | Malua- rum | Thapsi barbati | Sphondy- lij | Radix Vlmi |
| 2 Buglossi | Behen rubri | Bismalua- rum | Bistortæ | Pancratij | Consolidæ minoris |
| 1 pro rad. glycyrrhi- zæ. | Behen albi | Lilio- rum | Quinque- folij | Squillæ | Pro radice Consolidæ maioris |

CAPSVLA RADICVM SEXTA.

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|---|-------------|
| 5 | Corticis rad. lauri | Asari | Staphidis agriæ | Behen rubri |
| 4 | Cort. rad. Sâ- buci, & Ebuli | Ari | Clematidis alterius siue Flammulæ | Behen albi |
| 3 | Fraxini, vel Populi | Serpentariæ | Rad. Dentil- lariæ | Boraginis |
| 2 | Rubiaci- noris | Raphani agrestis | Pyrethri | Buglossi |
| 1 | Pro rad. Ru- biæ maio- ris | Cortic. Sam- buci | | Glycyrrhizæ |

TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

4

3

2

1

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Pro sem. Cu- curbitæ | Melonum | Citrulli | Cucumeris |
| Lactucæ | Portulacæ | Endiuæ | Scariolæ |
| Violarum | Papaueris al- bi | Papaueris nigri | Hyoscyami |
| Bombacis | Maluæ, Bif- maluæ | Psyllij | Cydoniorum |
| Lini | Fœnigraci | Lauendulæ | Keyri rubri vel Citrini |

CAPSVLA LIGNORVM.

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| 5 | Citrinum | Xylobalfamum | Scobs Buxi |
| — | Rubrum | Surculi Lentisci | Ebenum |
| 4 | pro Santalo albo | Aspalathus | Guaiacum |
| — | | Ligno Aloës | Echinera- dic. |
| 3 | | | Salaparilla |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

PURGANTIVM.

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. pro Scam- monio | 3 Diseridium | 3 Colocyn- this | 4 Ammonia- cum |
| Sena | Semen Car- thami | Folia Brasicae marinae | 3 Salgemmae |
| Folii Scam- monij | Thymelaeae | Chamaelea | 2 Salpetrae |
| Semine hede- rae | Sem. Afari | Semen Geni- stae | 1. pro Sale nitro |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 4 | Thymus | Chryfocol- la, vel fortè Chryfolith. | Elleborus albus | Alhan- dal | Coccus Cnidius | |
| 3 | Epithy- mus | Lapis Ar- menus. | Niger | Diacri- dium | Semen Ca- taputiæ | Rhaponti- cum |
| 2 | pro Caffi- tha | Lapide La- fuli | Colocyn- thide | Scammo- nio | Rad. Ti- thymali | Myrobala- ni 5. |
| 1 | | | | | | Rhabarba- ro |

| | | | |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Polypo- dium | Rhabarba- rum | Chamæ- læa | Efula |
| Turbith album | Lapathio | Thyme- læa | Turbith |
| Turb. ci- neritio | | Brassica marina | Polypodio |

S E M I N V M.

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------------|
| 5 | Capita pa- paueris | Acetosæ | | | | | Semenvio- larum |
| 4 | Semen Mandra- goræ | Portulacæ | Citrulli | | | | Cnici |
| 3 | S. Hyof- cyami | Scariolæ | Melonum | Bifmaluæ | Foenigræci | | Vrticæ |
| 2 | Papaue- ris nigri | Endiuæ | Cucumeris | Maluarum | Linl | Psyllij | |
| 1 | S. Papaue- ris albi | Lactuæ | Cucurbitæ | Bombacis | Sesami | Cydonio- rum | |

SEMINVM.

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--|-----------|-------------------------|-------------|
| 5 | Cumini | Pastin. syl. | Rutæ agrest. | Sinapi | Semen cō- tra vermes | S. Paliuri |
| 4 | Carui | Pastinacæ domesti- cæ | Rutæ dome- sticæ | Erucæ | Caulium | Hyperici |
| 3 | Feniculi dulcis | Petroselinii | Ammeos | Thlaspi | Rapæ agre- stis | Milij Solis |
| 2 | Anisi | Apij | Seseli Aethio- pici & Pe- loponensis | Nasturtij | Rapæ do- mesticæ | Alkekengi |
| 1 | | | Seseli Maffi- liensis | | | |

S E M I N V M.

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|------------|
| Piper longum | Cardamomi maioris | | 3 | Berberis | Sorbarum |
| Piper album | Cardamomi minoris | Granorum paradisi | 2 | Vuarum immaturarum | Mespilorum |
| Pipere nigro | | Cubebarum | 1 | Spinæ albae | Cornorum |

pro { semine Myrti, Berberis, & contrā. Mandragoræ, Cicutæ.
 Napi; Rapi. pro { Semine Afari, Semen
 Carthami, Vriticæ, vel Agaricus Genistæ.
 non Trochiscatus.

SEMINVM ET FRVTICVM.

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 5 | Geni- stæ | Aceto- stæ | Gallarum | Cytini | Vua Co- rinthia | | Ficus |
| 4 | Afari | Citri | Sumach | Balaustio- rum | Passulæ mundatæ | Tamar- Indi | Sebesten |
| 3 | S. He- deræ | Berbe- ris | Myrtillorū | Cortic. maligra- nati | Dactyli | Prunis acidis | Iuiubæ |
| 2 | | | | | Pruna dulcia | | Passulis mundatis |
| 1 | | | | | Ficubus | | |

CAPSVLA FLORVM.

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|
| 3 | Oenanthes | Cichorei | Nymphææ luteæ | Sambuci | Saluæ | Genistæ |
| 2 | Myrti | Buglossi vul- garis | Nymphææ albæ | Meliloti | Stœcha- dis | |
| 1 | Florib. Rofarū siue boraginis | Buglossi latif. | Violarum | Chamæ- meli | Anthos | Sambuci |

| | | | |
|---|------------|---------------------------|------------------------------|
| 3 | Leucoij | Flor. Cicho- rei | Spicæ, vulgo <i>Aspic</i> |
| 2 | rubri | Flor. Intubi domestici | Lauendulæ |
| 1 | Leu. lutei | Flor. Genistæ | Flor. Saluæ |

Pro Acaciæ succo; succus Prunellorum probatur, & Rhois, Diosc.

Dioscorides succum Hypocystidis substituit: verum aliquanto magis adstringit & ficeat, si in antiquorum pharmacis recipiatur.

Pro Opio, Meconium; vel succus Lactuæ syl. vel domesticæ, quantitate maiori.

Pro Absinthij succo; Abrotoni, Eupatorij, vel Centaurei minoris vtriusque, vel Agerati.

Pro succo Absinthij Pontici; nostratis Romani succus: differt tantum regione, vt Macedonicum à Pontico. In externis remediis, Santonicum & Marinum; vel ablutum leuiter in internis concedatur.

Pro Opobalsamo; Stacte. i. styrax liquida non adulterata, vel oleum Myrrhæ. In suffusionibus ad digerendum; Oleū Spicæ Læuendulæ, quod æquè tenuium est partium.

Pro Glycyrrhizæ succo, infusum & decoctum eiusdem; vel succus vuarum passularum; vel vinum coctum, siue sapa.

Pro Lycio; Amurca.

Pro Citri succo; Limonum.

Pro Thymelææ; Chamælææ succus.

Pro Cyclaminis; Iridis.

Pro

512 DE SVCCEDANEIS.

Pro Omphacij; Rhois, & contrà.

Pro Aloë; Absinthij succus.

Pro Semperuini; Cotyledonis succus & cōtrà.

Vel Solani, Lactucæ.

Pro Sanguine Draconis; Laccam sustinuit
Auicennas.

Pro Elaterio; succus cucumeris agreſſis ali-
quantum coctus.

Pro Sapa; vinum dulce, & contrà.

Pro Licio; Gentianæ succus in vlceribus.

Pro aqua fontana; fluuiatilis.

Pro aqua plu. fluuij potius quàm fontana, con-
trà quàm Galenus præcipit in Diacodio,
quia composita est partim ex pluuiâ, par-
tim ex fontibus.

DE LIQVORIBVS
ET LACHRYMIS.

Pro Opobalsamo, Staete siue myrrha liquida
natura vel arte parata: Liquor Terebinthi.

Non { Opocarpalum, vt auctor Succeda-
neorum præcipit,
Olenm laurinum.
Liquor myrti.

Non semen Myrti, & Zedoariæ, vt præcepto-
res nostri statuerunt. pro Carpobalsamo se-
men

men Lentisci vel Terebinthi, cuius multæ
sunt species. Cubebæ in minori dosi; vel
Terebinthi partes duæ, vna Cubebarum.

pro Cedria { Oleum è ramentis Iuniperi pa-
ratum per descensum.
vel Gummi Iuniperi.

Pro Xylobalsamo, surculi Lentisci.

Pro Oleæ lachryma; G. Elemni.

Pro Myrrha; Bdellium, vel succus Smyrniij,
vel Apij.

Pro Opopanace; Ammoniacum; vel Galba-
num; vel Bdellium, maximè cum emollire
volumus. Gal. vsus est Propoli in externis.

Pro Manna thuris; cortex cui adhæret ali-
quid thuris.

Pro Thure; Mastiche & resina pini sicca.

Pro Styrace; Benzoinum.

Pro Terebinthina; Mastiche.

Pro Mastiche; Abietina resina indurata aut
frixæ, vt docet Diosc.

Pro Cupressina; Laricina.

Pro Abietina; Resina pini.

Pro Pice, Resina pini cocta.

Pro pice liquida; pix oleo dissoluta, vel pix ex
oleo Iuniperi liquefacta.

Pro Pissasphalto; pix & bitumen.

k

Pro

515 DE SVCCEDANEIS.

Pro Mumia; Pissasphaltum.

Pro Asphalto; Petroleum; vel Gagates, & contrà. Et carbones petræi è terræ visceribus, quibus fabri ferrarij vtuntur.

Pro Lacca; Myrrha.

DE MINERALIBVS.

Pro Antimonio; plumbum vstum, & contrà. Auicen. & Stannum vstum.

Pro Lithargyro; plumbum vstum, Molybdæna.

Pro Plumbo, Stannum.

Pro Flore æris, ærugo.

Pro Spodio; Antispodium ex myrto, lentisco, olea, oleastro, malo cydonio, vel cornu cerui vstum.

Pro Pompholyge; Spodium Diosc.

Pro Cadmia; Lapis calaminaris.

Pro Sandaraca Græcorum; Auripigmentum, & contrà.

F I N I S.

INDEX IN VAL. GORDI

RECEPTARIUM.

A.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Abrotonum | 343, 344, 347, 348 |
| Abſinthii Ponticum | 161, 341 |
| Abſinthium Romanum | 161, 324 |
| Abſinthium ruſticum | 161, 324 |
| Acacia | 125, 135, 425 |
| Acacia ſuccedanea | 388 |
| Acacia ſuccedanea | 125, 135, 135 |
| Acini | 359 |
| Acori loco quid | 359, 79 |
| Acorus | 268 |
| Acorus verus quid | 76, 225, 139 |
| Adiantum nigrum | 208 |
| Adipum præparatio | 383 |
| Adulteria ſimplicium med. | 425 |
| Aeromeli | 269 |
| Aerugo | 353 |
| Agaricus Trochiſcatus | 287 |
| Ageratum | 49 |
| Agreſta | 136 |
| Albatecha | 289 |
| Alleluia | 340 |
| Aloës præparatio | 379, 380, 396 |
| Alum | 102 |
| Alvpias | 196 |
| Alypias loco quid | ibid. |
| Alypum | ibid. |
| Alzanahan, alchanach, alzanach | 369 |
| Amaracus | 159, 273, 274, 275, |
| Amarena ceraſa | 198 |
| Ambra | 297, 298 |
| Anientum dulce | 355, 356 |
| Amomi loco quid | 97, 79, 125, 146, 226, 265, 275 |
| Amomum verum | 97, 99 |
| Amomum falſe | 96, 97, 99, 145 |
| Amylum | 40 |
| Angelica | 72, 139 |
| Anguria | 211 |
| Animalium partium delectus | 425 |
| Anthera | 291 |
| Antiballomena | 403 |
| Antophylli | 26 |
| Apparine | 345 |
| Aquæ marinæ loco quid | 308 |
| Archeutida | 278, 331 |
| Aristoloch. rotunda | 12, 196, 297, 306, 307 |
| Aristol. tenuis | 126, 132 |
| Aromaticum Garyophyl. | 101 |
| Aromaticum roſatum | Gal. 231 |
| Aromaticum Indicorum libel- | 22 |
| lus Garçiz | 22 |
| Arthanita | 361 |
| Arrimonium | 163 |
| Arum | 134, 175 |
| Aſarum | 45 |
| Aspalathi loco quid | 273, 274, 275, 276, 277 |
| Aspalathus | 275, 274 |
| Asphaltum | 115 |
| k 2 | Asple- |

I N D E X.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Asplenium | 169, 173, 308 | Calamus arom. | 268 |
| Aurea Alexandrina | 94 | Calamus vnguentarius | 279 |
| Auri & argenti limaturæ | 27 | Camphorata | 341 |
| Aurum aut argent. foliatum | | Capillus Veneris verus | 208 |
| merum | 66 | Carabe | 298 |
| Aurum coctum | 96 | Cardanum | 23, 24 |
| | | Carduncellus | 340 |
| Balanus Myrepica | 328 | Carduus benedictus | ibid. |
| Balaustium | 100 | Carneola | 61 |
| Balsami loco quid | 52, 53, 94, 283 | Carolina | 178 |
| Balsamita | 53, 338 | Carpobalsami succedanea | 27, 53, 276, 317 |
| Balsamum quid significet | 98, 283 | Carpobalsamus | 317 |
| Bardana | 357 | Caryon myrepicon | 312 |
| Batega | 289 | Carydion | ibid. |
| Baucia | 112 | Caryota | 112 |
| Bedeguar | 178, 221 | Caulis agrestis | 106 |
| Benedicta laxatiua | 226 | Cassa | 128, 302 |
| Bitumen Iudaicum | 115 | fistula | 53, 123 |
| Blatta Byzantia | 278 | extracta sine fol. Senæ | 206 |
| Borax | 355 | extracta cum fol. Senæ | 207 |
| Branca vrsina | 106, 338 | extracta pro clyster. | ibid. |
| Brassica siluestr. | 106 | lignea | 24, 53 |
| Buglossa domestica | 228 | Cataputia maior | 328 |
| Buglossa siluestr. | 316 | Catharticum Imperiale | 240 |
| Buglossa vulgaris | 186 | Cathengit | 362 |
| Bulbi sem. loco | 110 | Catholicon | 215, 216 |
| Bunias | 122, 127 | Celtica | 240 |
| Bupthalmum | 340 | Centumnerua | 339 |
| Burungi | 93 | Cerotum infrigidans Gal. | 365 |
| Cachrys | 140 | Santalinum | ibid. |
| Calamintha campestris | 28 | Stomachale | 366 |
| Calamint. domestica | 166, 167 | Oeterach | 169, 209 |
| Calamint. montana | 28 | Cinnamum | 32, 316 |
| Calamint. sil. | 167 | Cinnamomum crassum | 32 |
| Calami arom. veri loco quid | 273, 274, 276, 278, 301 | tenue | ibid. |
| | | Chalcitis | 124, 125, 126 |
| | | Chalcitidis assatio | ibid. |
| | | Chal. | |

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| Chaleu-cecaumenos | 376 | Cymbalaris | 357 |
| Chamædrys | 58,60 | Cyminum Carmentum | 251 |
| Chamæmelum | 368 | Cyperis | 56,57 |
| Chamæpitys | 124,159,221 | Cyperus rotundus & longus | 57 |
| Cherua | 328 | Cyphi trochisci | 134 |
| Cheyri | 283,323 | D Arseni | 32 |
| Colocynthis preparatio | 382 | Dauci Cretici loco quid | 59,81,95,125,131,132 |
| Comæ | 29,123 | Daucus Creticus quis | 54 |
| Condita varia | 147 | Denarius | 239 |
| Confectio cordialis | 65 | Dentalium | 355 |
| Hamech maior | 219 | Diacalamintho Gal. | 29 |
| Hamech minor | 221 | Mesuæ | 28 |
| Liberans | 63 | Diacameron | 26 |
| Anacardina | 93 | Diacarthamum | 232 |
| Confectiones aromaticæ | 20 | Diacatholicon | 215 |
| Opiatæ | 78, & seq. | Diacodion Actuarij | 101 |
| Conyza | 336 | comp. Mesuæ | ibid. |
| Conseruarum faciendarum ratio | 148 | simp. Mesuæ | 100 |
| Conseruæ variæ | ibid. | Diacasia cum Manna | 205 |
| Consolida maior | 103 | Diacastorium | 103 |
| Corallium rutilum | 102 | Diacinnamomum | 31 |
| Corticum delectus | 422 | Diacydonium simplex | 149 |
| Costus | 26,45 | è succo cydoniorum | 151 |
| hortensis | 345,346 | compos. | 150 |
| Cotula maior | 457 | Diacorum | 75 |
| Crassula | 339 | Diacostum | 45 |
| Cretamus agrestis | 148 | Diacuminum | 30 |
| Crinon | 315 | Diacureuma maior | 50 |
| Crispula | 340 | Diadamasenum | 214 |
| Crithmum spinosum | 77 | Diagalanga | 39 |
| Crocus Cilicius | 122,123 | Diahyssopum | 44 |
| Coricius | 130 | Diairis Salomonis | 41 |
| Croton | 328 | simplex | ibid. |
| Cubebæ | 278 | Dialacca maior | 47 |
| Cyanea glycyrrhiza | 230 | Diamarenatum comp. | 198 |
| Cyclamen | 361 | simpl. | ibid. |
| | | Diamargaritum calid. | 35 |
| | | | frigid. |

| I N D E X. | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------|
| frigid. | 34 | Dosis Specierum ad libram | |
| Diambra | 25 | vnam mellis | 79 |
| Diamoron | 196 | Drosomeli | 259 |
| Valerij Cordi | 197 | Dulcis radix | 102 |
| Diamoschum amarum | 38 | ELaterium | 254 |
| dulce | 37 | Elect. de baccis Lauri | 108 |
| Dianisum Mesuae | 24 | Diapæonias | 73 |
| Dianthos | 33 | Ducis | 58 |
| Diapolibanum | 78 | Eleischof | 227 |
| Diapapauer | 201, 202 | Episcop. | ibid. |
| Diapenidion | 40 | Latitiae Gal. | 66 |
| Diaphœnicon | 222 | de Gemmis | 60 |
| in forma solida | 224 | Indum maius | 216 |
| Diaprasium | 51 | Indum minus | 218 |
| Diaprunum comp. laxat. | 215 | Iustinum | 62 |
| composit. | 212 | Lætificans Rasis | 67 |
| Diarrhodon abbatis | 46 | Lenitium | 208 |
| Dihsatyrium Mesuae | 110 | Lenitium de Manna | 209 |
| Nicolai | 109 | Plurifarcoticon | 68 |
| Diasena | 225 | de Psyllio | 227 |
| Diathamaron | 25, 26 | Resumptrium | 74 |
| Diatragacanthum calid. | 42 | Rosarum Mesuae | 229 |
| frigid. | ibid. | de succo Rosarum in forma | |
| Diatriopipereon | 57 | solida | 230 |
| Diatriopsantalum | 55 | de Sebeste | 210 |
| Diaturbith cum rhabarb. | 230 | Elelisphacon | 95, 342 |
| minus | 231 | Ellebori nigri extractio | 393 |
| maius | ibid. | Emplastr. album coctum | 376 |
| Diaxyloaloes | 56 | Apostolicon | 373 |
| Diazingiber | 58 | Apostolicon aliud | 375 |
| Dictamnus Creticus | 123 | de baccis Lauri | 378 |
| Diptamnus vulgaris | 271 | Basilicon magnum | 377 |
| Diploma | 300, 301 | de Crusta panis | 378 |
| Dosis sacchari ad conseruas | | Diachylon compos. | 367 |
| 149 | | Diachylon magnum | 368 |
| Dosis Specierum ad libram | | Diachylon paruum | 369 |
| vnam sacchari in confect. | | Diachylon simpl. | 366 |
| Solidis | 20 | Griseum | 377 |
| | | de | |

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| de Melloto | 369 | Gallæ cupressi | 291, 292 |
| de Mucilag. | 367 | Gallion | 142, 339, 345 |
| Oxyroceum | 372 | Gemmæ Populi | 227 |
| Triapharmacum | 372 | Gentiadis radix | 131 |
| Viride | 377 | Gersa serpentariæ | 355 |
| Endiuia vera | 167 | Gersam faciendi modus | 384 |
| Entallium | 355 | Glandes siue suppos. | 242 |
| Epatis lupini præparatio | 385 | Glans vnguentaria | 328 |
| Epitaphium Val. Cordi | 416 | Gleba Armena | 102 |
| Eruce semen | 93 | Gluten Alchanach, alzana- | |
| Esbrium | 343, 348 | han, alzanach | 369 |
| Eldre Antidotus Actuarij | 146 | Glycyrrhiza | 20 |
| Antidotus Aëtij | 142 | Grana Solis | 226, 247 |
| Esulæ præparatio | 383 | Granum Ben | 328 |
| Eupatorij eiusque succi succe- | | Gratiola | 49, 249 |
| daneum | 49, 178 | Gummi splendidum | 131 |
| Eupatorium | 49, 249 | Arab. | 125 |
| Extractiones purgantium me- | | vermiculatum | ibid. |
| dicament. artificiosæ | 392 | H alus, aut Halum, siue | |
| Foeniculus porcinus | 54, 71 | Alum | 102, 103 |
| Filix | 362 | Harmela | 268 |
| Fisticum | 111, 112 | Helenium | 316 |
| Flores castæ fistulæ solutiæ | | Hepatis lupini præparatio | |
| 204 | | 385 | |
| Florum delectus | 421 | Hepatica | 209 |
| Flos aris | 334 | Herba crassula | 339 |
| Folia Caryophyllorum | 223 | Judaica | ibid. |
| Folij succedaneum | 20, 21, 56 | Sanctæ Mariæ | ibid. |
| 69, 73, 140, 142, 178, 273, | | Moschata | 340 |
| 274, 293 | | Paralysis | 149, 339 |
| Folium | 21, 22 | Turca | 340 |
| Indum | 124 | Venti | 344 |
| Malobathri | 129, 133 | Herbarum delectus | 420 |
| Fraxinella | 271 | Hibiscus | 352, 353 |
| Fructus Balsami | 129 | Hiera Pachij | 238 |
| Fructuum delectus | 472 | picra composita | 234 |
| G Alanga magna | 20, 21 | picra cum Agarico | ibid. |
| rufa | 21 | picra simpl. | 233 |
| | | k 4 | picra |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|
| picra Rhafis ad pilul. coch. | | Lichen | 209 |
| 230 | | Liguſtrum | 321 |
| Hieralogodium | 235 | Limatura auri, argenti | 27 |
| Hypocytis | 101 | Limaturæ ferri præparat. | 381 |
| Hyſſopus humida | 369 | Lingua auis | 90, 111 |
| Iarus | 336 | ceruina | 173, 345 |
| Iaſme | 322 | Lithontribon | 70 |
| Iatmini flos | ibid. | Lohoch ad aſthma | 203 |
| Indicorum aromatum libellus | | de Papauere | 201 |
| Garcie | 22 | de Pino | 200 |
| Imperatoria | 72 | de pulmone Vulpis | 203 |
| Infuſio Roſarum | 161, 162 | ſanum & expert. | 199 |
| Violarum | 162 | de Scylla | 202 |
| Iris Illyrica | 86 | Luph planû, & Luph criſpum | |
| Iua | 124 | 110, 112 | |
| arthritica | 159 | M Abathematicum | 106 |
| moſchata | 221 | Macedonicum | 60, 70 |
| Iulep Roſatum | 187 | Macropiper | 266, 302 |
| Violatum | 188 | Magma Hedychroum | 130 |
| Iuncus Arabicus | 128 | Maiorana | 273 |
| odoratus | 142, 146 | Malobathrum | 124 |
| Iuniperus magna | 278 | Malobathri folium | 129, 133 |
| L Accæ ablutio | 380 | ſuccedaneum | 124, 129, 131, 276 |
| Lachryma Terebinthi | 130 | Malum terræ | 238 |
| Lachrymarum delectus | 424 | Mameræ loco quid | 147 |
| Lapathiolum | 339 | Mandragoræ pomorum ſucci | |
| Lapis Armenus | 225 | pænuria quid | 303, 304 |
| cancrorum | 298 | foliorum loco quid | 357 |
| Lappa maior | 357 | Manna Orientalis | 259 |
| Laffulata | 346 | Manus Chriſti perlata | 43 |
| Lauendula | 329 | Marathrum | 344 |
| Laureola | 335 | Marum | 273 |
| Lepidium maius | 254, 268 | Mari loco quid | 273, 276 |
| Lepis chalcu | 376 | Matricaria | 344 |
| Leucopiper | 302 | Matris ſilua | 340 |
| Libanotidis ſpecies | 139 | Maturella | 340 |
| Libanum | 372 | Medulla ceraſorum | 297 |
| Libra medicinalis | 20 | Mc- | |

I N D E X.

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| Medullarum præparatio | 386 | Zaxenea | 80 |
| Medulla prunorū acetos. | 212 | Muzus Sapor | 165 |
| Mei loco quid | 71,72,130,131 | Myrobal. nigri | 251,254 |
| Mel Anacardinum | 192 | Myrrha Troglodytica | 122 |
| Emblicorum | ibid. | Myrrha | 344,348 |
| odoratum aromaticū Dan- | | Myrtus | 312,348 |
| tiscanum | 165,166 | NAbuch | 195 |
| Rosatum | 189 | Napus | 97,112,122 |
| Rosatū aliud efficacius | 190 | Nardi Indicæ loco quid | 142 |
| Passularum | 192 | Nardus Celtica | 86,134 |
| Tabarzet | 200 | Galatica | 128 |
| Melanopiper | 302 | Indica | 139 |
| Mellis Attici loco quid | 139 | Nardus quid | 62,73 |
| Melon magnus Indus | 289 | Nasalia | 242 |
| Mentha aquatica | 312 | Nasturtium album | 251 |
| crispa | 342 | Nenuphar | 34,182 |
| Græca | 345 | Neromisch | 67,68 |
| Romana | 346 | Nerion | 146 |
| Saracenica | 340,346 | Nigra spina | 131 |
| Mentaltrum | 288 | Nihil album | 358 |
| Meum | 54,71,72 | Nucleus seminum quid | 34 |
| Meu | 71,72 | Nux Indica moschata | 318,319 |
| Meu loco quid | 80,96,124 | Myristica | 59 |
| Mezerei præparatio | 383 | Vnguentaria | 318 |
| Michleta | 107 | Nymphæa alba & lutea | 34 |
| Milium Solis | 226 | 182 | |
| Mira solis | 329 | OBolus | 139 |
| Mithridatiū Andromachi | 140 | Oculicancrorum | 298 |
| Damocratis | 133 | Ocymum citratum | 37 |
| ex Cleopatro & Antipatro | 136 | Oesypus | 362,369 |
| Mina cydoniorum arom. | 188 | Oesypum faciendi modus | 386 |
| Cydoniorum simp. | 188 | Oleander | 146 |
| Moschocaryon | 318 | Oleorum destillatio artificio- | |
| Moschus | 23 | sa | 396 |
| Mucharus | 163 | Oleum Absinthij | 324 |
| Muria | 308 | Amygd. amarorum | 327 |
| Musa Enea, siue Egetea vel | | Amygd. dulcium | ibid. |
| | | Anethrum | 320 |
| | | k s | Bala- |

V N D E X.

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|----------------|
| Balaninum | 328 | Sambucinum | 322 |
| de Cappare | 308 | Sampfuchinum | 311 |
| Castorei | 305 | Scorpionum compos. | 306 |
| Chamaemelinum | 320 | Scorpionum simp. | ibid. |
| de Cherua | 328 | Sesaminum | 330 |
| Cheyrium | 323 | Spica | 329 |
| Coffinum | 301 | Tartari | 310 |
| Cydoniorum | 310 | Terebinthinæ | ibid. |
| de Euphorbio | 305 | Violaceum | 325 |
| Formicarum | 307 | Vitellorum ouorum | 312 |
| Hyoscyami | 329 | Vitrioli | 400 |
| Hyperici | 313 | Vulpinum | 308 |
| Iasminum | 322 | Olus-atrum | 29, 60, 63, 70 |
| Irinum | 313, 317 | Omphacinum oleum | 311 |
| ex Iuniperi granis | 300 | Omphacium | 156 |
| ex Iuniperi ligno | 299 | Onyx | 278, 298 |
| de Lateribus | 309 | Opium in oleo dissolui non potest | 303 |
| Laurinum | 329 | Opobalsamum succedaneum | |
| Ligustrinum | 321 | Euritij Cordi | 331 |
| Lilinum | 321 | Opobals. succedaneum | 27, 50, |
| Lumbricorum | 307 | 70, 105, 113, 122, 133, 273, | |
| Mandragoræ | 303 | 276 | |
| Mastichinum | 304 | Opobalsamum | 97, 98 |
| Menthæ | 324 | Orchys | 112 |
| Moschelinum | 317 | Origanum Creticum | 251 |
| Myrtillorum | 323 | Orientale | 87 |
| Myrtinum | ibid. | Origani Persici loco quid | 88 |
| Narcissinum | 321 | Origanum Persicum | 87, 251 |
| Nardinum compos. | 301 | Oxymel compos. | 190 |
| Nardinum simp. | 300 | simpl. | ibid. |
| ex Nymphaea citrina | 326 | Scyllit. comp. | 191 |
| Nymphaeatum album | 325 | Scyllit. simpl. | ibid. |
| Papaueris | 329 | Oxyfaccchara compos. | 173 |
| de Piperibus | 302 | simplex | 172 |
| Populinum | 326 | PAEonia | 68 |
| Populinum aliud | ibid. | Palma Christi | 328, 329 |
| Rosaceum | 325 | Panis porcini | 361 |
| Ruta | 319 | Papauer | |

I N D E X.

| | | | |
|--|--------------|---------------------------|---------|
| Dapauer rubrum | 344 | Benedictæ | 250 |
| Paralyfis herba | 339 | Cochiæ Rhafis | 250 |
| Parietaria | 344 | de Colocynthide | 251 |
| Pastilli Theriaci | 113 | de Cynoglossa | 269 |
| Pastinaca marina | 77 | de Eupatorio | 252 |
| Pelecini pœnuria quid | 139 | de Euphorbio | ibid. |
| Perficaria | 339 | Fœtidæ maiores | 253 |
| Periclymenum | 340 | Fœtidæ Rhafis | 253 |
| Perfici flor. & fol. vapor & destillata aqua aluū soluunt | 204, 205 | de Fumo terræ | 254 |
| Petroleum clarū flauum | 105, | de Hermodactylis | 255 |
| 330 | | de Hiera compos. | 256 |
| nigrum & crassum | 331 | de Hiera cum Agarico | 257 |
| Petrofelinum agreſte | 53 | de Hiera ſimpl. | 256 |
| Macedonicum | 29, 60 | Imperiales | 265 |
| Pharmacopœus qualis eſſe debeat | 13 | Indæ | 255 |
| Philoniū ex Gal. & Aegin. | 83 | de lapide Armenio | 258 |
| maius, ſine Romanum | 81 | de lapide Lazuli | 257 |
| Mefuæ | 82 | lucis maiores | 259 |
| Perficum | 83 | lucis minores | 260 |
| Phifticum | 58 | Maffichinæ | 260 |
| Phu | 97, 131, 340 | de Mezereo | 258 |
| Phyllitis | 173 | Peftilentiales | 263 |
| Phyllon | 143, 145 | de Oſto rebus | 267 |
| Pilul. de Agarico | 247 | de Opopanace | 266 |
| aggregatiuæ | 248 | de Quinq. gen. Myrob. | 266 |
| alephang. | 243 | de Rhabbarbaro | 262 |
| alephang. Val. Cordi | 269 | de Sagapeno | 267 |
| de Aloë & maffiche | 261 | de Sarcocolla | 263 |
| de Aloë lota | 262 | Sine quibus | 263 |
| Arabiciæ | 245 | Stomachicæ Alkindi | 264 |
| Arthriticiæ | 246 | Stomachicæ Mefuæ | 269 |
| Aſſaiæret | 245 | Pillularum maſſæ extract. | 395 |
| Aureæ | 248 | Pimpinella Germanica | 339, |
| de Bdellio | 168 | 345 | |
| Bechiæ | 269 | Pimpinella Italica | 343 |
| | | Pinguedinum præparatio | 386 |
| | | Piper nigrum | 29, 123 |
| | | Piftacium | 58, 111 |
| | | Planta- | |

I N D E X.

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Plantago maior | 339 | R Adicum delectus | 417 |
| Plumbi præparatio | 381 | Radix concaua | 296 |
| Polium montanum | 123 | Ranich | 100 |
| Polytrichon | 339 | Raued | 285 |
| Pompholyx | 358 | Raued Seni | 178, 249, 252, 259 |
| Ponderum ratio | 388 | Requies Nicolai | 85 |
| Prasium viride | 376 | Rha siue Rheu Pontici pænu- | |
| Primula Veris | 149 | ria quid sumi possit | 26, 144, |
| Propolis | 374 | | 274 |
| Prunorum siluest. vapor & | | Rhabarbari extractio | 394 |
| aqua destill. aluum soluunt | | Rha Ponticum verum | 98, 126 |
| 204, 205 | | Rhodostagma | 283 |
| Prunus siluest. | 360 | Rhus culinarium, obsoniorum | |
| Pseudodictamnus | 271 | | 103, 145 |
| Pulegium ceruinum | 288 | Ricinus | 328 |
| Pulicaria | 336 | Rob de Berberis comp. | 196 |
| Pulmonis Vulpini præpara- | | de Berberis simp. | ibid. |
| tio | 385 | Ceraforum | 197 |
| Pulpa Casia fistulae solut. | | Nucum | 196 |
| 204 | | de Ribes comp. | 195 |
| Ceraforum | 197 | de Ribes simplex | ibid. |
| Prunorum | 212 | Rosa asinina | 68 |
| Sem. Asparagi & Rusci | | Rosata nouella | 72 |
| 111. 226. 247 | | Rosmarinus | 139 |
| Thamarindorum | 206 | Rubricæ Lemniæ loco quid | |
| Puluis ad Epithemata cordis | | | 137 |
| 77 | | Rubus Idæus | 197 |
| ad Epithemata hepatis | 78 | Ruscus | 226 |
| ad Glandes vel Supposito- | | S acchari libra in confectio- | |
| ria | 242 | nibus quantum specierum | |
| Puluis aut Tragea laxat. | 241 | requirat | 20 |
| medicaminis Turbith | 240 | Saccharum Tabarzet | 31, 229 |
| Senæ præparatæ | 241 | Sagapenum | 102, 125, 126 |
| Sternutatorius | 242 | Sal Hammoniacum | 105, 106 |
| Punica siluest. flos | 202, 147 | Salis Indi loco quid | 255, 258 |
| | | Saliunca | 27, 86, 95 |
| | | Salpetra | 355 |
| Q Vid pro quo | 465 | Salvia Romana | 345 |
| | | Sampsa- | |

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Sampfuchus | 273, 301 | Seta cruda | 39 |
| Sanguiforba | 339 | Sextarius | 101, 343 |
| Sanguinis Hirci præpar. | 385 | olei | 315 |
| Santalum Machoziri | 21, 22 | Sicilicus | 102 |
| Moschatellinum | 34 | Sigilli Lemnij loco quid | 124 |
| Sapa | 181, 248 | Sigillum Eemnium | 114, 124 |
| Sapphiri loco quid | 65 | Siler montanum | 29, 124 |
| Sapphirus | 61 | Simplex absolutè scriptum | |
| Sarda gemma | 61 | quid denoter | 434 |
| Satyrium | 109, 112 | Simplicium delectus | 417 |
| Saxifragia | 53, 63, 160, 240, 345 | Sinapi album | 93 |
| Scammoneæ præparatio | 382 | Sinnus | 97 |
| Scariola | 47, 55, 182 | Sinon | ibid. |
| Scatuncellum | 357 | Sinonum | 53, 97, 99 |
| Schoenanthum | 45, 48, 114 | Syrup. de Absinthio maior | 161 |
| Schoenon | 133, 138, 275, 277 | Acetositis Citri | 154 |
| Scyllæ præparatio | 383 | Acetositis Limonum | 155 |
| Scincus | 109 | Acetosus compos. | 154 |
| Scolopendria | 173, 209, 308, 345 | Acetosus simpl. | 153 |
| Scolopendrium | 281 | de Agresta | 156 |
| Scordion | 122 | Arantiorū acetosorū | ibid. |
| Scorea ferri | 88 | de Artemisia | 159 |
| Scoreæ ferri præparatio | 381 | Byzantinus comp. | 158 |
| Secacul | 76, 77, 89 | de Byzantiis simpl. | ibid. |
| Seitaragi Indum | 90, 254 | de Calamintha | 166 |
| Semen rosarum | 291 | de Cichorio cum Rhabar. | 168 |
| Seminum delectus | 421 | Dinarij | 158 |
| Semperuiva minor | 357 | de Duabus radicibus | 152 |
| Sericum | 39 | de Epithymo | 180 |
| Serit | 144 | de Eupatorio | 178 |
| Serpentaria | 112, 336 | de Fumaria maior | 163 |
| Serpentariæ loco quod | 384 | de Glycyrrhiza | 176 |
| Sesamum | 330 | Granatorum acetosorū | 157 |
| Seseli | 29, 96, 124 | Granat. dulcium | 157 |
| Creticum | 53, 55, 70, 71, 131 | de Hyssopo | 177 |
| tenuè | 131 | de Endiua comp. | 168 |
| | | Infu- | |

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| Infusionis rosarum | 161 | 78, 282, 291 | |
| Infusionis violarum | 162 | Spodij præparatio | 38 |
| de Iulibus | 173 | Spodium | 28 |
| de Lupulo | 187 | Squama aris | 374, 376 |
| de Mentha maior | 164 | Styrax | 123, 128, 304 |
| de Mentha minor | 165 | rubea | 104, 105, 286 |
| Myrtinus compositus | 184 | Succedanea | 463 |
| de Nymphaea | 181 | Suchaha | 128 |
| de Papauere compos. | 183 | Succinum | 271, 297, 298 |
| de Papauere simp. | ibid. | Succorum delectus | 422 |
| de Pomis | 156 | Succus Borag. & Buglossæ, | |
| de Prassio | 175 | 185, 186, 187 | |
| de Quinque radicibus | 152 | Eupatorii | 49, 249 |
| de Stœchade compos. | 179 | Scyllæ 359 | |
| de Stœchade simpl. | ibid. | Violarum | 175 |
| de Succo acetosæ | 185 | Sumach | 103 |
| de Succo Boraginis | ibid. | Suppositoria, seu Glâdes | 242 |
| de Succo Buglossæ | 186 | Symphytum petraeum | 102, 103 |
| de Succo Endiuæ | 167 | Synodonites lapid. | 298 |
| de Succo Myrtillorum | 184 | Syrupus de Pyris | 193 |
| de Succo Violarum | 175 | de Cichorio Val. Cordi | ibid. |
| Violarum compos. | 174 | Refectiuus | 194 |
| Sifer | 76, 77 | T Amariscus | 88 |
| Sisimbrium | 57, 312 | Terebinthinam coquendi | |
| Sison | 97, 99, 145 | modus | 387 |
| Sistra | 72 | Terebinthi loco quid | 130 |
| Smaragdi loco quid | 64 | Terræ cinolix loco | 145 |
| Smaragdus | 61 | figillatæ loco quid | 64, 65, |
| Solanum | 358 | 84, 124 | |
| Sorba | 360 | Testiculi Vulpis | 112 |
| Spargula | 339 | Tetrahit 339 | |
| vera | 345 | Thamar | 26 |
| Species ad Suppositoria | 242 | Thereniabin | 259, 265, |
| Spica Celtica | 86, 39, 114 | 282, 290, 293 | |
| Lauendula | 329 | Theriaca Andromachi | 113 |
| Romana | 86, 95, 134 | Androm. senioris | 127 |
| Spina nigra vel cærulea | 131 | Diatestaron | 132 |
| Spodij loco quid | 64, 65, 74, | Thymbra | 30, 44 |
| | | Thymiana | 105, 286 |
| | | Hammoniæ | 145 |
| | | Thlaspi | |

I N D E X.

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|---------------|
| Chlasphi | 124, 251 | Tryphera magna | 85 |
| Chus album aut flauum | 79 | minor | 37 |
| masculum | ibid. | Persica | 90 |
| Tirus | 272 | Sarracenia | 88 |
| Tragea laxat. | 241 | Tussilago | 182 |
| Tribulus aquaticus | 333 | Valeriana | 340 |
| Trifolium acetosum | 340 | Vas duplex | 300 |
| Troch. de Absinthio | 293 | Venter Mergi | 146 |
| de Agarico | 287 | Vermicularis | 357 |
| Alhandal | 293 | Vesicaria | 169 |
| Alkekengi | 289 | Vini Falerni loco quid | 276 |
| Alindaracaron | 130 | Viola | 207, 282, 283 |
| Aliptæ moschatae | 286 | Violaria | 207 |
| Bechij albi | 294 | Viperæ | 122, 272 |
| Bechij nigri | 296 | Viscus quercinus | 374 |
| de Berberis | 285 | Vlmus | 367 |
| de Camphora | 290 | Vmbilicus marinus | 298 |
| de Cappare | 280 | marinus | 355 |
| de Charabe | 287 | Veneris | 357 |
| Diaui | 282, 283 | Vnguent. Aegyptiacum | 353 |
| Diaion | ibid. | Agrippæ regis | 332 |
| Diarrhodon | 285 | Album | 351 |
| de Eupatorio | 282 | Album capsuratum | 364 |
| Gallix moschatae | 286 | Apostolorum | 333 |
| Hedychroi | 130, 273 | Aregon | 334 |
| de Lacca | 284 | de Arthanita maius | 360 |
| de Lacca Val. Cordi | 296 | de Arthanita minus | 361 |
| de Myrrha | 288 | Aureum | 354 |
| Ramich | 279 | Citrinum | ibid. |
| de Rhabarb. | 285 | Comitissæ | 358 |
| de Rosis | 289 | Dialthæa compos. | 353 |
| Scyllitici | 272 | Dialthæa simpl. | 352 |
| de Spodio | 291 | Diapompholygos | 358 |
| de Succino Val. Cordi | 297 | Fuscum | 357 |
| de terra sigil. | 291 | Martiatum | 336 |
| Theriaci | 130 | Martiatum magnum | 341 |
| de Thiro | ibid. | Martiatum paruum | 347 |
| de Vipera | 272 | Pectorale | 364 |
| | | | Po. |

I N D E X.

| | | | |
|-----------------------|-----|-------------------------|---------|
| Populeon | 356 | Xylocasia | 24,251 |
| Potabile | 362 | Xylocinnamomi loco quid | |
| Rosatum Mesuz | 363 | | 317,318 |
| Rubrum caphuratum | 364 | Z Ambach | 322 |
| Vngula caballina | 182 | Zarnabum longum, rotun- | |
| Vua Lupina | 358 | dum | 331 |
| X Yloaloës | 46 | Zedoaria | 62,331 |
| Xylobalsami loco quid | 66, | Zurumbet | 62 |
| 70,513 | | | |

F I N I S.

LECTORI S.

HANC, candide Lector, editionem ferè
absolueramus; cùm ecce offeruntur
nobis à D. MATTHIA LOBELIO (pro
ipsius vetere erga nos amicitia) Animad-
versiones quædam, necnon & emenda-
tiores quotidianorum lenitiuorum vsi-
tatissimorum solutiouorumque medica-
mentorum, quas alioqui passim offi-
cinæ peruertunt, descriptiones: Quæ,
vt emendatius paullo ac illustrius opus redde-
retur, tanquam ἐπιμετῶν adiciere placuit.
Tuum erit, hoc ab animo tibi gratificandi cu-
pido profectum boni consulere.

Pag. 445. lin. 17. Quæ verò solius naturæ &c.
pone in margine Syluius.

Pag. 449. lin. 22. pro botrus reponere botrys.

461. lin. 13. pro Scammonij ℥ j. β. lege ℥ j.

462. lin. 1. ante HIERA AROMATICA
interfere hæc sequentia.

!

ELECTA-

ELECTARIUM INDVM.

Disfluadet præparationē Electarij Indi noster Rondelletius, quia non multum differt à Diaphœnico. Adstringentia & attenuantia Electario Indo addiderunt, quæ deteriorem potius compositionem fecerunt, & deprauarunt, vt exploranti facilè patebit.

LENITIVA È CASSIA
medicamenta.

E Cassiæ Ægyptiæ filiquis à diuersis auctoribus multa & varia medicamenta lenitiua descripta; minimè paranda aut dispensanda censentur, quia vel acescunt vel exiccantur, & eorum laxandi vis perditur.

FLOS CASSIÆ.

E Cassiæ recentis & prægnantis fistularibus filiquis pulpa elicitor, quam florem Cassiæ & Cassiam extractam vocant: Sed cum Cassiæ filiquæ siue fistularis recens pulpa melius asseruetur in sua theca, quàm excreta; quid extractione ante vsum opus est? Triplex Cassia extracta in officinis proflare solet. Cassia extracta sine Sena & cum Sena. Cassia extracta cum Manna; Cassia cum saccharo & cum melle pro clysteribus & pauperibus. Si præscribitur

Cassia extracta.

tur à medicis,paretur hoc sequenti modo.

CASSIA extracta communis Nicolai.

℞. florum violarum,

Violariæ siue foliorum violarum,

Maluæ,

Mercurialis,

Betæ,

Parietariæ ana M. j.

Absinthij pontici siue vulgaris M. f.

Herbæ istę virides coquatur artificiose in f. q.

aquæ; è cuius colato abluie siliquas Cassiæ,

& dilue in eius portiuncula pulpæ Cassiæ

℥ j. Mellis ex reliqua colati parte despu-

mati ℥ f. percoquantur lento igne ad ele-

ctarij formam.

DIACASSIA cum **MANNA** nō multum

differt à **Dia catholico**, nisi Sena; Rhabar-

baro & Polypodio.

DIACATHOLICON Nicolai, vel potius

è Dia-catholico liquamentum.

Huius vniuersalis medicamēti varia est de-

scriptio. Exemplaria vulgata habent pro pul-

pæ Cassiæ & Thamar-Indorum ana ℥ ij ^{bus}

sacchari ℥ ij. id est ℥ xxiiij. Andernacus au-

tem pro ℥ ij. sacchari addit Cassiæ & Tha-

l 2

mar-Ind.

mar-Indorum ana ℥ viij. Rondelletius verò
℥ vj. mediocritate fretus. Hoc Catholicon
lene siue mite in suauissimam & lenissimam,
cum Cassiæ operatione maximè cōuenientem
compositionem, redegimus: quam è Dia-
catholico liquamentum diximus. neglecto Dia-
catholico maiore Fernelij, quod recipit Tur-
bith & Diagredium, ab his benignis medica-
mentis & intentione Nicolai multū aliena.
Paretur ergo in hunc modum.

R. radicū filiculæ siue * Polypodij recentium
fol. Senæ mundatorum ana ℥ xvj.

Glycyrrhizæ rasæ

Anisi ana ℥ ij.

Seminis fœniculi ℥ j.

Foliorum violarum M iij.

Florum violarum M j. f.

4^{or} seminum frigidorum maiorum ana ℥ j.

Contusa omnia, dempta Sena & seminibus
frigidis, floribusque violarum, 24. horas vel bi-
duo aquæ pluuiæ p v. vel q. s. madefacta, de-
coquuntur leniter ex arte in balneo Maris; mox
paulo antequam ab igne deponantur, Senam
adiiciunt cum seminibus frigidis & floribus
violarum, maceranturque calidè aliquot horas
in balneo. Vbi tantisper refrixerint, linteolo
exco-

excolantur & leuiter exprimuntur, ne Polypodij & Senæ vis astrictoria eliciatur. Colatum iterum decoquitur, dū mellis crassitudo fiat, adiectis sacchari boni subrubri, perdulcis, vel albi pinguis ꝑ iiij. Postea ab igne remotis adde floris Cassiæ vapore decocti præscripti extractæ & Thamar-Indorū ana ꝑ vj. sacchari candi & Penidiarum ana ꝑ jß. succi vel infusi roß. ꝑ iiij. æstate addi poterit decocto libra vna succi Mercurialis defæcati & purificati. & pro diuitibus in singulas ꝑ scrupulus vel ꝑ jß. Rhabarbari selectissimi.

* Polypodij magma aut crassamentū, quia *Rondel.* copiosos flatus gignit, ventrem lædit, eumque magis obstruit quàm reseat; leuiter Polypodium decoquendum iussimus, vt efficacius suas vires, easque suauiores, exuat. Decoctionem enim mediocrē sustinet, quemadmodū Sena & Turbith, vti monuimus in nostriis stirpium Observationibus Latinis. Ponderus eius etiam adauxi, quia vili emitur pauperum commodo; longèque maiori pondere in decoctis, vti Sena, & alia permulta, quàm in substantia, vt vulgus loquitur, assumitur.

Aliqui omittūt Saccharū Penidiarū leui incommodo, quia Penidiæ parantur ex saccharo pingui, leniente.

ELECTARIUM LENITIVUM.

Elect. Lenitium cōuenit cum Diacatholico & Diacassia, quare eo carere possumus. Hæc de Electariis lenioribus sufficiant, pluribus humoribus, exustis potissimum expurgandis idoneis.

DIA-SEBESTEN.

Dia-sebesten Montagnanæ bilem tenacem euacuat. In Italia & regionibus calidis magis vsitatum quam in hisce frigidis tractibus, ubi raro dispensatur, quemadmodum Elect. è Psyllio Mesuæ, quo etiam carere possumus. Recipit copiosè scammonium cum trochis. è Spodio vel antispodio, ex Oxyacātha, trochis. Diarhodon, quò Scammonij vires remissiores sint, & alui fluores dispendiosæ vitentur. Pro hisce inusitatis electariis medicus doctus facile cholagogum rosatum decocto conueniendi siue è myxariis siue è Psyllio, Fumaria, Epithymo, Eupatorio, Rhabarbaro & huiusmodi pro ratione & natura morborum diluit.

ELECTARIUM è Succo Rosarum Nicolai fortissimum est cholagogum & minus castigatum aut emendatum.

Anti-

Antidotus siue CONFECTIO HA-
MECH *apud Mesuem.*

Ex veterum antidotis retinent hanc confe-
ctionem neoterici ob insignes vires ad omnes
morbos ex pituita salsa, flaua bile, adustisque
humoribus ortos, & prauos eorū ichores; sca-
biem, impetiginem, elephantiasim, luem Ve-
neream & quæuis cutis & cuticulæ vitia. Im-
probandi tamē sunt qui hac cōpositione vtun-
tur in pituita crassa euacuanda ob Myrobala-
nos, quæ magis impinguant materiam lentam
ex Galeni & antiquorum sententia. Sed quia
hæc compositio, vt scitè monet Rondelletius,
sine arte composita videtur: & contra theore-
mata à Galeno, Mesuico & aliis tradita: nam
infunduntur diutius & coquuntur maximè
inæqualia, vt Polypodium, Myrobalani, Ag-
ricus, Colocynthis, Rhabarbarum &c. lubuit
eius parandi rationem explicare. Quid enim
opus quinq. diebus in macerando Polypodio
ex sero lactis? cū nostra ætas ipsum Guaia-
cum lignum durissimum, eiusque cortices &
huiuscernodi 24. horis aqua tantum feliciter
macerat. Serum autē diutius asseruatum facile
aescit, situm ducit & putret. Octo vel 10. ho-
rarum

rarum Rhabarbari infusum (præterquam in alui fluoribus, ventriculi & intestinorum imbecillitatibus, lubricitatibus & leuitatibus à bile alimentis permixta, vbi solemus exhibere fortem Rhabarbari expressionem & ipsum Rhabarbarū in tota substantia) commendatur à perbonis medicis, ne vis adstrictoria eliciatur. Hæc monuimus, vt nonnulli è nostris pharmacopœis sint paulò diligentiores in parandis pharmacis, ediscantque rationem componendorum medicamentorū, quam ipsi modum faciendi vocant.

℞. Myrobalanorum flauarum ℥ iiij.

Cepularum, Indarum,

Rhabarbari

Epithymi ana ℥ ij.

Agarici Colocynthidis

Polypodij querni ana ℥ xvij.

Absinthij Thymi

Senæ ana ℥ j.

Violarum ℥ xv.

Anisi Rosarum Fæniculi ana ℥ vj.

Succi fumarizæ ℥ xij.

Pruna numero sexaginta

Vuarū passarum à vinaceis purgatarum ℥ vj.

Polypodium leuiter cōtusum, cum passulis,
Absin-

Abſinthio, Prunis, farniculo & anifo 24. horas
madefactum ex ſeri lactis aſinini vel caprini
q. ſ. in vaſe oris anguſti obturato. ferueſac ali-
quot leuioribus ebullitionibus: deinde addatur
Colocynthis contuſa & forficibus incifa cum
agarico nodulo laxo excepta; Thymū, Epithy-
mum, Myrobalani, Sena, Viola, Roſæ & Rha-
barbarum, macerentur 12. horas, & vnica fer-
uefactione parumper decoquatur addito ſuc-
co defæcato fumarizæ, quia paucam aut fere
nullam ſuſtinet decoctionem. Cola leniter ex-
primendo. In colati portiuncula diſſolue
Mannæ ℥ ij. & coletur. Coque igne tantillo
colati reliquam portionem, addita ſeſquilibra
ſacchari boni uſq. dum mellis craſſitudinē ha-
beat. mox ubi reſrixit, tepenti adhuc ſyrupo
miſce Caſſiam, Thamar-Indos, Mannam &
Scammonij præparati ℥ j. β. paulatim inſper-
gendo puluerem hunc.

Myrobalanorum flauarum

Cepularum

Indarum ana ℥ β.

Bellericarum

Emblicarum

Rhabbarbari

Seminis fumarizæ ana ℥ iij.

℥ β

Semi.

Seminis anisi
Spicæ Nardi ana 3 ij.

TRYPHERARVM *differentia.*

Trypherarū variæ sunt descriptiones. Quæ Galeno ascribitur apud Mesuem, recipit multa quibus Galenus nunquam usus est, vt Moschum, Ambar, Caryophylli, Nux myristica, Macis & Santala.

Tryphera magna Nicolai cum opio parabatur & sine opio, sed cum opium aufertur, adimenda Hyoscyamus & Mandragoras; cum non minus sterilibus mulieribus aduersentur quàm opium.

Est & alia Tryphera minor ad differentiam maioris ex arte Phenonis. Item Tryphera moschata Mesuæ &

Saracenicæ duplex { Mesuæ
& Nicolai.

Trypheram Persicam Mesuæ, quia apud multos usu recepta & à medicis Rhotomagensibus & Rondelletio cōprobatur in refrigerando ventre, eodemq. relaxato cōfirmando & roborando, omnesq. humores fere euacuando cum astrictione & refrigeratione, sine vlla ventris læsione, retinuimus; delicatis & imbec.

imbecillis tutiorem futuram quam Antidotus
Hamech ob Diagredium & Colocynthida:
quamuis validiora medicamenta mitescant
cum aliis in pauca quantitate exhibita. Sic
enim paratur.

℞. Succorum Solani

Endiuia fatiua

Apij defacatorum ana ℞ ij.

Succi lupulorum ℞ j.

Prunorum Damascenorum numero l.

Violarum recentium ℥ iij.

Foliorum Senae

Myrobalanorum Citrearum

Cepularum

Indarum confricatarum in oleo

amygdalino dulci

Agarici ℥ j.

Castithae ℥ β.

* Epithymi ℥ v.

Spicae Nardi Indi-
cae ℥ iij.

Feruefac paulisper,

** pro ℥ 4. Epithymi ut in veteri
exemplari legitur, Cordus, Anti-
dotarium Florentinum & alij non-
nulli ℥ 40. legunt. Succorum
autem praescriptorum ℞ j. Quae
quantitas longe superat omnia huius medicamenti simplicia:
adde quod solidior foret eius operatio. & succi ingredientia
vix caperent quae infundi debent. Syrupus ex Epithymo Mesuae
cui nomen ab Epithymo tanquam praecipuo agente ℥ xx. tan-
quam Epithymi primo loco habet*

cola,

cola, & incolati dimidio dissolue pulpæ
 Thamar-Indorum ℥ iij.
 Pulpæ Cassiæ ℥ iij.
 Mannæ ℥ j. β.
 Io-sacchari siue sacchari violati ℥ xij.
 Alteri colati parti adde sacchari optimi
 ℥ xxxvj.
 Aceti boni ℥ j.
 Coquatur igne leuissimo, & supradictis com-
 misceantur.
 Deinde adde sequentia in puluerem redacta
 Rhabarbari selecti ℥ ij.
 Myrobal. Citrinorum ℥ j. β.
 Indorum
 Chebulorum ana ℥ j.
 Bellericorum
 & Emblicorum ana ℥ β.
 Seminis fumarie
 Trochiscorum Diarhodon
 Macis Mastiches Cubebarum
 Spodij vel Antispodij è Myrto vel Cydonio
 Santali citrini ana ℥ ij.
 Seminum Cucurbitæ
 Citrulli
 Melonum
 Cucumeris mundatorū } ana ℥ ij. β.
 Anisi

Anisi ℥ β.

Spicæ Nardi ℥ ij.

Tenuissimè trita inuoluantur oleo violato, &
fiat omnibus mixtis electarium artificiosè.

*Pilula Aggregatiua ex inuentione D. Mesua,
inter omnes Aggregatiuas potissima.*

Quia omnes humores implicatos è capite,
ventriculo, hepate & visceribus euacuant, Ca-
tholicæ vocâtur, aut Diacatholico comparan-
tur: & quoniam ad multa vtilis, multiq̃ue vsus
quotidiani; eius descriptionem damus ex ve-
teri exemplari depromptam.

℞. Myrobalanorum Citrinorum

Rauedseni ana ℥ iiij.

Succi Eupatorii Mesuæ, id est Agerati Diosc.

Succi Absinthij ana ℥ ij.

Diacredij siue Scamoniij præparati succo Ros.

Turbith boni

Aloës ana ℥ vj.

Myrobala. Chebulorum

Indorum

Agarici candidissimi

Colocynthidis

Polypodij ana ℥ ij.

Maltiches

Rosa.

Rosarum

Salis gemmæ

Epithymi

Anisi

Zingiberis

ana 3 l.

Elect. Rosati Mesuæ q. s.

In his pilulis hoc reprehensione dignum, quod vulgus pharmacopœorū Cordū, Wecherum & alios secutus, tū in superiori Germania cum & inferiori, pro Eupatorio Mesuæ, Gratiolam, visceribus impendiō effrenatum hostem, substituant. Ageratum enim esse Mesuæ Eupatorium superabundē docuimus in nostris Stirpium Adversariis.

Hæc sequentia sub finem pag. 462. adicienda, nempe post HIERA ARO-


MATICA &c.


Quia in hisce Aquilonicis plagis tot seplarij, Salgamarij potius quam pharmacopœi, Barbitonfores, Lithotomi, Circumforanei, Agyræ, Ludimagistri, medicamentarij indocti & sacrificuli vafri, rapaces & lucri avidissimi, nulla medicinæ parte illis probè peruestigata, per hominum mortes experimenta agitantes, tam repentē hodie Medici aut potius Medica-


Medicasteri fiunt; qui tandem in locum expe-
rientissimorum Medicorū irrepserunt; magno
ignaræ gentis, rudis & rusticæ turbæ applausu:
apud quos sordet, laceratur & malè audit ars
Medica diuina, nobilissima & antiquissima,
summo ægrotantium dispendio, & tædio pro-
borum medicorum; consultò dataque opera
eatenus & parcius attigimus, imò prætermi-
simus (tanquam nefas plagiumque profanare
& perdere artem) medicatos succos siue no-
bilissima liquamenta, extracta cathartica vo-
cata, quæ longè minori noxa & mole, maiori
cum efficacia in corporibus egregiè operan-
tur: tandiu vsquedum leges cessabunt in hos
indoctos & inexpertos carnifices qui se medi-
cos profitentur, vbi aliquot remediorum for-
mulas memoria didicerint, animaduerrere.


F I N I S.


Métal













Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1595/A